

# Lineáris algebra és a rang fogalma

(előadásvázlat, 2010. szeptember 29.)

Maróti Miklós

Ennek az előadásnak a megértéséhez a következő fogalmakat kell tudni:

- (1) A mátrixalgebrával kapcsolatban: **számtest feletti mátrixok** fogalma, mátrixok **képlettel való megadása**, **műveletek** mátrixokkal és azok **elemi tulajdonságai**, **trianguláris mátrixok**.
- (2) A determinánsokkal kapcsolatban: a **determináns** fogalma, **kifejtési tételek**, a determinánsok **elemi tulajdonságai**, a **dualitás elve**, a **determinánsok szorzástétele**, trianguláris mátrixok determinánusa, mátrix **inverzének** kiszámítása determinánssal, **Vandermonde-determináns**, **elfajuló mátrix**.
- (3) A lineáris egyenletrendszerekkel kapcsolatban: a **lineáris egyenletrendszer** fogalma, egyenletrendszerek **mátrixos alakja**, **bővített mátrix**, **lépcsős alakú** egyenletrendszerek, **kötött** és **szabad** változók, **elemi sorátalakítások**, **Gauss-elimináció**, **Cramer-szabály**, mátrixok **determinánsának** és **inverzének** kiszámolása **elemi sorátalakításokkal**.
- (4) Az absztrakt vektorterekkel kapcsolatban: számtest feletti **vektortér** fogalma, a fontos példák ismerete ( $T^n$ ,  $T^{\mathbb{N}}$ ,  $T^{m \times n}$ ,  $T[x]$ ,  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $\mathbb{R}$  vektortér  $\mathbb{Q}$  felett) **nullvektor**, **műveletek** vektorokkal és azok **elemi tulajdonságai**, vektorterek **izomorfizmusa**, **altér** fogalma, **triviális alterek**, **homogén** lineáris egyenletrendszer **megoldáaltere**, **lineáris kombináció**, **triviális lineáris kombináció**, **feszített (generált) altér**, alterek **összege** és **metszete**, az alterek **hálója**,
- (5) Vektorrendszerekkel kapcsolatban: a **vektorrendszer** fogalma, **lineárisan független** és **függő** vektorrendszerek, **maximális** lineárisan független vektorrendszer, **generátorrendszer**, **minimális** generátorrendszer, **végesdimenziós** vektortér, **bázis**, **standard bázis**, vektor **koordinátái**, **kicserélési tétel**, **dimenzió** fogalma, azonos dimenziós vektorterek izomorfak.

Az előadáshoz ajánlott jegyzet:

- Klukovits Lajos: *Klasszikus és lineáris algebra*, Polygon Kiadó, Szeged, 1999.
- Szabó László: *Bevezetés a lineáris algebra*, Polygon Kiadó, Szeged, 2003–2006.

**1. Tétel.** Legyen  $T$  test, és  $A = (a_{i,j}) \in T^{n \times n}$  tetszőleges négyzetes mátrix. Ekkor

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1,1\sigma} \cdot a_{2,2\sigma} \cdots a_{n,n\sigma}.$$

**2. Példa.**  $n = 2$  esetén:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \operatorname{sgn}(\operatorname{id}) \cdot a_{11}a_{22} + \operatorname{sgn}((1\ 2)) \cdot a_{12}a_{21} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$n = 3$  esetén:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \operatorname{sgn}(\operatorname{id}) \cdot a_{11}a_{22}a_{33} + \operatorname{sgn}((1\ 2)) \cdot a_{12}a_{21}a_{33} + \operatorname{sgn}((1\ 3)) \cdot a_{13}a_{22}a_{31} \\ + \operatorname{sgn}((2\ 3)) \cdot a_{11}a_{23}a_{32} + \operatorname{sgn}((1\ 2\ 3)) \cdot a_{12}a_{23}a_{31} + \operatorname{sgn}((1\ 3\ 2)) \cdot a_{13}a_{21}a_{32} \\ = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32},$$

ami éppen a Sarrus-szabály.

**3. Kérdések.** Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak tetszőleges  $T$  testre?

- (1)  $|A| \geq 0$  tetszőleges  $A \in T^{n \times n}$  mátrixra.
- (2) Tetszőleges  $A \in T^{n \times n}$  mátrixra  $|A| \in T$ .
- (3) Ha  $A \in T^{n \times k}$  és  $B \in T^{k \times m}$ , akkor  $AB \in T^{n \times m}$ .
- (4) Ha  $A \in T^{n \times n}$  és  $B \in T^{n \times n}$ , akkor  $|AB| = |A| \cdot |B|$ .
- (5) Ha  $A \in T^{n \times n}$  és  $B \in T^{n \times n}$ , akkor  $|A + B| = |A| + |B|$ .
- (6) Ha  $A \in T^{n \times n}$  és  $\lambda \in T$ , akkor  $|\lambda A| = \lambda |A|$ .
- (7) Ha az  $A \in T^{n \times n}$  mátrix valamely oszlopában csupa nulla elem van, akkor  $|A| = 0$ .
- (8) Ha  $A \in T^{n \times n}$  trianguláris, akkor  $|A|$  a főátlón elhelyezkedő elemek szorzata.
- (9) Az  $A \in T^{n \times n}$  mátrix akkor és csak akkor invertálható, ha  $|A| \neq 0$ .

**4. Példa.**  $\mathbb{C}$  vektortér  $\mathbb{R}$  felett. Az  $1, i$  minimális generátorrendszer, tehát  $\mathbb{C}$  dimenziója 2, azaz  $\mathbb{C}$  izomorf  $\mathbb{R}^2$ -tel mint vektortér (de természetesen nem mint test).

**5. Definíció.** Az  $S$  halmazzal a  $(T; +, \cdot)$  test **résztestjének** nevezzük, ha

- (1)  $\emptyset \neq S \subseteq T$ , (nemüres részhalmaz)
- (2)  $(\forall x, y \in S)(x + y, x \cdot y \in S)$ , (zárt  $T$  műveleteire),
- (3)  $(S; +, \cdot)$  test, (testet alkot  $T$  műveletek megszorításával).

**6. Tétel.** Legyen  $S$  a  $T$  test résztestje. Ekkor  $T$  vektorteret alkot  $S$  felett.

**7. Példa.** Az előző tételben láttuk, hogy ha  $S$  részteste  $T$ -nek, akkor  $T$  vektortér  $S$  felett. Ennek az állításnak a megfordítása még számtestek esetében sem igaz, azaz létezik olyan  $\mathbb{Q} \subseteq T \subseteq \mathbb{C}$  számhalmaz, amely vektorteret alkot  $\mathbb{Q}$  felett a szokásos műveletekkel, de nem test. Legyen

$$T = \left\{ r + s \cdot \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) : r, s \in \mathbb{Q} \right\}.$$

Könnyű ellenőrizni, hogy  $T$  vektortér  $\mathbb{Q}$  felett, és  $1, \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$  bázis  $T$ -ben. Ugyanakkor,  $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \notin T$ , mivel  $T$  minden elemének képzetes része racionális. Tehát

$$\left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \notin T,$$

azaz  $T$  nem zárt a szorzásra, csak a skalárral (racionális számokkal) való szorzásra.

**8. Kérdések.** Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak?

- (1)  $\mathbb{Z}$  test.
- (2)  $\mathbb{Q}$  test.
- (3)  $\mathbb{R}$  test.
- (4)  $\mathbb{C}$  test.
- (5) A valós függvények  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  halmaza test.
- (6)  $\mathbb{R}^3$  vektortér  $\mathbb{Q}$  felett.
- (7)  $\mathbb{R}^3$  vektortér  $\mathbb{R}$  felett.
- (8)  $\mathbb{R}^3$  vektortér  $\mathbb{C}$  felett.
- (9) A valós függvények  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  halmaza vektorteret alkot  $\mathbb{R}$  felett.

**9. Kérdések.** Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak?

- (1)  $\mathbb{Q}$  1-dimenziós vektortér  $\mathbb{Q}$  felett.
- (2)  $\mathbb{R}$  2-dimenziós vektortér  $\mathbb{Q}$  felett.
- (3)  $\mathbb{C}$  4-dimenziós vektortér  $\mathbb{Q}$  felett.
- (4)  $\mathbb{R}$  1-dimenziós vektortér  $\mathbb{R}$  felett.
- (5)  $\mathbb{C}$  2-dimenziós vektortér  $\mathbb{R}$  felett.
- (6)  $\mathbb{R}$  végesdimenziós vektortér  $\mathbb{Q}$  felett.
- (7)  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  2-dimenziós vektortér  $\mathbb{R}$  felett.
- (8)  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  4-dimenziós vektortér  $\mathbb{R}$  felett.

**10. Kérdések.** Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak?

- (1) Az  $(1, 0), (0, 1)$  vektorrendszer bázis az  $\mathbb{R}$  feletti  $\mathbb{R}^2$  vektortérben.
- (2) Az  $(1, 0), (0, 1)$  vektorrendszer bázis az  $\mathbb{Q}$  feletti  $\mathbb{R}^2$  vektortérben.
- (3) A 2 vektorrendszer bázis a  $\mathbb{Q}$  feletti  $\mathbb{Q}$  vektortérben.
- (4) Az 1 vektorrendszer bázis a  $\mathbb{C}$  feletti  $\mathbb{C}$  vektortérben.
- (5) Az  $2, -i$  vektorrendszer bázis a  $\mathbb{R}$  feletti  $\mathbb{C}$  vektortérben.
- (6) Az  $1, \sqrt{2}$  vektorrendszer független a  $\mathbb{Q}$  feletti  $\mathbb{R}$  vektortérben.
- (7) Az  $1, \sqrt{2}$  vektorrendszer generátorrendszer a  $\mathbb{Q}$  feletti  $\mathbb{R}$  vektortérben.
- (8) Az  $1, i$  vektorrendszer bázis a  $\mathbb{C}$  feletti  $\mathbb{C}$  vektortérben.

**11. Tétel (Alterek dimenziótétele).** Ha  $U$  és  $V$  végesdimenziós altér valamely vektortérben, akkor  $U \cap V$  és  $U + V$  is végesdimenziós, és

$$\dim(U \cap V) + \dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V).$$

**12. Példa.** Az  $\mathbb{R}^4$  vektortérben megadjuk az  $(1, 1, 2, -1), (-2, 1, 0, 1)$  és  $(-3, 3, 2, 1)$  vektorok által generált  $U$  altér bázisát. Ehhez a generáló vektorokat egy mátrix soraiba beírjuk, majd a mátrixon sorokon végzett elemi átalakításokkal elvégezzük a Gauss-eliminációt. Az elemi átalakítások nem változtatják meg a generált alteret, továbbá könnyen látható, hogy a Gauss-elimináció során kapott nemzéró vektorok lineárisan függetlenek. Így az eljárás végén egy bázist kapunk.

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ -3 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 2 & -1 \\ 0 & \boxed{3} & 4 & -1 \\ 0 & 6 & 8 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 2 & -1 \\ 0 & \boxed{1} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 6 & 8 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \boxed{1} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Azaz  $U$  kétdimenziós és az  $(1, 0, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}), (0, 1, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3})$  vektorrendszer bázis.

**13. Példa.** Az előző példában szereplő  $U$  alteret megadjuk egyenletek segítségével is. Tudjuk, hogy az altér minden eleme a báziselemek lineáris kombinációjaként előáll, azaz

$$\begin{aligned} U &= \left\{ x \cdot (1, 0, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) + y \cdot (0, 1, \frac{4}{3}, -\frac{1}{3}) : x, y \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ (x, y, \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}y, -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y) : x, y \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) : x_3 = \frac{2}{3}x_1 + \frac{4}{3}x_2, x_4 = -\frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2 \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) : \frac{2}{3}x_1 + \frac{4}{3}x_2 - x_3 = 0, x_4 + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 = 0 \right\}. \end{aligned}$$

Az utolsó halmazt nevezzük az altér egyenletekkel való megadásának.

**14. Példa.** Az előző példában láttuk, hogy hogyan lehet egy generáló vektorokkal megadott alteret egyenletekkel leírni. Most ennek a fordítottját fogjuk elvégezni. Tekintsük a  $\mathbb{R}^4$  vektortérben a

$$V = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) : 22x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, 8x_1 + x_3 + x_4 = 0, 4x_1 + 2x_2 + 6x_4 = 0 \}$$

alteret. Az egyenletek közül valamelyiket kiválasztva (mondjuk az elsőt) kifejezzük az egyik változót (mondjuk az  $x_2$ -t) a többi segítségével, azaz

$$x_2 = 22x_1 + 3x_3.$$

Azt kaptuk, hogy  $x_2$  kötött változó (azaz a többi ismeretében kiszámítható). Ezt a változót visszahelyettesítve a többi egyenletbe kapjuk, hogy

$$8x_1 + x_3 + x_4 = 0, 4x_1 + 2(22x_1 + 3x_3) + 6x_4 = 0,$$

azaz

$$8x_1 + x_3 + x_4 = 0, 48x_1 + 6x_3 + 6x_4 = 0.$$

Megint kiválasztunk egy egyenletet (mondjuk az elsőt), és kifejezünk egy változót (mondjuk  $x_3$ -at) és kapjuk, hogy

$$x_3 = -8x_1 - x_4$$

szintén kötött változó. Ezt visszahelyettesítve a maradék egyenletbe

$$48x_1 + 6(-8x_1 - x_4) + 6x_4 = 0,$$

amit egyszerűsítve azt kapjuk, hogy  $0 = 0$ , ami mindig teljesül. Az egyenletek elfogytak, az  $x_2$  és  $x_3$  változók kötöttek, a többi változó (azaz az  $x_1$  és  $x_4$ ) szabadon választható. A szabadon választható változók száma adja a dimenziót, azaz  $\dim(V) = 2$ . A szabadon választható változókba behelyettesítjük a 0 és 1 értékeket úgy, hogy mindig egy szabadon választható változó kapjon 1 értéket. Így

$$\begin{array}{llll} x_1 = 1, & x_4 = 0, & x_3 = -8 \cdot 1 - 0 = -8, & x_2 = 22 \cdot 1 + 3 \cdot (-8) = -2, \\ x_1 = 0, & x_4 = 1, & x_3 = -8 \cdot 0 - 1 = -1, & x_2 = 22 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) = -3. \end{array}$$

A kapott vektorok  $(1, -2, -8, 0)$  és  $(0, -3, -1, 1)$  alkotják az altér bázisát.

**15. Példa.** Az előző feladatokban megadott  $U$  és  $V$  alterekre kiszámoljuk  $U \cap V$  dimenzióját és megadjuk egyenletek segítségével. Mind az  $U$ , mind a  $V$  altereket már megadtuk egyenletek segítségével. Az  $U \cap V$  altérben azon vektorok vannak amelyek mind két egyenletrendszerben előforduló egyenletet teljesítik, azaz

$$\begin{aligned} U \cap V = \{ (x_1, x_2, x_3, x_4) : \frac{2}{3}x_1 + \frac{4}{3}x_2 - x_3 = 0, \quad x_4 + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 = 0, \\ 22x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \quad 8x_1 + x_3 + x_4 = 0, 4x_1 + 2x_2 + 6x_4 = 0 \}. \end{aligned}$$

Itt a 14. példához hasonlóan az egyenletek visszafejtésével meghatározzuk a kötött és szabad változókat. Már tudjuk, hogy

$$x_2 = 22x_1 + 3x_3 \quad \text{és} \quad x_3 = -8x_1 - x_4$$

kötött változók, így ezt már nem kell még egyszer kiszámolnunk. Ezt visszahelyettesítve az első két egyenletbe kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}x_1 + \frac{4}{3}x_2 - x_3 &= \frac{2}{3}x_1 + \frac{4}{3}(22x_1 + 3(-8x_1 - x_4)) - (-8x_1 - x_4) \\ &= \left(\frac{2}{3} + \frac{88}{3} - 32 + 8\right)x_1 + (-4 + 1)x_4 = 6x_1 - 3x_4 = 0, \end{aligned}$$

és

$$\begin{aligned} x_4 + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 &= x_4 + \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}(22x_1 + 3(-8x_1 - x_4)) \\ &= \left(\frac{2}{3} + \frac{22}{3} - 8\right)x_1 + (1 - 1)x_4 = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_4 = 0. \end{aligned}$$

A második egyenletnél azt kaptuk, hogy  $0 = 0$  ami mindig teljesül. Az elsőből pedig azt kapjuk hogy  $x_4 = 2x_1$ . Tehat az  $x_2, x_3, x_4$  változók kötöttek, az  $x_1$  szabadon választható, az  $U \cap V$  altér egy dimenziós, melynek bázisa az

$$x_1 = 1, x_4 = 2, x_3 = -8 \cdot 1 - 2 = -10, x_2 = 22 \cdot 1 + 3 \cdot (-10) = -8,$$

számolás alapján  $(1, -8, -10, 2)$ .

**16. Példa.** Az előző feladatokban megadott  $U$  és  $V$  alterekre kiszámoljuk  $U+V$  dimenzióját és egy bázisát. Mind a két altérnek tudjuk a generátorrendszerét, így az  $U+V$  alteret ezen generátor vektorok összessége fogja generálni, azaz

$$U + V = [(1, 1, 2, -1), (-2, 1, 0, 1), (-3, 3, 2, 1), (1, -2, -8, 0), (0, -3, -1, 1)].$$

Ezt a 12. példához hasonlóan Gauss-elimináció segítségével bázissá alakíthatjuk, de ezt most itt nem tesszük meg. A dimenziót viszont az alterek dimenziótételéből egyből megkaphatjuk:

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

**17. Definíció.** A  $T$  test feletti  $V$  vektortér  $v_1, \dots, v_k$  vektorrendszer lineárisan független részrendszereinek maximális hosszát a vektorrendszer **rangjának** nevezzük, és  $r(v_1, \dots, v_k)$ -val jelöljük.

**18. Tétel.** Egy  $T$  test feletti vektortér bármely  $v_1, \dots, v_k$  vektorrendszere esetén

$$r(v_1, \dots, v_k) = \dim[v_1, \dots, v_k].$$

**19. Példa.** Kiszámoljuk az  $(1, 1, 2, -1)$ ,  $(-2, 1, 0, 1)$ ,  $(-3, 3, 2, 1)$  vektorrendszer rangját. Ez nem más, mint az általuk feszített alter dimenziója. Ezt a 12. példában már kiszámoltunk, és azt kaptuk, hogy

$$r((1, 1, 2, -1), (-2, 1, 0, 1), (-3, 3, 2, 1)) = \dim(U) = 2.$$

**20. Definíció.** Két vektorrendszert **ekvivalensnek** nevezzük, ha ugyanazt az alteret generálják.

**21. Definíció.** A vektorrendszerek **elemi átalakításai** a következők:

(1) tetszőleges  $v_i$  vektor **nemnulla**  $\lambda \in T$  skalárral való szorzása

$$v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_k \sim v_1, \dots, v_{i-1}, \lambda v_i, v_{i+1}, \dots, v_k$$

(2) tetszőleges  $v_i$  vektor tetszőleges  $\lambda \in T$  skalárszorosának egy **másik**  $v_j$  ( $j \neq i$ ) vektorhoz való hozzáadása

$$v_1, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_k \sim v_1, \dots, v_{j-1}, \lambda v_i + v_j, v_{j+1}, \dots, v_k$$

(3) nulla vektor elhagyása

$$v_1, \dots, v_{i-1}, 0, v_{i+1}, \dots, v_k \sim v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_k.$$

**22. Tétel.** Két vektorrendszer akkor és csak akkor ekvivalensek, ha elemi átalakítások sorozatával egymásba alakíthatók. Tehát tetszőleges generátorrendszer elemi átalakítások sorozatával bázissá alakítható.

**23. Kérdések.** Az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak véges dimenziós vektorterekben?

- (1) Ekvivalens vektorrendszerek elemszáma megegyezik.
- (2) Elemi átalakítások megfordítottja is elemi átalakítás.
- (3) Bármely két lineárisan független vektorrendszer elemi átalakítások sorozatával egymásba alakíthatók.
- (4) Bármely két generátorrendszer elemi átalakítások sorozatával egymásba vihetők.
- (5) Két azonos vektor közül az egyiknek az elhagyása elemi átalakítások sorozatával megvalósítható.
- (6) A  $\mathbb{C}^2$  vektortérben az  $(1, 2), (i, 1) \sim (1, 2), (0, 1 - 2i) \sim (1, 2), (0, 1) \sim (1, 0), (0, 1)$  átalakítások elemiek.

**24. Definíció.** Az  $A \in T^{m \times n}$ -es mátrix **sorrangja** az  $A$  sorai által alkotott vektorrendszer rangja, **oszloprangja** az  $A$  oszlopai által alkotott vektorrendszer rangja.

**25. Definíció.** Legyen  $A \in T^{m \times n}$  tetszőleges  $T$  test feletti mátrix és  $r \leq m, n$  egészek. Az  $A$  mátrix  **$r$ -edrendű aldeterminánsainak** az  $A$  mátrix tetszőleges  $r$  sorát és  $r$  oszlopát kijelölve, majd a kijelölt sorok és oszlopok találkozásában lévő elemekből alkotott  $r \times r$ -es mátrixok determinánsait nevezzük. Az  $A$  mátrix **determinánsrangja** a nemelfajuló (nem nulla) aldeterminánsainak a maximális rendje.

**26. Példa.** Számoljuk ki az

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 9 & 27 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & 25 & 125 & 0 \end{pmatrix}$$

mátrix determinánsrangját. A rang maximum 4 lehet, mert ha az utolsó, csupa nulla oszlop benne van egy aldeterminánsban, akkor annak értéke 0. Viszont azokat a sorokat kiválasztva, amelyek 1-gyel kezdődnek az

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{vmatrix}$$

aldeterminánst kapjuk, amely éppen egy Vandermonde-determináns, ezért értéke

$$(3 - 2)(-1 - 2)(5 - 2)(-1 - 3)(5 - 3)(5 - (-1)) \neq 0,$$

tehát az  $A$  mátrix determinánsrangja 4.

**27. Tétel (Rangszámtétel).** *Tetszőleges mátrix sor-, oszlop- és determinánsrangjai megegyeznek.*

**28. Definíció.** A rangszámtétel szerint tetszőleges  $A$  mátrix sor-, oszlop-, és determinánsrangja megegyezik. Ezt a számot nevezzük az  $A$  mátrix **rangjának**, és  $r(A)$ -val jelöljük.

**29. Következmény.** *Tetszőleges  $A \in T^{n \times n}$  mátrixra a következő állítások ekvivalensek:*

- (1)  $|A| \neq 0$ ,
- (2)  $A$  oszlopvektorainak rendszere lineárisan független,
- (3)  $A$  sorvektorainak rendszere lineárisan független.

**30. Tétel (Kronecker-Capelli-tétel).** *Tetszőleges  $T$  test,  $A \in T^{m \times n}$  és  $b \in T^m$  esetén az  $Ax = b$  lineáris egyenletrendszer akkor és csak akkor oldható meg, ha  $r(A) = r(A|b)$ .*