

2015.06.02.

Kalkulus I.

NÉV:.....

A csoport

EHA:.....

FELADATOK:

1. A tanult módon vizsgáljuk az $a_1 = 3, a_n = \sqrt{3a_{n-1} - 2}$ ($n > 1$) rekurzív sorozatot. 10pt
 2. Definíció szerint és formálisan is igazoljuk, hogy $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + \sqrt{5}}{n - 4} = \infty$. 10pt
 3. A tanult módon ábrázoljuk az $f(x) = xe^{-x}$ függvényt. 15pt
- (i) Értelmezési tartomány, tengelymetszetek, paritás. (ii) Határérték. (iii) Első derivált, monotonitás, szélsőérték. (iv) Második derivált, konvexitás, inflexió. (v) Függvényábrázolás, értékkészlet.
4. Határozzuk meg a következő integrálokat: 30pt

$$(i) \int_{-\pi/4}^{\pi/2} x \cos 2x \, dx, \quad (ii) \int_0^{\infty} ue^{-u^2} \, du, \quad (iii) \int_0^1 \frac{t^3 - 1}{t + 2} \, dt.$$

Segédlet:

$$\begin{aligned} \int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad (\alpha \neq -1), \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, \\ \int \cos x dx &= \sin x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C, \\ \int \frac{1}{\sin^2 x} dx &= -\operatorname{ctg} x + C, \quad \int \frac{1}{x^2 + 1} dx = \operatorname{arctg} x + C = -\operatorname{arcctg} x + C, \\ \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin x + C = -\arccos x + C, \quad \int e^x dx = e^x + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C. \end{aligned}$$

Definiáljuk a következő fogalmakat:

- (i) Az (x_n) sorozat korlátos. *5pt*
- (ii) A $g(x)$ függvény monoton nő $[c, d]$ -n. *5pt*
- (iii) A $h(x)$ -nek az $x = -1$ pont kritikus pontja. *5pt*
- (iv) A környezetes definíció alapján $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -\infty$. *5pt*
- (v) Integrálfüggvény. *5pt*

Az elégséges érdemjegyhez a feladat részből legalább 30, a definíció részből legalább 10 pontot el kell érni. **Tiltott eszközök használata esetén az érdemjegy elégtelen és ezt követően a hallgató már csak szóban vizsgázhat!**

2015.06.02.

Kalkulus II.

NÉV:.....

A csoport

EHA:.....

FELADATOK

1. A tanult módon vizsgáljuk a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+3)^{n-2}}{5^n \sqrt{2n-1}}$ sort. 22pt
2. Oldjuk meg: $(x^2 + 3x)y' + 4 = y^2$, $y(1) = 2$. 23pt
3. Definíció alapján és formálisan is határozzuk meg az $f(x, y) = 2x + \sqrt{xy} - 1/y$ függvény $f'_x(-2, -3)$, $f'_y(4, 1)$ parciális deriváltjait. 22pt
4. Határozzuk meg $\int_H \int \frac{x+y}{2x+1} dxy$ értékét, ahol H a $(3, 0)$, $(1, 3)$ és $(0, 0)$ pontok által kijelölt zárt háromszög. 23pt

Az elégséges érdemjegyhez legalább 40 pontot el kell érni. **Tiltott eszközök használata esetén az érdemjegy elégtelen és ezt követően a hallgató már csak szóban vizsgázhat!**

$$\begin{aligned} \int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad (\alpha \neq -1), \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, \\ \int \cos x dx &= \sin x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C, \\ \int \frac{1}{\sin^2 x} dx &= -\operatorname{ctg} x + C, \quad \int \frac{1}{x^2+1} dx = \operatorname{arctg} x + C = -\operatorname{arcctg} x + C, \\ \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin x + C = -\arccos x + C, \quad \int e^x dx = e^x + C, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} x^n &= \frac{1}{1-x} \iff |x| < 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} < \infty \iff \alpha > 1, \\ (1+x)^{\alpha} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \iff |x| < 1, \quad \int_k^{\infty} f(x) dx < \sum_{n=k}^{\infty} a_n < a_k + \int_k^{\infty} f(x) dx. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad a_0 := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \\ a_n &:= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L[f](p) &:= \int_0^{\infty} f(x) e^{-px} dx, \quad L[e^{ax} f(x)](p) = L[f(x)](p-a), \quad L[x^n](p) = \frac{n!}{p^{n+1}}, \\ L[\cos ax](p) &= \frac{p}{p^2+a^2}, \quad L[\sin ax](p) = \frac{a}{p^2+a^2}, \quad L[y'] = pL[y] - y(0), \quad L[y''] = p^2L[y] - py(0) - y'(0), \end{aligned}$$

$$z=x+iy, \quad f(z)=u(x,y)+iv(x,y), \quad u'_x=v'_y, \quad -u'_y=v'_x, \quad u''_{xx}+u''_{yy}=0$$

$$\int_L f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt$$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n, \quad c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, \quad c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz.$$

$$c_k := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx, \quad \hat{f}(x) := \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}, \quad \hat{F}(\omega) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$