

## 1. Síkgráfok és élszínezések

A párosításoknál szereplő Petersen-tétel eredeti motivációja a négy-szín-sejtés volt. Az alábbiakban a négy-szín-sejtés egy élszínezéses ekvivalensét mutatjuk meg. Így kapcsolatot teremtünk a párosítások, élszínezések és síkgráfok között.

**Definíció.**  $G$  gráf élszínezése  $c : E(G) \rightarrow \mathbb{N}^+$  függvény.  $c$  egy  $k$ -élszínezése  $G$ -nek, ha  $c(E(G)) \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$ .

**Definíció.**  $c$  jó élszínezése  $G$ -nek, ha minden  $x$  csúcsra az ott összefutó  $d(x)$  élnek különböző színe van.

A következő optimalizálási feladat adódik: keressük azt a minimális  $k$  természetes számot, amellyel egy  $G$  gráf jól  $k$ -él-színezhető. E gráfparaméter neve:  $G$  élkromatikus száma, jelölése  $\chi_e$ . Azaz


$$\chi_e(G) := \min\{k \in \mathbb{N}^+ : G\text{-nek van jó } k\text{-élszínezése}\}.$$

**Megjegyzés.** A hurokél akadály a jó színezésnek: Ha van hurokél, akkor nem létezik jó élszínezés (az összefutó  $d(x)$  él között ismétlődés van), ha nincs hurokél, akkor pedig létezik jó színezés (például ha minden él különböző színt kap, akkor jó színezésünk van).

Petersen-tétele azt állította, hogy ha a  $G$  gráf kétszeresen élösszefüggő és 3-reguláris, akkor  $G$ -ben létezik teljes párosítás.


**1. Állítás.** Ha  $G$  3 reguláris 2-szeresen élösszefüggő, továbbá síkgráf is, akkor élhalmazra három teljes párosítás uniója, azaz található olyan  $M_1, M_2, M_3$  teljes párosítások  $G$ -ben, hogy  $M_1 \cup M_2 \cup M_3 = E(G)$  teljesüljön.

**Megjegyzés.** A síkgráf feltétel szükséges. Az ellenpéldát Petersen adta. Petersen-gráf: 3-reguláris, kétszeresen élösszefüggő, nem síkgráf, és élhalmazra nem áll elő  $M_1 \cup M_2 \cup M_3$  alakban, ahol az  $M_i$ -k párosítások.



A kapcsolat a párosítások és az élszínezések között az, hogy egy gráf jó színezésében az azonos színű élek egy párosítást alkotnak a gráfban. Tehát jó színezés keresése ekvivalens az élhalmaz párosításokra történő osztályozásával. Azaz állításunk ekvivalens azzal, ha  $G$  3-reguláris, 2-szeresen élösszefüggő, síkgráf, akkor  $\chi_e(G) = 3$ .

A továbbiakhoz fel kell idéznünk a síkrarajzolt gráfokról és duálisukról a BSc-s Kombinatorika kurzusban tanultakat. A következő ábrán egy síkrarajzolt gráfot (kék) és duálisát (piros) láthatjuk.



Az ábrán látható lila csillagok párbaállítják az eredeti és duális gráf éleit.

A következő táblázatban összefoglaljuk síkrarajzolt gráf és duálisa közötti sokrétű kapcsolatot.

EREDETI	DUÁLIS
$G$ síkra rajzolt gráf	$G^*$ síkra rajzolt gráf
tartományok/országok	csúcsok/fővárosok
élek	élek
közös határéllal rendelkező (szomszédos) tartományok	szomszédos csúcsok
tartományszínezés	csúcsszínezés
jó tartományszínezés (szomszédos tartományok különböző színűek)	jó csúcsszínezés
jó színezhetőség feltétele: nincs olyan él, amely mindkét oldalán ugyanaz a tartomány fekszik	jó színezhetőség feltétele: nincs hurokél
csúcsok	tartományok
egy csúcsban összefutó élek	egy tartományt határoló élek
fokszám	határ bejárásának hossza

Négy-szín-tétel (4CT): kétszeresen élösszefüggő síkra rajzolt gráf tartományai négy színnel jól színezhetők	Négy-szín-tétel (4CT): hurokélmentes síkra rajzolt gráf csúcsai négy színnel jól színezhetők
Színezés esetén feltehető: $G$ három-reguláris	Színezés esetén feltehető: minden tartomány háromszög (gráfunk triangulált)

Megjegyezzük, hogy 3-regularitás esetén a mohó algoritmus minden gráfot jól 4-csúcsszínez. Illetve duálisan triangulált síkrarajzolt gráf tartományai nyilvánvalóan jól 4-színezhetők.


**2. Tétel.** *A következők ekvivalensek:*

(i) *Ha  $G$  3-reguláris, 2-szeresen élösszefüggő síkgráf, akkor  $\chi_e(G) = 3$ .*

(ii) *4CT.*

**Bizonyítás.** (i) $\Rightarrow$  a 4CT tartományszínezési verziója 3-reguláris gráfokra. Legyen  $G$  egy a síkra szépen lerajzolt 3-reguláris kétszeresen élösszefüggő gráf.

Tudjuk, hogy  $G$  élhalmaza  $M_1, M_2, M_3$  teljes párosítások uniója. Legyen  $M_1 + M_2$  az  $M_1 \cup M_2$  élek által meghatározott feszítő részgráf  $G$ -ben.  $M_1 + M_2$  egy 2-reguláris részgráf, azaz komponensei körök. Nyilván a részgráfunknak is szépen lerajzolt és könnyen látható, hogy az  $M_1 + M_2$  tartományai jól színezhetők két színnel (például a komponensek száma vonatkozó teljes indukcióval). Legyen ez a két szín „piros” és „kék”. Hasonlóan  $M_1 + M_3$  tartományai is jól színezhetők két színnel. Legyen ez „világos” és „sötét”.



Így a síkot kétszer is kiszíneztük, speciálisan a  $G$  gráf lerajzolásának minden tartománya kétszer is színt kapott. Egy tartomány kapott színpárja négyféle lehet: „világoskék”, „világospiros”, „sötétkék”, „sötétpiros”. Ez egy jó 4-színezése

$G$ -tartományainak, mivel bármelyik két szomszédos tartomány  $M_1 + M_2$ -ben vagy  $M_1 + M_3$ -ben is különböző tartományba esik, így színeiknek már ezen komponense is megkülönbözteti őket.




A 4CT tartományszínezési változata 3-reguláris gráfokra  $\Rightarrow$  (i): Tehát tudjuk, hogy a  $G$  kétszeresen élösszefüggő, 3-reguláris síkgráf tartományait jól 4-színezhetjük. Legyen 1, 2, 3, 4 a felhasznált színek.

Legyen

$$M_1 := \{e \in E(G) \mid e \text{ két oldalán } 1, 2 \text{ vagy } 3, 4 \text{ színt látjuk}\},$$

$$M_2 := \{e \in E(G) \mid e \text{ két oldalán az } 1, 3 \text{ vagy } 2, 4 \text{ színt látjuk}\},$$

$$M_3 := \{e \in E(G) \mid e \text{ két oldalán az } 1, 4 \text{ vagy } 2, 3 \text{ színt látjuk}\}.$$



Belátjuk, hogy ekkor  $M_1, M_2, M_3$  teljes párosítások  $G$ -ben és diszjunktak.

A diszjunkttság triviális a definíciókból.

Először azt igazoljuk, hogy  $M_1, M_2, M_3$  párosítások: Tegyük fel, hogy  $e, f \in M_i$  valamely  $i = 1, 2, 3$  esetén és az  $x$  csúcshoz illeszkedik  $e$ -re és  $f$ -re is.  $x$ -ben három tartomány fut össze:  $\tau_1, \tau_2, \tau_3$ . Ezek különböző színűek. Így  $e$  és  $f$  nem lehet ugyanabban az  $M_i$  élhalmazban.

Végül  $M_1 \cup M_2 \cup M_3 = E(G)$ . Valóban, úgy definiáltuk az  $M_i$ -ket, hogy bármely két szín találkozik egy  $e$  él két oldalán az valamelyik  $M_i$  halmaz definíciójának eleget tesz. (A  $\binom{4}{2} = 6$  lehetőség mindegyike szerepel a három definícióban.)


Ebből adódik az állítás. ■

## 2. Gráfok él-kromatikus száma


**Emlékeztető.**  $\Delta(G) := \max_{x \in V(G)} d(x)$ , a  $G$  gráf maximális fokszáma.

Nyilvánvalóan  $\Delta(G) \leq \chi_e(G)$ . Az alábbi példák mutatják, hogy az egyenlőtlenség két oldala között lehet különbség.


**Példa.**  $C_{2k+1}$  páratlan kör ( $k \in \mathbb{Z}^+$ ). Könnyen látható, hogy  $\Delta(C_{2k+1}) = 2$  és  $\chi_e(C_{2k+1}) = 3$ . Az alábbi ábra a  $k = 4$  esetet mutatja.



**Példa.**  $K_{2k+1}$  páratlan pontú teljes gráf. Ekkor  $\Delta(K_{2k+1}) = 2k$  és  $\chi_e(K_{2k+1}) = 2k + 1$ . Az alábbi ábra kilenc pont esetén mutat egy optimális élszínezést.



**Példa.** Legyen  $T_k$  az a gráf, amelynek három csúcsa és bármely kettőt  $k$  párhuzamos él köti össze. Ekkor bármely két él szomszédos. Így  $\Delta(T_k) = 2k$  és  $\chi_e(T_k) = 3k$ . Az alábbi ábra a  $k = 3$  esetet mutatja.



Egy gráf élkromatikus számát a maximális fokszámmal már korlátoztuk alulról ( $\Delta(G) \leq \chi_e(G)$ ). A következő két tétel felező korlátot is ad.

**3. Tétel (Shannon tétele).** Legyen  $G$  hurokél-mentes gráf. Ekkor

$$\chi_e(G) \leq \frac{3}{2}\Delta(G).$$

**4. Tétel (Vizing tétele).** Legyen  $G$  egyszerű gráf. Ekkor

$$\chi_e(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

**Bizonyítás.** Adott egy  $G$  egyszerű gráf. Be kell látnunk, hogy élei jól színezhetők a  $P = \{1, 2, \dots, \Delta(G) + 1\}$  palettával.

Legyen  $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$  és legyen  $G_i := G|_{\{v_1, \dots, v_i\}}$ .  $i$ -re vonatkozó teljes indukcióval belátjuk az állítást  $G_i$ -re. Bizonyításunk konstruktív lesz, azaz  $G_i$  egy jó-él-színezéséből megkonstruálunk  $G_{i+1}$  jó-él-színezését. Azaz  $G_i$  élszínezését kiterjesztjük a  $v_{i+1}$ -re illeszkedő  $G_i$ -hez haladó élekre (amik kezdetben színezetlenek). Legyen  $F$  a  $G_i$  és  $v_{i+1}$  közötti élek halmaza, így  $|F| = d|_{G_{i+1}}(v_{i+1}) =: d$ .

$G_i$  élszínezésének kiterjesztése fázisokban történik. Legyen  $H := \{\text{színezetlen élek}\}$ . Kezdetben  $H = F$ . A kiterjesztés során a  $H$  halmaz élei egyenként színt kapnak. Így  $|H|$  csökken, amíg  $H = \emptyset$  lesz. Ekkor térünk át a következő,  $v_{i+2}$  csúcsra.

Legyen  $O := \{F\text{-beli élek, amiknek már osztottunk színt}\}$ . Azaz  $O \cup H = F$  és  $|O \cup H| = |O| + |H| = d$ .

Minden  $H$ -beli  $e$  élhez tartozik egy lehetséges színek halmaza. Azaz az aktuális színezésben megnézzük a két végpontjára illeszkedő színezett élek színeit (ezek  $T(e)$  halmaza tiltott szín számára).  $L(e) = P - T(e)$ , azaz a palettánk nem tiltott színeinek halmaza.

Kezdetben minden  $e \in H = F$  élre  $|L(e)| \geq 2$ . Valóban egy  $xv_{i+1} \in H = F$  él esetén csak az  $x$ -re  $G_i$ -ben illeszkedő élek színei tiltottak. Ezen élek száma  $d|_{G_i}(x) \leq d(x) - 1 \leq \Delta(G) - 1$ . Így  $|L(e)| = |P| - |\{x\text{-re vagy } v_{i+1}\text{-re illeszkedő színezett éle színei}\}| \geq \Delta(G) + 1 - (\Delta(G) - 1) = 2$ .

Az  $L(e)$  halmazokból kiválasztunk egy preferált részt, amit  $P(e)$ -vel jelölünk. Azaz  $P(e) \subset L(e)$ , azaz  $P(e)$  mindegyik eleme alkalmas szín  $e$  színezésére. Definiáljuk az alábbi  $(\star)$  tulajdonságot, amit a kiterjesztés során végig megőrzünk:

- $(\star)$  Mindegyik  $P(e)$  egy- vagy kételemű, továbbá maximum egy  $H$ -beli élre lesz preferált színhalmaza egyelemű.

Ha  $e$  egy olyan él, amely preferált színhalmaza egyelemű, akkor kivételes élnek nevezük  $e$ -t. Kivételes élekből vagy egy van vagy egy sincs.

Most lássuk a kiterjesztés legegyszerűbb esetét:

**Mohó eset:** Van olyan  $s$  szín, ami egyetlen preferált halmazban szerepel. Ha  $s \in P(e)$  ( $e \in H$ ), akkor a korábbi színezés megtartása mellett  $e$ -nek az  $s$  színt adjuk.  $H - e$  lesz a színezetlen élek új halmaza. Egy színezetlen  $f$  élre  $L(f) = L(e) - \{s\}$ .  $s$  egyedisége miatt megtarthatjuk a régi  $P(e)$  halmazokat.

Sajnos ezt a mohó esetet nem használhatjuk mindig.

**Nem mohó eset:** A preferált színek halmazaiban előforduló színek mindegyike több preferált halmazban is szerepel. Azaz  $s \in \bigcup_{e \in H} P(e)$  esetén  $s$  legalább kettő  $P(e)$ -ben szerepel.

Először igazolunk egy lemmát a nem mohó esetről.

**5. Lemma.** A nem mohó esetben van olyan  $\sigma$  szín, amit nem osztottunk ki  $O$  elemein, de a preferált színek között sincs ott. Azaz  $\sigma \notin c(O) = \{c(e) : e \in O\}$  és  $\sigma \notin \bigcup_{e \in H} P(e)$ .

**Lemma bizonyítása:** Legyen  $c(O)$  az  $F$  elemein eddig kiosztott színek halmaza, azaz az  $O$ -beli élek színeinek halmaza.  $O$  elemei összefutnak  $v_{i+1}$ -ben, azaz a színeik különbözőek,  $|c(O)| = |O|$ . A nem mohó esetben

$$\left| \bigcup_{e \in H} P(e) \right| \leq \frac{\sum_{e \in H} |P(e)|}{2} \leq 2 \frac{|H|}{2} = |H|.$$

Azaz  $c(O)$  és  $\bigcup_{e \in H} P(e)$  együtt is egy legfeljebb

$$|O| + |H| = |F| = d = d_{G_{i+1}}(v_{i+1}) \leq \Delta(G)$$


elemű színhalmazt adnak. Azaz palettánknak garantáltan lesz szabad színe. Q.e.d.

Legyen  $c_1$  egy a lemma által garantált szín. Legyen  $c_2$  az a szín, amelyre  $\{c_2\}$  a kivételes él preferált színhalmaza, illetve tetszőleges szín egy preferált halmazból, amennyiben nincs kivételes él. Legyen  $f = xv_{i+1}$  az az él, amely a kivételes él, vagy amennyiben ilyen nincs, egy olyan él amely preferált színhalmazában szerepel  $c_2$ . Mindenképpen  $c_2 \in P(f)$ .

$G_{i+1}$ -ből emeljük ki a  $c_1$  és  $c_2$  színű éleket: Összes  $V(G_{i+1})$  csúcs és a  $c_1, c_2$  színű élek grájában minden fok legfeljebb 2, azaz a komponensek színalternáló utak vagy körök.

Az  $x$  csúcs komponense szükségszerűen út:  $c_2 \in P(f)$  és  $P(f)$  definíciója miatt  $x$ -re nem illeszkedik  $c_2$  színű él. Legyen ez egy  $U$   $xy$ -út, amiben  $x$ -re maximum egy  $c_1$  színű él illeszkedik (elképzélhető, hogy  $x$ -re nem illeszkedik sem  $c_1$ , sem  $c_2$  színű él sem).

$U$  mentén cseréljük fel a színeket! Ekkor megmarad a színezés jó mivolta. Valamint  $f$ -re már nem illeszkedik  $c_1$  színű él, azaz kaphatja a  $c_1$  színt.



Az  $L(e)$  halmazokat is újra kell értékelni: Azon éleknek, amelyek nem az  $U$  út valamelyik csúcsába vezetnek a lehetséges színhalmaza nem változik. Azon éleknek, amelyek az  $U$  út köztes csúcsába vezetnek szintén nem változik a lehetséges színhalmazuk!

Baj akkor van, ha  $v_{i+1}$ -ből vezet egy  $g$  él  $y$ -ba ( $y \neq x$ ).  $g$  nem volt kivételes él, tehát ha  $P(g) \leftarrow P(g) - \{c_2\}$  változtatást hajtjuk végre, akkor  $P(g)$  egyeleművé változik vagy kételemű marad. A  $(\star)$  tulajdonság mindenképpen megmarad! ■

**Megjegyzés.** A bizonyításból egy algoritmus is kiolvasható, ami egyszerű gráfokat a Vizing-korlát méretű palettával jól-élszínez.