

## 1. (Csúcs)színezések alapfogalmai

Emlékeztetőként idézzünk fel néhány korábban tanult definíciót és tételt.

**Definíció.** Egy  $c : V(G) \rightarrow \mathbb{N}^+$  leképezést a  $G$  gráf egy (csúcs)színezésének nevezzük. A  $c(v)$  „szám” a  $v$  csúcs színe.

**Definíció.** A  $G$  gráf egy színezése jó színezés, ha minden  $e \in E(G)$  élre  $e = uv$  esetén  $c(u) \neq c(v)$ .

Nyilván egy  $e = vv$  hurokél megakadályozza a jól színezhetőséget. Míg hurokél hiánya mellett a „minden él legyen különböző színű” egy jó színezés. Párhuzamos élek a közös végpontpárjukra vonatkozó „legyenek különböző színűek” feltételt ismétlik. Így a csúcs színezési problémákban felesleges egy él mellett szereplő párhuzamos élpárjait szerepeltetni. Ebben a fejezetben egyszerű gráfokkal dolgozunk, tehát itt MINDEN GRÁFON EGYSZERŰ GRÁFOT FOGUNK ÉRTENI.

**Definíció.** A  $G$  gráf egy színezése  $k$ -színezés, ha a felhasznált színek száma legfeljebb  $k$ .

**Definíció.** Egy  $G$  gráf kromatikus száma

$$\chi(G) = \min \{k : G\text{-nek létezik jó } k\text{-színezése}\}.$$

**Definíció.** A  $G$  gráf esetén egy  $F \subset V(G)$  csúcshalmazt független ponthalmaznak nevezünk, ha bármely két  $F$ -beli pont között sincs él.

**Definíció.**  $\alpha(G) = \max \{|F| : F \text{ független ponthalmaz } G\text{-ben}\}.$

**Definíció.** A  $G$  gráf esetén egy  $K \subset V(G)$  csúcshalmazt klikknek nevezünk, ha bármely két  $K$ -beli pont között van él.

**Definíció.**  $\omega(G) = \max \{|K| : K \text{ klikk } G\text{-ben}\}.$

**Megjegyzés.** Tetszőleges  $G$  gráfra  $\chi(G) \geq \omega(G)$ . Ez következik abból, hogy egy klikkben minden csúcsnak más-más színt kell adnunk jó színezésnél. Egy jó színezésnél az azonos színű csúcsok egy független ponthalmazt alkotnak. Így egy jó csúcsszínezés felfogható mint  $V(G)$  független halmazokra való osztályozása.

## 2. Nem $k$ -színezhető gráfok


Emlékeztetőül megint idézzünk fel néhány egyszerű állítást:

- $G$  nem 1-színezhető  $\iff G$ -ben létezik él.
- $G$  nem 2-színezhető  $\iff G$ -ben létezik páratlan hosszú kör.
- $G$  nem 3-színezhető  $\iff G$ -nek részgráfja a  $K_4$  ( $K_4 = 4$  csúcsú teljes gráf).

**Megjegyzés.** Az utolsó állításában a  $\implies$  irány nem teljesül, sőt nem ismert „jó” jellemzés a nem-3-színezhetőség problémájára.

Tehát  $K_4$  részgráf felmutatása egy jó módszer nem-3-színezhetőség bizonyítására. (Jó és gyors, hatásos.) De a módszer nem teljes. A következőkben Hajós György egy teljes módszerét ismertetjük annak igazolására, hogy egy gráf nem  $k$ -színezhető.

**Definíció.** A következőkben definiálunk három gráfokon elvégezhető operációt.  
 (Op1) Bővítés: Él vagy csúcs hozzáadása a gráfhoz. Legyen  $G^+$  a  $G$ -ből kapott gráf.  
 (Op2) Csúcsösszevonás: Két nem szomszédos csúcs  $(x, x')$  azonosítása. Ha  $x$  csúcs szomszédosságát  $N(x)$ -szel jelöljük, akkor az összevonással keletkezett pont szomszéd-sága megegyezik  $N(x) \cup N(x')$ -vel. Legyen  $\tilde{G}$  a  $G$ -ből kapott gráf.



1. ábra.

(Op3) Hajós-operáció: Legyen  $e \in E(G), e' \in E(G'), \vec{e} = xy, \vec{e}' = x'y'$ . Az operáció eredményét jelöljük  $H = \text{Hajós}_{\vec{e}, \vec{e}'}(G, G')$ -val.  $V(H) = (V(G) - \{x\}) \cup (V(G') - \{x'\}) \cup \{x\}$ ,  $E(H) = (E(G) - \{e\}) \cup (E(G') - \{e'\}) \cup \{xx'\}$ , az illeszkedés pedig természetes. A formális definíció megértését a mellékelt ábrán tesztelni lehet.

**1. Lemma.** Ha  $G$  és  $G'$  nem  $k$ -színezhető, akkor  $G^+, \tilde{G}$  és  $\text{Hajós}(G, G')$  sem  $k$ -színezhető.

Az előző Lemma nyilvánvalóan ekvivalens a következővel:

**2. Lemma.** *Ha  $G^+$  és  $\tilde{G}$   $k$ -színezhető, akkor  $G$  is az. Ha  $\text{Hajós}(G, G')$   $k$ -színezhető, akkor  $G$  vagy  $G'$  is az.*

**Megjegyzés.**  $G^+$  a Lemma nyilvánvaló, ugyanis több objektum esetén nehezebbé válik a színezés.  $\tilde{G}$  és  $\text{Hajós}(G, G')$  esetén is egyszerű az állítás.


**Definíció.** A  $G$  gráf Hajós-konstruálható  $K_{k+1}$ -ekből, ha létezik olyan  $G_1, G_2, \dots, G_l$  sorozat, hogy mindegyik  $G_i$  vagy  $K_{k+1}$ , vagy a korábbi gráfokból a fent leírt három operáció valamelyikével nyerhető.

**3. Következmény.** *Ha  $G$  Hajós-konstruálható, akkor  $G$  nem  $k$ -színezhető.*

A következmény bizonyítása teljes indukcióval történhet.

Nyilván  $G_1$  mindig csak  $K_{k+1}$  lehet,  $G_2$  pedig csak  $K_{k+1}$  vagy egy olyan gráf, ami  $K_{k+1}$ -ből (Op1) operációval kapható ((Op2) nem alkalmazható teljes gráfokra, (Op3)-hoz szükséges két korábbi gráf).

**Példa.** A Hajós-séma alapján bizonyítsuk be, hogy az 5-kerék nem 3-színezhető.



2. ábra.

Először a  $G_1$  és  $G_2$  gráfokon (két négy pontú teljes) hajtjuk végre az (Op3) operációt. Az így kapott  $G_3$  gráf nem 3-színezhető. A  $G_3$  gráfon pedig az (Op2) operációt hajtjuk végre, és az eredmény a szintén nem 3-színezhető  $G_4$  gráf lesz, ami egy 5-kerék.

**4. Tétel Hajós György.**  *$G$  akkor és csak akkor nem  $k$ -színezhető, ha  $G$  Hajós-konstruálható  $K_{k+1}$ -ből.*


**Bizonyítás.** Az egyik irányt már láttuk. A tétel nehezebbik „felét” pedig indirekt módon bizonyítjuk.

Tegyük fel, hogy létezik ellenpélda, azaz létezik olyan  $G$  nem  $k$ -színezhető gráf, ami nem Hajós-konstruálható. Tegyük a  $G$  gráfot telítetté, azaz adjunk hozzá éleket mindaddig, amíg az ellenpéldára vonatkozó két tulajdonság teljesül. Így kapjuk a  $G^{tel}$  gráfot. A telítés során a nem  $k$ -színezhetőség megmarad. Így  $G^{tel}$  gráfhoz éleket adva egy Hajós-konstruálható gráfot kell kapnunk.

A bizonyítás folytatása előtt szükségünk van néhány definícióra, illetve egy nagyon fontos lemmára. A Hajós-tétel bizonyítását a lemma bizonyítása után folytatjuk.

**Definíció.** Egy  $G$  gráf teljes  $r$ -részes gráf, ha a  $V(G)$  csúcshalmaz  $r$  darab osztály uniója, és az  $E(G)$  élhalmaz pedig az összes keresztél az osztályok között.

**Példa.** 4-részes teljes gráf például a következő:




3. ábra.

**Definíció.** A teljes  $r$ -részes gráf ekvivalens definíciója a következő: az „egyenlőnek vagy nem összekötöttek lenni” reláció ekvivalenciareláció, továbbá az ekvivalencia-reláció osztályainak száma  $r$ .


**5. Lemma.**  $G^{tel}$  teljes  $r$ -részes gráf.

**Bizonyítás.** A bizonyítás indirekt módon történik. Tegyük fel, hogy  $G^{tel}$  nem teljes  $r$ -részes gráf, azaz az „egyenlőnek vagy nem összekötöttek lenni” reláció nem ekvivalencia. Ekkor nyilván csak a tranzitivitás sérülhet, azaz léteznek olyan  $x, y, z \in V(G^{tel})$  különböző pontok, hogy  $xy, xz \notin E(G^{tel})$ , de  $yz \in E(G^{tel})$ . Ekkor az  $xy$  és  $xz$  él hiánya kétféle módot is ad a  $G^{tel}$  telített gráf bővítésére. mindkét esetben a telítettség definíciója alapján olyan gráfot kapunk, amely Hajós-konstruálható. Az egyértelműség végett a második gráf (amelyet az  $xz$  él hozzáadásával kapunk  $G^{tel}$ -ből) csúcsait vesszőkkel látjuk el.



4. ábra.

Ha erre két gráfra végrehajtjuk a  $Hajós_{xy,x'z'}(G_1^{tel}, G_2^{tel})$  operációt, akkor a következő gráfot kapjuk:



5. ábra.

A kapott gráfban minden  $G_1^{tel}$ -beli  $a$  pont azonosítható a neki megfelelő  $G_2^{tel}$ -beli  $a'$  ponttal ((Op2)). Így megkapjuk a  $G^{tel}$  gráfot. Ez azt mutatja, hogy  $G^{tel}$  Hajós-konstruálható, és ez ellentmondás. ■

*Hajós-tétel bizonyításának folytatása.* Emlékezzünk, hogy a tételt indirekt módon kezdtük bizonyítani, azaz feltettük, hogy létezik olyan  $G$  nem  $k$ -színezhető gráf, ami


nem Hajós-konstruálható. Telítettük a  $G$  gráfot, és az így kapott  $G^{tel}$  gráfról beláttuk, hogy teljes  $r$ -résztes gráf. Folytatva a bizonyítást két eset lehetséges.

1. eset: Ha  $r \geq k + 1$ , akkor  $G^{tel}$  gráfnak létezik egy  $k + 1$  pontú teljes részgráfja, ugyanis minden osztályból egy tetszőleges csúcsot kiválasztva egy ilyen részgráfot kapunk. A részgráfság miatt  $G^{tel}$  megkapható  $K_{k+1}$ -ből egyszerű bővítésekkel, azaz az (Op1) operáció többszöri alkalmazásával. Ez viszont ellentmond annak, hogy  $G^{tel}$  nem Hajós-konstruálható.
2. eset: Ha pedig  $r \leq k$ , akkor nyilvánvaló, hogy  $G^{tel}$  gráf  $k$ -színezhető, ami szintén ellentmondás.

Mindkét esetben ellentmondásra jutottunk, így ezzel a Hajós-tétel bizonyítása véget ért. ■

### 3. A kromatikus szám és a derékbőség paraméter

**6. Tétel (BSc).** *Létezik olyan  $\{G_n\}$  gráfsorozat, melyre teljesül, hogy  $\omega(G_n) = 2$  (azaz  $G$  háromszögmentes), illetve  $\chi(G_n) \rightarrow \infty$ , ha  $n \rightarrow \infty$ .*



6. ábra.

Vegyünk egy olyan gráfot, amelyben nincs háromszög. Tegyük fel, hogy ennek a gráfnak egy pontjában állunk. Ez a pont a szomszédaival együtt egy csillagot feszít ki, ami az eredeti gráf részgráfja. Egy ilyen helyzet látható a fenti ábrán. Ezen lokális részeket látva semmilyen nehézséget nem érzékelünk a színezési problémával kapcsolatban. A gráf globális színezéséhez szükséges színszám tetszőlegesen nagy

lehet. Ez rávilágít a probléma nehézségére. A nehézség formálisan is igazolható: ez az egyik alap  $\mathcal{NP}$ -teljes probléma (szerepel Richard Karp 1972-ben összegyűjtött 21  $\mathcal{NP}$ -teljes problémája között).

**Definíció.** Tetszőleges  $G$  gráf esetén rögzítsünk egy  $o \in V(G)$  csúcsot, és tetszőleges  $r \in \mathbb{N}^+$  esetén definiáljuk a következő részgráfot:

$$B(o, r) = G \mid_{\{v \in V : d(o, v) \leq r\}},$$

ahol  $d(o, v)$  a legrövidebb  $ov$  út hosszát jelöli.

Az, hogy minden  $B(o, 1)$  csillag az azzal ekvivalens gráfunkban nincs háromszög.

Erősíthetjük a lokális feltételünket azzal, hogy nagyobb sugár esetén követeljük meg, hogy minden gömb egyszerű legyen.

Hasonlóan  $B(o, r)$ -re tett egyszerűségi feltételek megfogalmazhatók globálisan: Az hogy minden  $o$  csúcsra  $B(o, r)$  páros az azzal ekvivalens, hogy  $G$ -ben nem létezik  $2r + 1$  hosszú, vagy rövidebb páratlan kör. Az, hogy minden  $o$  csúcsra  $B(o, r)$  fa (körmentes, hisz a gömbök összefüggősége nyilvánvaló) az azzal ekvivalens, hogy  $G$ -ben nem létezik  $2r + 1$  hosszú, vagy rövidebb kör.

**Definíció.** A  $G$  gráf derékbőségének (girth) nevezzük a következő gráfparamétert

$$g(G) = \min \{l : G\text{-ben létezik } l \text{ hosszú kör}\}.$$

A következőkben arra keressük a választ, hogy, ha adott egy  $\gamma$  és egy  $\tau$  pozitív egész szám, akkor létezik-e olyan  $G$  gráf, melyre  $g(G) \geq \gamma$  és  $\chi(G) \geq \tau$ . Azaz az erősített lokális egyszerűség mellett is elképzelhető-e globálisan színezésre bonyolult gráf. A válasz igen.

**7. Tétel (Erdős Pál).** *Bármely  $\gamma, \tau \in \mathbb{N}^+$  számokhoz létezik olyan  $G$  gráf, amelyre  $g(G) \geq \gamma$  és  $\chi(G) \geq \tau$ .*

Nem konstruktív bizonyítást adunk a tételre. (Konstruktív bizonyítások is léteznek, de azok nehezebbek.) A következőkben egy valószínűségszámítási módszeren alapuló bizonyítást mutatunk meg.

**Bizonyítás.** Legyen  $V$  egy  $n$  elemű csúcshalmaz. **Most csak annyit kell tudnunk  $n$ -ről, hogy elég nagy.** A továbbiakban is fogunk ilyen előre kijelentett „ígéreteket” tenni, és ezeket vastag betűtípussal fogjuk jelölni. Majd a bizonyítás végén megmutatjuk, hogy ezek az ígéretek valóban teljesülhetnek/kielégíthetők. Bármely  $V$ -beli pontpárra behúzzuk a közöttük lévő élt  $p$  valószínűséggel (azaz az össze nem kötöttség valószínűsége  $1 - p$ ). **A  $p$  értékét később adjuk meg  $n$  függvényében.** Persze ezzel azt is ígérjük, hogy  $0 < p < 1$ . Ezzel a módszerrel felépítünk egy gráf értékű valószínűségi változót. Ez az Erdős—Rényi-féle véletlengráf modell, jelölése  $\underline{G}_{n,p}$ .

Jelölje  $\mathcal{A}_t$  azt az eseményt, hogy  $\alpha(G) \leq t$ . Ez ekvivalens azzal, hogy  $G$ -ben nincs  $t+1$  elemű független ponthalmaz. Jelölje  $\mathcal{F}_R$  pedig azt az eseményt, hogy  $R$  független ponthalmaz  $G$ -ben. Ekkor

$$\mathbb{P}(\mathcal{F}_R) = (1-p)^{\binom{|R|}{2}}.$$

Érvényes továbbá az alábbi összefüggés:

$$\mathbb{P}(\mathcal{A}_t) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{\substack{R \subseteq V \\ |R|=t+1}} \mathcal{F}_R\right).$$

Valóban, korábbi megjegyzéseink alapján  $\mathcal{A}_t$  az  $\bigcup_{R \subseteq V, |R|=t+1} \mathcal{F}_R$  esemény komplementere. Felhasználva azt a triviális mértékelméleti tényt, hogy  $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n E_i) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(E_i)$  azt kapjuk, hogy

$$\mathbb{P}(\mathcal{A}_t) \geq 1 - \binom{n}{t+1} (1-p)^{\binom{t+1}{2}}.$$

Felhasználtuk azt is, hogy  $\binom{n}{t+1}$  tag unióját kell nézni, illetve az unió által leírt esemény valószínűségét egy olyan összeggel becsülhetjük, amelyben minden  $\mathbb{P}(\mathcal{F}_R)$  tag értéke közös:  $(1-p)^{\binom{t+1}{2}}$ .

A becslést egyszerűsíthetjük a  $\binom{n}{t+1} < n^{t+1}$  durva és az  $1-p < e^{-p}$  nem annyira durva becslésekkel ( $p$  pozitív és közel lesz 1-hez)

$$\mathbb{P}(\mathcal{A}_t) \geq 1 - n^{t+1} e^{-p \binom{t+1}{2}} = 1 - n^{t+1} e^{-p \frac{t(t+1)}{2}} = 1 - \left[ n e^{-\frac{pt}{2}} \right]^{t+1} = 1 - \left[ e^{\log n - \frac{pt}{2}} \right]^{t+1}.$$

**A  $t$  paramétert a következőkben úgy választjuk majd meg, hogy az egyenlet jobb oldala nagyobb legyen mint  $\frac{1}{2}$ . Legyen  $t = 4 \log n/p$ . Mivel  $n$  tetszőleges nagyra választható ezért az alsó becslésre mint  $1 - o(1)$ -re gondolhatunk.** Az, hogy nagy valószínűséggel az  $\alpha$  paraméter kicsi az azt is jelenti, hogy a kromatikus szám nagy.

Áttérünk egy új gondolatmenetre, amely a derékbőség nagyságának garantálásához vezet. Jelöljük  $\xi_\gamma$ -val azt a valószínűségi változót, amely megadja a  $\gamma$ -nál nem-hosszabb körök számát  $G$ -ben. Keressük ennek a várható értékét. Ehhez vezessük be a

$$\xi_C = \begin{cases} 1, & \text{ha } C \subseteq G_{n,p} \\ 0, & \text{különben} \end{cases}.$$

valószínűségi változót, ahol  $C$  egy lehetséges kör. Ekkor

$$\mathbb{E}(\xi_\gamma) = \mathbb{E}\left(\sum_{C \text{ hossza} \leq \gamma} \xi_C\right) = \sum_{l=3}^{\gamma} \left(\sum_{C \text{ hossza} = l} \mathbb{E}(\xi_C)\right). \quad (1)$$



Ha a  $C$  hossza  $\ell$ , akkor  $\mathbb{E}(\xi_C) = p^\ell$ . Hány darab lehetséges  $\ell$  hosszú kör van? A válasz  $\binom{n}{\ell} \frac{(\ell-1)!}{2}$ , ugyanis a csúcsokat  $\binom{n}{\ell}$ -féleképpen választhatjuk ki, és ezeket a kiválasztott  $\ell$  pontokat  $\frac{(\ell-1)!}{2}$ -féleképpen rendezhetjük körbe. Felhasználva az

$$\binom{n}{\ell} \frac{(\ell-1)!}{2} = \frac{n(n-1)\dots(n-\ell+1)}{2\ell} \leq \frac{n^\ell}{2\ell} \leq \frac{n^\ell}{6}$$

egyenlőtlenséget, felírhatunk  $\mathbb{E}(\xi_\gamma)$ -ra egy felső becslést:

$$\mathbb{E}(\xi_\gamma) \leq \sum_{l=3}^{\gamma} \frac{n^l}{6} p^l = \sum_{l=3}^{\gamma} \frac{n^l p^l}{6} \stackrel{(!)}{\leq} \sum_{l=3}^{\gamma} \frac{(np)^l}{6} \leq \gamma \frac{(np)^\gamma}{6}.$$

A becslésnél feltettük, hogy  $np \geq 1$  (az 1-nél nagyobb kvóciensű geometriai sorozat monoton nő, elemei az utolsóval felül becsülhetők). Továbbá  $p$ -t úgy fogjuk megválasztani, hogy  $\gamma(np)^\gamma/6 < n/4$  teljesüljön. Pontosabban legyen  $p = n^\omega/n$ , ahol  $0 < \omega < 1/\gamma$ . Így  $\gamma(np)^\gamma/6 = o(n)$ . A fenti választások után a Markov-egyenlőtlenségből adódik, hogy

$$\mathbb{P}\left(\xi_\gamma < \frac{n}{2}\right) > \frac{1}{2}.$$

Ezek után felírhatjuk a  $\mathbb{P}(\mathcal{A}_t \wedge (\xi_\gamma < \frac{n}{2})) > 0$  megállapítást, mivel a  $\wedge$  két oldalán álló események valószínűsége külön-külön legalább  $\frac{1}{2}$ .

Ebből következik, hogy létezik olyan  $G$  gráf, amelynek  $n$  csúcsa van, és amelyre teljesül a következő két állítás:

- A  $G$ -ben lévő  $\gamma$ -nál nem hosszabb körök száma  $\frac{n}{2}$ -nél kevesebb.
- $\alpha(G) \leq t = 4 \log n/p = 4(\log n)n^{1-\omega}$ .

Vegyük ezt a  $G$  gráfot, és minden  $\gamma$ -nál nem hosszabb körből hagyjunk el egy-egy pontot, jelölje az így kapott gráfot  $G_0$ . Ekkor  $G_0$ -ban nincs legfeljebb  $\gamma$  hosszúságú kör ( $g(G_0) \geq \gamma$ ), csúcsszáma legalább  $\frac{n}{2}$ , azaz  $|V(G_0)| \geq \frac{n}{2}$ , és  $\alpha(G_0) \leq t$ . Továbbá igaz a

$$\chi(G_0) \geq \frac{n/2}{t} = \frac{n}{2t} = n^\omega/8 \log n \geq \tau$$

becslés is ( $n$ -et elég nagynak választottuk). ■