

# $\mathcal{MP}(G)$ tesztelése

Hajnal Péter

2020. tavasz

# Emlékeztető

# Emlékeztető

## Definíció (párosítási politóp)

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv}\{\chi_M : M \text{ párosítás } G\text{-ben}\}.$$

# Emlékeztető

## Definíció (párosítási politóp)

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv}\{\chi_M : M \text{ párosítás } G\text{-ben}\}.$$

## Edmonds-féle politóp tétel)

$\mathcal{MP}(G)$  pontosan azokat az  $(x_e)_{e \in E} \in \mathbb{R}^{E(G)}$  vektorokat tartalmazza, amelyek a következő három típusú egyenlőtlenséget teljesíti:

$$(E_e) : \quad x_e \geq 0 \quad \forall e \in E(G)$$

$$(E_v) : \quad \sum_{e: v \in e} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V(G)$$

$$(E_S) : \quad \sum_{e \subseteq S} x_e \leq \frac{|S| - 1}{2} \quad \forall S \in \mathcal{O}$$

# A problémák

# A problémák

A  $\mathcal{MP}(\mathcal{G})$  Edmonds-tételbeli leírásban  $|V(G)| + |E(G)| + 2^{|V(G)|-1}$  egyenlőtlenség szerepel. Azaz exponenciálisan sok egyenlőtlenségre van szükség.

# A problémák

A  $\mathcal{MP}(\mathcal{G})$  Edmonds-tételbeli leírásban  $|V(G)| + |E(G)| + 2^{|V(G)|-1}$  egyenlőtlenség szerepel. Azaz exponenciálisan sok egyenlőtlenségre van szükség.

Ezek közül néhány elhagyható lehet (láttuk, hogy  $G$  páros esetén ez lényeges egyszerűsödés lehet), de a poliéder általában bonyolult (a szükséges egyenlőtlenségek száma exponenciális a gráf csúcsainak, éleinek számában).

# Az alapkérdés



# Az alapkérdés

Lehet-e „gyorsan” ellenőrizni, hogy egy adott  $x \in \mathbb{R}^{E(G)}$  vektor  $\mathcal{MP}(G)$  eleme-e?

# Az alapkérdés

Lehet-e „gyorsan” ellenőrizni, hogy egy adott  $x \in \mathbb{R}^{E(G)}$  vektor  $\mathcal{MP}(G)$  eleme-e? Egy kicsit nehezítjük is a problémát:

# Az alapkérdés

Lehet-e „gyorsan” ellenőrizni, hogy egy adott  $x \in \mathbb{R}^{E(G)}$  vektor  $\mathcal{MP}(G)$  eleme-e? Egy kicsit nehezítjük is a problémát:

## Alapkérdés

Keressünk hatékony algoritmust, amely egy adott  $x \in \mathbb{Q}^{E(G)}$  vektorra kiadja azt az igaz információt, hogy  $x$   $\mathcal{MP}(G)$  eleme, vagy egy definiáló egyenlőtlenséget, amit megsért az  $x$  vektor.

# Az alapkérdés

Lehet-e „gyorsan” ellenőrizni, hogy egy adott  $x \in \mathbb{R}^{E(G)}$  vektor  $\mathcal{MP}(G)$  eleme-e? Egy kicsit nehezítjük is a problémát:

## Alapkérdés

Keressünk hatékony algoritmust, amely egy adott  $x \in \mathbb{Q}^{E(G)}$  vektorra kiadja azt az igaz információt, hogy  $x$   $\mathcal{MP}(G)$  eleme, vagy egy definiáló egyenlőtlenséget, amit megsért az  $x$  vektor.

Ezt nevezzük az Edmonds-politóp *tesztelési feladatának*.

# Az alapkérdés

Lehet-e „gyorsan” ellenőrizni, hogy egy adott  $x \in \mathbb{R}^{E(G)}$  vektor  $\mathcal{MP}(G)$  eleme-e? Egy kicsit nehezítjük is a problémát:

## Alapkérdés

Keressünk hatékony algoritmust, amely egy adott  $x \in \mathbb{Q}^{E(G)}$  vektorra kiadja azt az igaz információt, hogy  $x$   $\mathcal{MP}(G)$  eleme, vagy egy definiáló egyenlőtlenséget, amit megsért az  $x$  vektor.

Ezt nevezzük az Edmonds-politóp *tesztelési feladatának*.

A hatékony azt jelenti, hogy  $G$  méretében polinomiális időben. Tehát a naív algoritmus (minden egyenlőtlenségbe helyettesítsük be  $x$  koordinátáit és az ellenőrzések után jelentsük be az eredményt) nem jó.

# A nyilvánvaló rész

# A nyilvánvaló rész

Az Edmonds-politópba esés tesztelésének algoritmusára persze nyilvánvaló módon indítható:

# A nyilvánvaló rész

Az Edmonds-politópba esés tesztelésének algoritmusára persze nyilvánvaló módon indítható:

Az indítás

$(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségek ellenőrzése.



# A nyilvánvaló rész

Az Edmonds-politópba esés tesztelésének algoritmusá persze nyilvánvaló módon indítható:

Az indítás

$(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségek ellenőrzése.

Két lehetőség lehet:

# A nyilvánvaló rész

Az Edmonds-politópba esés tesztelésének algoritmusára persze nyilvánvaló módon indítható:

## Az indítás

$(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségek ellenőrzése.

Két lehetőség lehet:

- Kapunk egy egyenlőtlenséget, amit  $x$  nem teljesít,
- Minden  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenséget teljesít  $x$ .

# A nyilvánvaló rész

Az Edmonds-politópba esés tesztelésének algoritmusá persze nyilvánvaló módon indítható:

## Az indítás

$(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségek ellenőrzése.

Két lehetőség lehet:

- Kapunk egy egyenlőtlenséget, amit  $x$  nem teljesít,
- Minden  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenséget teljesít  $x$ .

Az első esetben készen vagyunk, hiszen ekkor már tudjuk, hogy  $x \notin \mathcal{MP}(G)$  és egy megsértett egyenlőtlenséget is találtunk.

# A nyilvánvaló rész

Az Edmonds-politópba esés tesztelésének algoritmusára persze nyilvánvaló módon indítható:

## Az indítás

$(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségek ellenőrzése.

Két lehetőség lehet:

- Kapunk egy egyenlőtlenséget, amit  $x$  nem teljesít,
- Minden  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenséget teljesít  $x$ .

Az első esetben készen vagyunk, hiszen ekkor már tudjuk, hogy  $x \notin \mathcal{MP}(G)$  és egy megsértett egyenlőtlenséget is találtunk.

Tehát a továbbiakban feltehetjük, hogy az  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségek teljesülnek a tesztelendő  $x$  vektorra.

# Élsúlyozott gráfok

# Élsúlyozott gráfok

Egy új jelölésre, gondolkodásra térünk rá.

# Élsúlyozott gráfok

Egy új jelölésre, gondolkodásra térünk rá.

$x \in \mathbb{R}^E$  azt jelenti, hogy  $x$  egy vektor, koordinátái az élekkel azonosítottak.  $x_e$  az  $e \in E(G)$  élnek megfelelő komponense az  $x$  vektornak.  $x_e$  értelmezhető az  $e$  él súlyának is. A továbbiakban ezt a szemléletet használjuk.

# Élsúlyozott gráfok

Egy új jelölésre, gondolkodásra térünk rá.

$x \in \mathbb{R}^E$  azt jelenti, hogy  $x$  egy vektor, koordinátái az élekkel azonosítottak.  $x_e$  az  $e \in E(G)$  élnek megfelelő komponense az  $x$  vektornak.  $x_e$  értelmezhető az  $e$  él súlyának is. A továbbiakban ezt a szemléletet használjuk.

Tehát  $(x_e)_{e \in E} \in \mathbb{R}^{E(G)}$  egy élsúlyozott gráf.



# Élsúlyozott gráfok

Egy új jelölésre, gondolkodásra térünk rá.

$x \in \mathbb{R}^E$  azt jelenti, hogy  $x$  egy vektor, koordinátái az élekkel azonosítottak.  $x_e$  az  $e \in E(G)$  élnek megfelelő komponense az  $x$  vektornak.  $x_e$  értelmezhető az  $e$  él súlyának is. A továbbiakban ezt a szemléletet használjuk.

Tehát  $(x_e)_{e \in E} \in \mathbb{R}^{E(G)}$  egy élsúlyozott gráf.

A súlyokról feltettük, hogy nemnegatívak. Minden csúcsban az összefutó élek súlyainak összege legfeljebb 1.

# Vektor vs függvény szemlélet

# Vektor vs függvény szemlélet

Az élsúlyozást ugyancsak természetesen egy  $x : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  függvényként elgondolni ( $x$ -ről tudjuk, hogy teljesíti az  $(E_e)$  egyenlőtlenségeket). Tehát  $x(e) = x_e$  a továbbiakban az  $e$  él súlya.

# Vektor vs függvény szemlélet

Az élsúlyozást ugyancsak természetesen egy  $x : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  függvényként elgondolni ( $x$ -ről tudjuk, hogy teljesíti az  $(E_e)$  egyenlőtlenségeket). Tehát  $x(e) = x_e$  a továbbiakban az  $e$  él súlya.

Egy  $F \subset E(G)$  élhalmaz esetén az

$$x(F) = \sum_{e:e \in F} x_e = \sum_{e:e \in F} x(e)$$

jelöléssel élünk.

# Vektor vs függvény szemlélet

Az élsúlyozást ugyancsak természetesen egy  $x : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  függvényként elgondolni ( $x$ -ről tudjuk, hogy teljesíti az  $(E_e)$  egyenlőtlenségeket). Tehát  $x(e) = x_e$  a továbbiakban az  $e$  él súlya.

Egy  $F \subset E(G)$  élhalmaz esetén az

$$x(F) = \sum_{e:e \in F} x_e = \sum_{e:e \in F} x(e)$$

jelöléssel élünk.

Ha  $R \subset V(G)$ , akkor

$$x(R) = \sum_{e:e=xy \in E(G), x,y \in R} x_e = \sum_{e:e=xy \in E(G), x,y \in R} x(e)$$

jelölést is használjuk.

# Vektor vs függvény szemlélet

Az élsúlyozást ugyancsak természetesen egy  $x : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  függvényként elgondolni ( $x$ -ről tudjuk, hogy teljesíti az  $(E_e)$  egyenlőtlenségeket). Tehát  $x(e) = x_e$  a továbbiakban az  $e$  él súlya.

Egy  $F \subset E(G)$  élhalmaz esetén az

$$x(F) = \sum_{e:e \in F} x_e = \sum_{e:e \in F} x(e)$$

jelöléssel élünk.

Ha  $R \subset V(G)$ , akkor

$$x(R) = \sum_{e:e=xy \in E(G), x,y \in R} x_e = \sum_{e:e=xy \in E(G), x,y \in R} x(e)$$

jelölést is használjuk.

A fenti megállapodások elsőre talán zavaróak.  $x(\cdot)$  jelentése függ attól, hogy az  $x$  mögötti zárójelben egy él, egy élhalmaz, vagy egy ponthalmaz szerepel. Vegyük a hozzászokáshoz szükséges időt és

# Észrevétel

## Észrevétel

$2^{|V|}$  darab

$$x(R) := \sum_{e \subseteq R} x_e \leq \frac{|R|}{2} \quad \forall R \in \mathcal{P}(V)$$

egyenlőtlenség mindegyik következménye az  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségeknek.

# Észrevétel

## Észrevétel

$2^{|V|}$  darab

$$x(R) := \sum_{e \subseteq R} x_e \leq \frac{|R|}{2} \quad \forall R \in \mathcal{P}(V)$$

egyenlőtlenség mindegyik következménye az  $(E_V)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségeknek.

Összefoglalva az  $(E_S)$  feltételek „csak” azt jelentik, hogy a fenti becslés (amely minden csúcshalmazra igaz) páratlan elemszámú csúcshalmazok esetén  $1/2$ -del élesíthetők.



# Észrevétel bizonyítása

# Észrevétel bizonyítása

Adjuk össze az

$$\sum_{e \in E: v \in e} x_e \leq 1, v \in R$$

egyenlőtlenségeket.

# Észrevétel bizonyítása

Adjuk össze az

$$\sum_{e \in E: v \in e} x_e \leq 1, v \in R$$

egyenlőtlenségeket.

Az eredmény

$$\sum_{e=uv \in E: u \in R, v \notin R} x_e + 2 \cdot x(R) \leq |R|.$$

# Észrevétel bizonyítása

Adjuk össze az

$$\sum_{e \in E: v \in e} x_e \leq 1, v \in R$$

egyenlőtlenségeket.

Az eredmény

$$\sum_{e=uv \in E: u \in R, v \notin R} x_e + 2 \cdot x(R) \leq |R|.$$

A továbbiakban a

$$\partial R := \{e = uv \in E : u \in R, v \notin R\}, \quad x(\partial R) := \sum_{e=uv \in E: u \in R, v \notin R} x_e$$

jelöléseket használjuk.

# Észrevétel bizonyítása

Adjuk össze az

$$\sum_{e \in E: v \in e} x_e \leq 1, v \in R$$

egyenlőtlenségeket.

Az eredmény

$$\sum_{e=uv \in E: u \in R, v \notin R} x_e + 2 \cdot x(R) \leq |R|.$$

A továbbiakban a

$$\partial R := \{e = uv \in E : u \in R, v \notin R\}, \quad x(\partial R) := \sum_{e=uv \in E: u \in R, v \notin R} x_e$$

jelöléseket használjuk.

Tudjuk, hogy  $x$  komponensei nemnegatívak, így tetszőleges  $R$  csúcshalmazra

$$2 \cdot x(R) < x(\partial R) + 2 \cdot x(R) < |R|, \quad \text{azaz } x(R) < \frac{|R|}{2}.$$

# Az első cél

# Az első cél

Az  $(E_S)$  feltételek tetsztelését tetszőlegesen olyan  $(G, x)$  élsúlyozott gráfra kell ellenőrizni kell, amely  $x$  súlyozására az  $(E_V)$  és  $(E_e)$  feltételeket tudjuk.

# Az első cél

Az  $(E_S)$  feltételek tetsztelését tetszőlegesen olyan  $(G, x)$  élsúlyozott gráfra kell ellenőrizni, amely  $x$  súlyozására az  $(E_V)$  és  $(E_e)$  feltételeket tudjuk.

## 1. Cél

Belátjuk, hogy ha ezt a feladatot olyan nemnegatív vektorok esetén megoldjuk, ahol az összes  $(E_V)$  feltétel egyenlőséggel teljesül, akkor az általános feladat is megoldható.



# Az első cél

Az  $(E_S)$  feltételek tesztelését tetszőlegesen olyan  $(G, x)$  élsúlyozott gráfra kell ellenőrizni, amely  $x$  súlyozására az  $(E_V)$  és  $(E_e)$  feltételeket tudjuk.

## 1. Cél

Belátjuk, hogy ha ezt a feladatot olyan nemnegatív vektorok esetén megoldjuk, ahol az összes  $(E_V)$  feltétel egyenlőséggel teljesül, akkor az általános feladat is megoldható.

Adott egy nemnegatív élsúlyozás, amelyről feltesszük, hogy minden csúcsra a rá illeszkedő élek súlyainak összege legfeljebb 1.

# Az első cél

Az  $(E_S)$  feltételek tetsztelését tetszőlegesen olyan  $(G, x)$  élsúlyozott gráfra kell ellenőrizni kell, amely  $x$  súlyozására az  $(E_V)$  és  $(E_e)$  feltételeket tudjuk.

## 1. Cél

Belátjuk, hogy ha ezt a feladatot olyan nemnegatív vektorok esetén megoldjuk, ahol az összes  $(E_V)$  feltétel egyenlőséggel teljesül, akkor az általános feladat is megoldható.

Adott egy nemnegatív élsúlyozás, amelyről feltesszük, hogy minden csúcsra a rá illeszkedő élek súlyainak összege legfeljebb 1.

Egy  $(G, x)$ -ből konstruálunk egy  $\tilde{G}, \tilde{x}$  párt, amely már az  $(E_V)$  egyenlőtlenségeket egyenlőséggel teljesíti (minden csúcsban az ott összefutó élek súlyainak összege pont 1).

# A redukció

# A redukció

- Vegyük a  $G$  gráfot, illetve egy másolatát  $G'$ -t.

# A redukció

- Vegyük a  $G$  gráfot, illetve egy másolatát  $G'$ -t.
- Az „iker csúcsok” között tekintsünk egy teljes párosítást. A  $\tilde{x}$  élsúlyozás  $G$  és  $G'$ -ben eggyezzen meg  $x$ -vel, a keresztélek  $\tilde{x}$ -súlya pedig legyen

$$\tilde{x}_{vv'} = 1 - \sum_{e \in E(G), v \in e} x_e, \quad \forall v \in V.$$

# A redukció

- Vegyük a  $G$  gráfot, illetve egy másolatát  $G'$ -t.
- Az „iker csúcsok” között tekintsünk egy teljes párosítást. A  $\tilde{x}$  élsúlyozás  $G$  és  $G'$ -ben eggyezzen meg  $x$ -vel, a keresztélek  $\tilde{x}$ -súlya pedig legyen

$$\tilde{x}_{vv'} = 1 - \sum_{e \in E(G), v \in e} x_e, \quad \forall v \in V.$$

- Ez a mennyiség az  $(E_v)$  feltétel miatt nemnegatív, és így a  $\tilde{G}$ ,  $\tilde{w}$  párra is igazak az előjel feltételek, sőt az  $(E_v)$  egyenlőtlenségek egyenlőséggel teljesülnek.

# A redukció

- Vegyük a  $G$  gráfot, illetve egy másolatát  $G'$ -t.
- Az „iker csúcsok” között tekintsünk egy teljes párosítást. A  $\tilde{x}$  élsúlyozás  $G$  és  $G'$ -ben eggyezzen meg  $x$ -vel, a keresztélek  $\tilde{x}$ -súlya pedig legyen

$$\tilde{x}_{vv'} = 1 - \sum_{e \in E(G), v \in e} x_e, \quad \forall v \in V.$$

- Ez a mennyiség az  $(E_V)$  feltétel miatt nemnegatív, és így a  $\tilde{G}, \tilde{w}$  párra is igazak az előjel feltételek, sőt az  $(E_V)$  egyenlőtlenségek egyenlőséggel teljesülnek.

## Az 1. célt igazoló állítás

$(\tilde{G}, x)$ -re akkor és csak akkor teljesül az összes  $(E_S)$  feltétel, ha  $(\tilde{G}, \tilde{x})$ -re is teljesül az összes  $(E_S)$  feltétel.

# $\tilde{G}$ páratlan csúcshalmazai



# $\tilde{G}$ páratlan csúcshalmazai

Az állítás egyik iránya nyilvánvaló:

# $\tilde{G}$ páratlan csúcshalmazai

Az állítás egyik iránya nyilvánvaló:

Ha  $(G, x)$ -re valamelyik  $(E_S)$  feltétel hamis, akkor ugyanaz az  $S$  csúcshalmaz (amely  $V(\tilde{G})$ -nek is részhalmaza) feltétele sérül  $\tilde{G}$ -ben is.

# $\tilde{G}$ páratlan csúcshalmazai

Az állítás egyik iránya nyilvánvaló:

Ha  $(G, x)$ -re valamelyik  $(E_S)$  feltétel hamis, akkor ugyanaz az  $S$  csúcshalmaz (amely  $V(\tilde{G})$ -nek is részhalmaza) feltétele sérül  $\tilde{G}$ -ben is.

Csak azt kell igazolnunk, ha  $(G, x)$ -re minden  $(E_S)$  feltétel igaz, akkor  $\tilde{G}$ -ben is teljesülnek ezek.

# $\tilde{G}$ páratlan csúcshalmazai

Az állítás egyik iránya nyilvánvaló:

Ha  $(G, x)$ -re valamelyik  $(E_S)$  feltétel hamis, akkor ugyanaz az  $S$  csúcshalmaz (amely  $V(\tilde{G})$ -nek is részhalmaza) feltétele sérül  $\tilde{G}$ -ben is.

Csak azt kell igazolnunk, ha  $(G, x)$ -re minden  $(E_S)$  feltétel igaz, akkor  $\tilde{G}$ -ben is teljesülnek ezek.

Ehhez venni kell egy  $S$  páratlan elemszámú csúcshalmazt  $V(\tilde{G})$ -ből.

# $\tilde{G}$ páratlan csúcshalmazai

Az állítás egyik iránya nyilvánvaló:

Ha  $(G, x)$ -re valamelyik  $(E_S)$  feltétel hamis, akkor ugyanaz az  $S$  csúcshalmaz (amely  $V(\tilde{G})$ -nek is részhalmaza) feltétele sérül  $\tilde{G}$ -ben is.

Csak azt kell igazolnunk, ha  $(G, x)$ -re minden  $(E_S)$  feltétel igaz, akkor  $\tilde{G}$ -ben is teljesülnek ezek.

Ehhez venni kell egy  $S$  páratlan elemszámú csúcshalmazt  $V(\tilde{G})$ -ből.

## Jelölés

Legyen  $S \subset V(\tilde{G})$  tetszőleges.  $R = S \cap V(G)$  és  $T' = S \cap V(G')$  az  $S$  halmaz két része.  $T'$ -ra úgy gondolunk mint egy  $T \subset V(G)$  csúcshalmaz ikré.

# $\tilde{G}$ páratlan csúcshalmazai

Az állítás egyik iránya nyilvánvaló:

Ha  $(G, x)$ -re valamelyik  $(E_S)$  feltétel hamis, akkor ugyanaz az  $S$  csúcshalmaz (amely  $V(\tilde{G})$ -nek is részhalmaza) feltétele sérül  $\tilde{G}$ -ben is.

Csak azt kell igazolnunk, ha  $(G, x)$ -re minden  $(E_S)$  feltétel igaz, akkor  $\tilde{G}$ -ben is teljesülnek ezek.

Ehhez venni kell egy  $S$  páratlan elemszámú csúcshalmazt  $V(\tilde{G})$ -ből.

## Jelölés

Legyen  $S \subset V(\tilde{G})$  tetszőleges.  $R = S \cap V(G)$  és  $T' = S \cap V(G')$  az  $S$  halmaz két része.  $T'$ -ra úgy gondolunk mint egy  $T \subset V(G)$  csúcshalmaz ikré.

Ha  $S$  páratlan elemszámú, akkor  $S$  és  $T$  közül az egyik páratlan, a másik páros elemszámú.

# 1. Eset


# 1. Eset

**1. eset:**  $R \cap T = \emptyset$ .



# 1. Eset


**1. eset:**  $R \cap T = \emptyset$ .



A piros élek egy páratlan elemszámú csúcshalmazon belüli élek, a kék élek egy páros elemszámú csúcshalmazon belüli élek.

# 1. Eset

**1. eset:**  $R \cap T = \emptyset$ .




A piros élek egy páratlan elemszámú csúcshalmazon belüli élek, a kék élek egy páros elemszámú csúcshalmazon belüli élek.

Ez egy egyszerű eset. Ekkor az  $R$ -en belüli  $E(R)$  élek halmaza és a  $T'$ -n belüli  $E(T')$  élek halmaza együtt kiadja az  $S$ -en belüli  $E(S)$  élhalmazt. Speciálisan  $x(S) = x(R) + x(T') = x(R) + x(T)$ .

# 1. Eset

**1. eset:**  $R \cap T = \emptyset$ .



A piros élek egy páratlan elemszámú csúcshalmazon belüli élek, a kék élek egy páros elemszámú csúcshalmazon belüli élek.

Ez egy egyszerű eset. Ekkor az  $R$ -en belüli  $E(R)$  élek halmaza és a  $T'$ -n belüli  $E(T')$  élek halmaza együtt kiadja az  $S$ -en belüli  $E(S)$  élhalmazt. Speciálisan  $x(S) = x(R) + x(T') = x(R) + x(T)$ .


$x(R)$ -et és  $x(T)$ -t becsülhetjük  $|R|/2$ -vel, illetve  $|T|/2$ -vel, sőt a páratlan elemszámú halmaznál tudjuk az  $1/2$ -del élesített felső becslést is.

## 2. eset

**2. eset:**  $M := R \cap T \neq \emptyset$ .

## 2. eset


2. eset:  $M := R \cap T \neq \emptyset$ .



A piros élek egy páratlan elemszámú csúcshalmazon belüli élek, a kék élek egy páros elemszámú csúcshalmazon belüli élek. A zöld élek  $E(R - M, M)$  és  $E(R' - M', M')$  élei, a  $\partial(M \cup M' \cup K')$  határ részei. Ez a határ szerepel egy  $(E_v)$ -k és  $(E_e)$ -kből korábban levezetett egyenlőtlenségünkben.

## 2. eset

2. eset:  $M := R \cap T \neq \emptyset$ .



A piros élek egy páratlan elemszámú csúcshalmazon belüli élek, a kék élek egy páros elemszámú csúcshalmazon belüli élek. A zöld élek  $E(R - M, M)$  és  $E(R' - M', M')$  élei, a  $\partial(M \cup M' \cup K')$  határ részei. Ez a határ szerepel egy  $(E_v)$ -k és  $(E_e)$ -kből korábban levezetett egyenlőtlenségünkben.

Feltehetjük, hogy  $D \subset V(G)$  páratlan elemszámú csúcshalmaz:

$$x(D) \leq \frac{|D| - 1}{2}.$$

## 2. eset (folytatás)

## 2. eset (folytatás)

$x(M \cup M' \cup K')$  becslésénél óvatosabbak leszünk.

$$x(M \cup M' \cup K') + \frac{1}{2}(x(\partial_G(M) + \partial_{G'}(M' \cup K'))) \leq \frac{|M| + |M'| + |K'|}{2}$$

egyenlőtlenséget használjuk, amit levezettünk az  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségből.



## 2. eset (folytatás)

$x(M \cup M' \cup K')$  becslésénél óvatosabbak leszünk.

$$x(M \cup M' \cup K') + \frac{1}{2}(x(\partial_G(M) + \partial_{G'}(M' \cup K'))) \leq \frac{|M| + |M'| + |K'|}{2}$$

egyenlőtlenséget használjuk, amit levezettünk az  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségből.

A korábban elhanyagolt, „felezett” tagra nyilván

$$x(E(D, M)) \leq \frac{1}{2}(x(\partial_G(M) + \partial_{G'}(M' \cup K'))),$$

ahol  $E(D, M)$  a  $D$  és  $M$  között haladó élek száma.

## 2. eset (folytatás)

$x(M \cup M' \cup K')$  becslésénél óvatosabbak leszünk.

$$x(M \cup M' \cup K') + \frac{1}{2}(x(\partial_G(M) + \partial_{G'}(M' \cup K'))) \leq \frac{|M| + |M'| + |K'|}{2}$$

egyenlőtlenséget használjuk, amit levezettünk az  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségből.

A korábban elhanyagolt, „felezett” tagra nyilván

$$x(E(D, M)) \leq \frac{1}{2}(x(\partial_G(M) + \partial_{G'}(M' \cup K'))),$$

ahol  $E(D, M)$  a  $D$  és  $M$  között haladó élek száma.

A fenti két egyenlőtlenségből ismét egyszerű számtan adja a bizonyítandót.

## 2. eset (folytatás)

$x(M \cup M' \cup K')$  becslésénél óvatosabbak leszünk.

$$x(M \cup M' \cup K') + \frac{1}{2}(x(\partial_G(M) + \partial_{G'}(M' \cup K'))) \leq \frac{|M| + |M'| + |K'|}{2}$$

egyenlőtlenséget használjuk, amit levezettünk az  $(E_v)$  és  $(E_e)$  egyenlőtlenségből.

A korábban elhanyagolt, „felezett” tagra nyilván

$$x(E(D, M)) \leq \frac{1}{2}(x(\partial_G(M) + \partial_{G'}(M' \cup K'))),$$

ahol  $E(D, M)$  a  $D$  és  $M$  között haladó élek száma.

A fenti két egyenlőtlenségből ismét egyszerű számtan adja a bizonyítandót.

Kaptuk, hogy  $(G, x)$  és  $(\tilde{G}, \tilde{x})$  esetén az  $(E_S)$  egyenlőtlenségek tesztelése ekvivalens.

# Szünet



# Vágások

# Vágások

- A továbbiakban csak olyan élsúlyozott  $(G, x)$  gráfokkal foglalkozunk, ahol az  $(E_v)$  egyenlőtlenségek egyenlőséggel igazak, azaz minden  $v \in V(G)$  csúcs esetén

$$\sum_{e: v \in e} x_e = 1,$$

továbbá csúcshalmaza páros elemszámú.

# Vágások

- A továbbiakban csak olyan élsúlyozott  $(G, x)$  gráfokkal foglalkozunk, ahol az  $(E_v)$  egyenlőtlenségek egyenlőséggel igazak, azaz minden  $v \in V(G)$  csúcs esetén

$$\sum_{e: v \in e} x_e = 1,$$

továbbá csúcshalmaza páros elemszámú.

- Korábbi levezetésünk megismételhető (most egyenlőségekkel):

$$2 \sum_{e=xy \in E: x, y \in S} x_e + \sum_{e \in \partial S} x_e = |S|.$$

# Vágások

- A továbbiakban csak olyan élsúlyozott  $(G, x)$  gráfokkal foglalkozunk, ahol az  $(E_v)$  egyenlőtlenségek egyenlőséggel igazak, azaz minden  $v \in V(G)$  csúcs esetén

$$\sum_{e: v \in e} x_e = 1,$$

továbbá csúcshalmaza páros elemszámú.

- Korábbi levezetésünk megismételhető (most egyenlőségekkel):

$$2 \sum_{e=xy \in E: x, y \in S} x_e + \sum_{e \in \partial S} x_e = |S|.$$

- Ismét egy kicsit változtatjuk a nyelvet:  $\partial S$  az  $S$  csúcshalmaz élhatára. Ez azonban tekinthető úgy mint az  $\mathcal{V} = (S, \bar{S})$  vágás  $E(\mathcal{V})$  élhalmaza. Legyen  $x(\mathcal{V}) = x(E(\mathcal{V}))$ . A  $\mathcal{V}$  vágás páratlan vágás, ha mindkét oldala páratlan elemszámú csúcshalmaz (már feltesszük, hogy  $G$ -nek páros sok csúcsa van).



# Az átfogalmazás

# Az átfogalmazás

- Kaptuk, hogy minden páratlan  $\mathcal{V}$  vágásra

$$x(\mathcal{V}) = |S| - 2x(S) = 2 \left( \frac{|S| - 1}{2} - x(S) \right) + 1.$$

# Az átfogalmazás

- Kaptuk, hogy minden páratlan  $\mathcal{V}$  vágásra

$$x(\mathcal{V}) = |S| - 2x(S) = 2 \left( \frac{|S| - 1}{2} - x(S) \right) + 1.$$

Azaz

$$\frac{|S| - 1}{2} - x(S) = \frac{x(\mathcal{V}) - 1}{2}.$$

# Az átfogalmazás

- Kaptuk, hogy minden páratlan  $\mathcal{V}$  vágásra

$$x(\mathcal{V}) = |S| - 2x(S) = 2 \left( \frac{|S| - 1}{2} - x(S) \right) + 1.$$

Azaz

$$\frac{|S| - 1}{2} - x(S) = \frac{x(\mathcal{V}) - 1}{2}.$$

- Ez alapján akkor és csak akkor teljesül minden  $(E_S)$  egyenlőtlenség, ha minden  $\mathcal{V}$  páratlan vágás élhalmazának  $x$ -súlya legalább 1.

# Az átfogalmazás

- Kaptuk, hogy minden páratlan  $\mathcal{V}$  vágásra

$$x(\mathcal{V}) = |S| - 2x(S) = 2 \left( \frac{|S| - 1}{2} - x(S) \right) + 1.$$

Azaz

$$\frac{|S| - 1}{2} - x(S) = \frac{x(\mathcal{V}) - 1}{2}.$$

- Ez alapján akkor és csak akkor teljesül minden  $(E_S)$  egyenlőtlenség, ha minden  $\mathcal{V}$  páratlan vágás élhalmazának  $x$ -súlya legalább 1.

## 2. Cél

Adott egy  $(G, x)$ , nemnegatív élsúlyozott, páros pontszámú gráf.

# Az átfogalmazás

- Kaptuk, hogy minden páratlan  $\mathcal{V}$  vágásra

$$x(\mathcal{V}) = |S| - 2x(S) = 2 \left( \frac{|S| - 1}{2} - x(S) \right) + 1.$$

Azaz

$$\frac{|S| - 1}{2} - x(S) = \frac{x(\mathcal{V}) - 1}{2}.$$

- Ez alapján akkor és csak akkor teljesül minden  $(E_S)$  egyenlőtlenség, ha minden  $\mathcal{V}$  páratlan vágás élhalmazának  $x$ -súlya legalább 1.

## 2. Cél

Adott egy  $(G, x)$ , nemnegatív élsúlyozott, páros pontszámú gráf. Hatékonyan határozzuk meg a minimális súlyú páratlan vágást.

# Az átfogalmazás

- Kaptuk, hogy minden páratlan  $\mathcal{V}$  vágásra

$$x(\mathcal{V}) = |S| - 2x(S) = 2 \left( \frac{|S| - 1}{2} - x(S) \right) + 1.$$

Azaz

$$\frac{|S| - 1}{2} - x(S) = \frac{x(\mathcal{V}) - 1}{2}.$$

- Ez alapján akkor és csak akkor teljesül minden  $(E_S)$  egyenlőtlenség, ha minden  $\mathcal{V}$  páratlan vágás élhalmazának  $x$ -súlya legalább 1.

## 2. Cél

Adott egy  $(G, x)$ , nemnegatív élsúlyozott, páros pontszámú gráf. Hatékonyan határozzuk meg a minimális súlyú páratlan vágást.

- Ha a 2. Cél megoldható, akkor az Edmonds-politóp tesztelési problémája is.

# Kapcsolódó vágási problémák



# Kapcsolódó vágási problémák

- Ha  $\min_{\mathcal{V} \text{ vágás}} x(\mathcal{V})$ -t keressük, akkor ezt egyszerű megoldani a folyamok elméletének segítségével.

# Kapcsolódó vágási problémák

- Ha  $\min_{\mathcal{V} \text{ vágás}} x(\mathcal{V})$ -t keressük, akkor ezt egyszerű megoldani a folyamok elméletének segítségével.
- Viszont, ha  $\min_{\mathcal{V}=(S,T), |S|=|T|} x(\mathcal{V})$ -t keressük,

# Kapcsolódó vágási problémák

- Ha  $\min_{\mathcal{V} \text{ vágás}} x(\mathcal{V})$ -t keressük, akkor ezt egyszerű megoldani a folyamok elméletének segítségével.
- Viszont, ha  $\min_{\mathcal{V}=(S,T), |S|=|T|} x(\mathcal{V})$ -t keressük, az már  $\mathcal{NP}$ -teljes probléma.

# Kapcsolódó vágási problémák

- Ha  $\min_{\mathcal{V} \text{ vágás}} x(\mathcal{V})$ -t keressük, akkor ezt egyszerű megoldani a folyamok elméletének segítségével.
- Viszont, ha  $\min_{\mathcal{V}=(S,T), |S|=|T|} x(\mathcal{V})$ -t keressük, az már  $\mathcal{NP}$ -teljes probléma.
- Így, ha  $\mathcal{V}$ -ről páratlan elemszámúságot teszünk fel, akkor kérdésünk nehézsége nem világos.

# Kapcsolódó vágási problémák

- Ha  $\min_{\mathcal{V} \text{ vágás}} x(\mathcal{V})$ -t keressük, akkor ezt egyszerű megoldani a folyamok elméletének segítségével.
- Viszont, ha  $\min_{\mathcal{V}=(S,T), |S|=|T|} x(\mathcal{V})$ -t keressük, az már  $\mathcal{NP}$ -teljes probléma.
- Így, ha  $\mathcal{V}$ -ről páratlan elemszámúságot teszünk fel, akkor kérdésünk nehézsége nem világos.
- Ha csúcshalmazunk páratlan elemszámú, akkor minden vágás valamelyik oldala páratlan lenne. Így a páratlan csúcshalmazok közül a minimális súlyú meghatározása az összes részhalmaz közötti kereséssel lenne ekvivalens.

# Az új probléma

# Az új probléma

Tehát az alapproblémát ( $\mathcal{MP}(G)$  tesztelése) visszavezettük a minimális súlyú páratlan vágás meghatározására (vagy egy súlyozott határ minimalizálásra páratlan halmazok között):

# Az új probléma

Tehát az alapproblémát ( $\mathcal{MP}(G)$  tesztelése) visszavezettük a minimális súlyú páratlan vágás meghatározására (vagy egy súlyozott határ minimalizálásra páratlan halmazok között):

Minimalizáljuk	$w(\mathcal{V})$ -t
Feltéve, hogy	$\mathcal{V}$ páratlan vágás



# Az új probléma

Tehát az alapproblémát ( $\mathcal{MP}(G)$  tesztelése) visszavezettük a minimális súlyú páratlan vágás meghatározására (vagy egy súlyozott határ minimalizálásra páratlan halmazok között):

Minimalizáljuk	$w(\mathcal{V})$ -t
Feltéve, hogy	$\mathcal{V}$ páratlan vágás

- Legyen adott egy  $G$  gráf és egy  $w$  nemnegatív élsúlyozás,  $n = |V(G)|$  páros.

# Az új probléma

Tehát az alapproblémát ( $\mathcal{MP}(G)$  tesztelése) visszavezettük a minimális súlyú páratlan vágás meghatározására (vagy egy súlyozott határ minimalizálásra páratlan halmazok között):

Minimalizáljuk	$w(\mathcal{V})$ -t
Feltéve, hogy	$\mathcal{V}$ páratlan vágás

- Legyen adott egy  $G$  gráf és egy  $w$  nemnegatív élsúlyozás,  $n = |V(G)|$  páros.
- A legkisebb súlyú (a keresztélek összsúlya legyen minimális) páratlan vágást (mindekét partja páratlan sok csúcsot tartalmaz) keressük.

# Az új probléma

Tehát az alapproblémát ( $\mathcal{MP}(G)$  tesztelése) visszavezettük a minimális súlyú páratlan vágás meghatározására (vagy egy súlyozott határ minimalizálásra páratlan halmazok között):

Minimalizáljuk	$w(\mathcal{V})$ -t
Feltéve, hogy	$\mathcal{V}$ páratlan vágás

- Legyen adott egy  $G$  gráf és egy  $w$  nemnegatív élsúlyozás,  $n = |V(G)|$  páros.
- A legkisebb súlyú (a keresztélek összsúlya legyen minimális) páratlan vágást (mindekét partja páratlan sok csúcsot tartalmaz) keressük.
- A kiinduló LP nyelvezet a súlyozásra az  $x$  jelölést tette természetessé. A súly (angolul weight) jelölésére azonban a  $w$  a legmegszokottabb. Most áttérünk erre.

# Az új probléma

Tehát az alapproblémát ( $\mathcal{MP}(G)$  tesztelése) visszavezettük a minimális súlyú páratlan vágás meghatározására (vagy egy súlyozott határ minimalizálásra páratlan halmazok között):

Minimalizáljuk	$w(\mathcal{V})$ -t
Feltéve, hogy	$\mathcal{V}$ páratlan vágás

- Legyen adott egy  $G$  gráf és egy  $w$  nemnegatív élsúlyozás,  $n = |V(G)|$  páros.
- A legkisebb súlyú (a kerestélek összsúlya legyen minimális) páratlan vágást (mindekét partja páratlan sok csúcsot tartalmaz) keressük.
- A kiinduló LP nyelvezet a súlyozásra az  $x$  jelölést tette természetessé. A súly (angolul weight) jelölésére azonban a  $w$  a legmegszokottabb. Most áttérünk erre.
- Ennek hatékony megoldása egy új fogalom bevezetését kívánja.

# Gomory—Hu-fa

# Gomory—Hu-fa

Tekintsünk egy  $F$  fát  $V(G)$ -n. Ekkor  $F$ -nek  $n - 1$  db éle van, és vegyük észre, hogy bármelyik élét letörölve  $F$  két komponensre esik szét. Ha  $e$  volt a törölt él, akkor legyenek ezek csúcshalmazai  $S_e$ , és  $T_e$ . Ekkor  $\mathcal{V}_e = (S_e, T_e)$  vágás.

# Gomory—Hu-fa

Tekintsünk egy  $F$  fát  $V(G)$ -n. Ekkor  $F$ -nek  $n - 1$  db éle van, és vegyük észre, hogy bármelyik élét letörölve  $F$  két komponensre esik szét. Ha  $e$  volt a törölt él, akkor legyenek ezek csúcshalmazai  $S_e$ , és  $T_e$ . Ekkor  $\mathcal{V}_e = (S_e, T_e)$  vágás.

## Definíció

Az  $F$  fa egy Gomory—Hu-fa, ha minden  $e = xy \in E(F)$  esetén az  $(S_e, T_e)$  vágás  $w$ -optimális  $xy$  vágás  $G$ -ben, azaz

$$\min_{(S,T) \text{ } xy \text{ vágás}} w(\partial S) = w(\partial S_e)$$

# Gomory—Hu-fa

Tekintsünk egy  $F$  fát  $V(G)$ -n. Ekkor  $F$ -nek  $n - 1$  db éle van, és vegyük észre, hogy bármelyik élét letörölve  $F$  két komponensre esik szét. Ha  $e$  volt a törölt él, akkor legyenek ezek csúcshalmazai  $S_e$ , és  $T_e$ . Ekkor  $\mathcal{V}_e = (S_e, T_e)$  vágás.

## Definíció

Az  $F$  fa egy Gomory—Hu-fa, ha minden  $e = xy \in E(F)$  esetén az  $(S_e, T_e)$  vágás  $w$ -optimális  $xy$  vágás  $G$ -ben, azaz

$$\min_{(S,T) \text{ } xy \text{ vágás}} w(\partial S) = w(\partial S_e)$$

A  $T$  fa  $G$  csúcshalmazán egy gráf. Azonban éleinek „semmi” köze  $G$ -hez. Nem szükségszerűen részgráf.



# Mire jó a Gomory—Hu-fa?

# Mire jó a Gomory—Hu-fa?

Azaz egy  $F$  fa Gomory—Hu-tulajdonsága  $n - 1$  feltételből tevődik össze.  $F$  minden élére van egy feltétel. Ez az  $n - 1$  feltétel egy-egy vágás optimalitása.

# Mire jó a Gomory—Hu-fa?

Azaz egy  $F$  fa Gomory—Hu-tulajdonsága  $n - 1$  feltételből tevődik össze.  $F$  minden élére van egy feltétel. Ez az  $n - 1$  feltétel egy-egy vágás optimalitása.

A definícióben explicit optimalitásokon túl további információk is kiolvashatók egy Gomory—Hu-fából.

# Igazából $\binom{n}{2}$ optimális vágásunk van

# Igazából $\binom{n}{2}$ optimális vágásunk van

## Lemma

Ha adott egy  $F$  Gomory—Hu-fa, akkor minden  $x, y \in V$  csúcspárra az  $F$  által meghatározott  $n - 1$  vágás között lesz minimális  $xy$  vágás is.

# Igazából $\binom{n}{2}$ optimális vágásunk van

## Lemma

Ha adott egy  $F$  Gomory—Hu-fa, akkor minden  $x, y \in V$  csúcspárra az  $F$  által meghatározott  $n - 1$  vágás között lesz minimális  $xy$  vágás is.

Legyen  $x, y \in V$  tetszőleges. Ekkor létezik egyetlen  $P$   $xy$  út  $F$ -ben. Legyenek ezen útban lévő élek:  $e_1, e_2, \dots, e_\ell$ , és ezen élekhez tartozó vágások  $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$ .

# Igazából $\binom{n}{2}$ optimális vágásunk van

## Lemma

Ha adott egy  $F$  Gomory—Hu-fa, akkor minden  $x, y \in V$  csúcspárra az  $F$  által meghatározott  $n - 1$  vágás között lesz minimális  $xy$  vágás is.

Legyen  $x, y \in V$  tetszőleges. Ekkor létezik egyetlen  $P$   $xy$  út  $F$ -ben. Legyenek ezen útban lévő élek:  $e_1, e_2, \dots, e_\ell$ , és ezen élekhez tartozó vágások  $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$ .

## Észrevétel

$\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$  mindegyike elválasztja  $x$ -et és  $y$ -t.

# Igazából $\binom{n}{2}$ optimális vágásunk van

## Lemma

Ha adott egy  $F$  Gomory—Hu-fa, akkor minden  $x, y \in V$  csúcspárra az  $F$  által meghatározott  $n - 1$  vágás között lesz minimális  $xy$  vágás is.

Legyen  $x, y \in V$  tetszőleges. Ekkor létezik egyetlen  $P$   $xy$  út  $F$ -ben. Legyenek ezen útban lévő élek:  $e_1, e_2, \dots, e_\ell$ , és ezen élekhez tartozó vágások  $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$ .

## Észrevétel

$\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$  mindegyike elválasztja  $x$ -et és  $y$ -t.

Legyen  $\mathcal{V}$  a minimális súlyú vágás  $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$  közül, ami  $xy$  vágás.



# Igazából $\binom{n}{2}$ optimális vágásunk van

## Lemma

Ha adott egy  $F$  Gomory—Hu-fa, akkor minden  $x, y \in V$  csúcspárra az  $F$  által meghatározott  $n - 1$  vágás között lesz minimális  $xy$  vágás is.

Legyen  $x, y \in V$  tetszőleges. Ekkor létezik egyetlen  $P$   $xy$  út  $F$ -ben. Legyenek ezen útban lévő élek:  $e_1, e_2, \dots, e_\ell$ , és ezen élekhez tartozó vágások  $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$ .

## Észrevétel

$\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$  mindegyike elválasztja  $x$ -et és  $y$ -t.

Legyen  $\mathcal{V}$  a minimális súlyú vágás  $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots, \mathcal{V}_\ell$  közül, ami  $xy$  vágás.

## Erősebb Lemma

$\mathcal{V}$  egy optimális  $xy$  vágás

# Erősebb Lemma bizonyítása

# Erősebb Lemma bizonyítása

Tegyük fel (indirekt bizonyítás), hogy  $\mathcal{V}_{opt}$  minimális súlyú  $xy$  vágás, és

$$w(\mathcal{V}_{opt}) < w(\mathcal{V})$$

# Erősebb Lemma bizonyítása

Tegyük fel (indirekt bizonyítás), hogy  $\mathcal{V}_{opt}$  minimális súlyú  $xy$  vágás, és

$$w(\mathcal{V}_{opt}) < w(\mathcal{V})$$

Ekkor van olyan  $e_i$  él, melynek két vége  $\mathcal{V}_{opt}$  különböző partjára esik.

# Erősebb Lemma bizonyítása

Tegyük fel (indirekt bizonyítás), hogy  $\mathcal{V}_{opt}$  minimális súlyú  $xy$  vágás, és

$$w(\mathcal{V}_{opt}) < w(\mathcal{V})$$

Ekkor van olyan  $e_i$  él, melynek két vége  $\mathcal{V}_{opt}$  különböző partjára esik.

De mivel  $F$  Gomory—Hu-fa, ezért  $\mathcal{V}_i$  optimális vágás, ami  $e_i$  két végét szeparálja.

# Erősebb Lemma bizonyítása

Tegyük fel (indirekt bizonyítás), hogy  $\mathcal{V}_{opt}$  minimális súlyú  $xy$  vágás, és

$$w(\mathcal{V}_{opt}) < w(\mathcal{V})$$

Ekkor van olyan  $e_i$  él, melynek két vége  $\mathcal{V}_{opt}$  különböző partjára esik.

De mivel  $F$  Gomory—Hu-fa, ezért  $\mathcal{V}_i$  optimális vágás, ami  $e_i$  két végét szeparálja.

Tehát

$$w(\mathcal{V}_{opt}) \geq w(\mathcal{V}_i) \geq w(\mathcal{V}),$$

ami ellentmondás.

# Erősebb Lemma bizonyítása

Tegyük fel (indirekt bizonyítás), hogy  $\mathcal{V}_{opt}$  minimális súlyú  $xy$  vágás, és

$$w(\mathcal{V}_{opt}) < w(\mathcal{V})$$

Ekkor van olyan  $e_i$  él, melynek két vége  $\mathcal{V}_{opt}$  különböző partjára esik.

De mivel  $F$  Gomory—Hu-fa, ezért  $\mathcal{V}_i$  optimális vágás, ami  $e_i$  két végét szeparálja.

Tehát

$$w(\mathcal{V}_{opt}) \geq w(\mathcal{V}_i) \geq w(\mathcal{V}),$$

ami ellentmondás.

Ez az állítást és egyben a lemmát igazolja.

# További információk egy Gomory—Hu-fában



# További információk egy Gomory—Hu-fában

Legyen  $(G, w)$  és  $F$  Gomory-Hu-fa adott. Ez meghatároz  $n - 1$  darab vágást, az összes párra van optimális szeparáló vágás.

# További információk egy Gomory—Hu-fában

Legyen  $(G, w)$  és  $F$  Gomory-Hu-fa adott. Ez meghatároz  $n - 1$  darab vágást, az összes párra van optimális szeparáló vágás.

Feltettük, hogy  $|V|$  páros: Van páros-páros és páratlan-páratlan vágás is. (Ha  $|V|$  páratlan lenne, akkor minden vágás páros-páratlan lenne.)

# További információk egy Gomory—Hu-fában

Legyen  $(G, w)$  és  $F$  Gomory-Hu-fa adott. Ez meghatároz  $n - 1$  darab vágást, az összes párra van optimális szeparáló vágás.

Feltettük, hogy  $|V|$  páros: Van páros-páros és páratlan-páratlan vágás is. (Ha  $|V|$  páratlan lenne, akkor minden vágás páros-páratlan lenne.)

## Megjegyzés

Minden  $F$  fára az él vágások közt lennie kell páratlan-páratlan vágásnak. Valóban egy levélre illeszkedő élnek megfelelő vágás egyik oldala 1, másik  $n - 1$  csúcsot tartalmaz.

# További információk egy Gomory—Hu-fában

Legyen  $(G, w)$  és  $F$  Gomory-Hu-fa adott. Ez meghatároz  $n - 1$  darab vágást, az összes párra van optimális szeparáló vágás.

Feltettük, hogy  $|V|$  páros: Van páros-páros és páratlan-páratlan vágás is. (Ha  $|V|$  páratlan lenne, akkor minden vágás páros-páratlan lenne.)

## Megjegyzés

Minden  $F$  fára az él vágások közt lennie kell páratlan-páratlan vágásnak. Valóban egy levélre illeszkedő élnek megfelelő vágás egyik oldala 1, másik  $n - 1$  csúcsot tartalmaz.


## Tétel

Az  $F$ -ben rejlik  $n - 1$  darab vágás közt ott van a legkisebb súlyú páratlan-páratlan vágás.

# A Tétel bizonyítása


# A Tétel bizonyítása

Legyen  $O$  egy optimális páratlan halmaz.



# A Tétel bizonyítása


Legyen  $O$  egy optimális páratlan halmaz.



$V(G) = V(F)$ . Minden  $e \in \partial_F O$ -ra vegyük az  $F$  fában rejlő  $\mathcal{V}_e = (S_e, T_e)$  vágást, ahol  $S_e$  az  $e$   $O$ -n kívüli csúcsát tartalmazza.

# A Tétel bizonyítása

Legyen  $O$  egy optimális páratlan halmaz.




$V(G) = V(F)$ . Minden  $e \in \partial_F O$ -ra vegyük az  $F$  fában rejlő  $\mathcal{V}_e = (S_e, T_e)$  vágást, ahol  $S_e$  az  $e$   $O$ -n kívüli csúcsát tartalmazza.

A továbbiakban használjuk az  $S_{\vec{e}}$  jelölést, ahol  $e \in E(F)$ .  $e$  meghatároz  $(F$ -fel) egy vágást,  $S$  azon oldala ennek a vágásnak, amely azt a csúcsot tartalmazza, ahová  $\vec{e}$  mutat.



# A Tétel bizonyítása

Legyen  $O$  egy optimális páratlan halmaz.



$V(G) = V(F)$ . Minden  $e \in \partial_F O$ -ra vegyük az  $F$  fában rejlő  $\mathcal{V}_e = (S_e, T_e)$  vágást, ahol  $S_e$  az  $e$   $O$ -n kívüli csúcsát tartalmazza.

A továbbiakban használjuk az  $S_{\vec{e}}$  jelölést, ahol  $e \in E(F)$ .  $e$  meghatároz ( $F$ -fel) egy vágást,  $S$  azon oldala ennek a vágásnak, amely azt a csúcsot tartalmazza, ahová  $\vec{e}$  mutat. Azaz  $e$  fa-él definiál egy vágást. Az irányítás megmutatja melyik oldalra hivatkozunk „ $S$  halmazként”

# Erősebb tétel

# Erősebb tétel

$w(\mathcal{V}_e) \leq w(\partial_F O)$ , mert  $\mathcal{V}_e$  optimális  $xy$  vágás,  $O$  (optimális páratlan halmaz, egyben)  $xy$  vágás.

# Erősebb tétel

$w(\mathcal{V}_e) \leq w(\partial_F O)$ , mert  $\mathcal{V}_e$  optimális  $xy$  vágás,  $O$  (optimális páratlan halmaz, egyben)  $xy$  vágás.

## Erősebb Tétel

Az  $S_e$ -k között van páratlan halmaz.

# Erősebb tétel

$w(\mathcal{V}_e) \leq w(\partial_F O)$ , mert  $\mathcal{V}_e$  optimális  $xy$  vágás,  $O$  (optimális páratlan halmaz, egyben)  $xy$  vágás.

## Erősebb Tétel

Az  $S_e$ -k között van páratlan halmaz.

## Megjegyzés

Az erősebb Tételből következik a Tétel.

# Erősebb tétel

$w(\mathcal{V}_e) \leq w(\partial_F O)$ , mert  $\mathcal{V}_e$  optimális  $xy$  vágás,  $O$  (optimális páratlan halmaz, egyben)  $xy$  vágás.

## Erősebb Tétel

Az  $S_e$ -k között van páratlan halmaz.

## Megjegyzés

Az erősebb Tételből következik a Tétel.

Valóban. Tudjuk, hogy  $w(\mathcal{V}_e) \leq w(\partial_F O)$ . Ha  $S_e$  páratlan, akkor  $\mathcal{V}_e$  is egy optimális páratlan vágás (ahogy  $O$ ).

# Az Erősebb Tétel bizonyítása

# Az Erősebb Tétel bizonyítása

$$\begin{aligned}
 \sum_{e \in \partial_F O} |S_{\vec{e}}| &\stackrel{\equiv}{(\text{mod } 2)} \sum_{\substack{x \in O, e \in E(F), \\ \vec{e} \text{ kifelé irányított } x\text{-ből}}} |S_{\vec{e}}| = \\
 &= \sum_{x \in O} \sum_{\substack{e \in E(F) \\ \vec{e} = \vec{xu}}} |S_{\vec{e}}| = \sum_{x \in O} (|V| - 1) \stackrel{\equiv}{(\text{mod } 2)} 1.
 \end{aligned}$$



# Az Erősebb Tétel bizonyítása

$$\begin{aligned}
 \sum_{e \in \partial_F O} |S_{\vec{e}}| &\equiv_{(\text{mod } 2)} \sum_{\substack{x \in O, e \in E(F), \\ \vec{e} \text{ kifelé irányított } x\text{-ből}}} |S_{\vec{e}}| = \\
 &= \sum_{x \in O} \sum_{\substack{e \in E(F) \\ \vec{e} = \vec{xu}}} |S_{\vec{e}}| = \sum_{x \in O} (|V| - 1) \equiv_{(\text{mod } 2)} 1.
 \end{aligned}$$

Az első kongruencia azért igaz, mert a szummához adott extra tagok párokban jönnek (egy  $O$ -beli  $e$  élre  $\vec{e}$  és  $\overleftarrow{e}$ ) és minden pár hozzájárulása  $|V|$ , páros.

# Az Erősebb Tétel bizonyítása

$$\begin{aligned} \sum_{e \in \partial_F O} |S_{\vec{e}}| &\equiv_{(\text{mod } 2)} \sum_{\substack{x \in O, e \in E(F), \\ \vec{e} \text{ kifelé irányított } x\text{-ből}}} |S_{\vec{e}}| = \\ &= \sum_{x \in O} \sum_{\substack{e \in E(F) \\ \vec{e} = \overrightarrow{xu}}} |S_{\vec{e}}| = \sum_{x \in O} (|V| - 1) \equiv_{(\text{mod } 2)} 1. \end{aligned}$$

Az első kongruencia azért igaz, mert a szummához adott extra tagok párokban jönnek (egy  $O$ -beli  $e$  élre  $\vec{e}$  és  $\overleftarrow{e}$ ) és minden pár hozzájárulása  $|V|$ , páros.

A második kongruencia azért igaz, mert páratlan sok páratlan számot adtunk össze.

# Hol tartunk?

# Hol tartunk?

- Bevezettük a Gomory—Hu-fa fogalmát.

# Hol tartunk?

- Bevezettük a Gomory—Hu-fa fogalmát.
- Ha ismerünk egy Gomory—Hu-fát egy páros pontszámú gráfban, akkor könnyű kiolvasni egy optimális páratlan vágást.

# Hol tartunk?

- Bevezettük a Gomory—Hu-fa fogalmát.
- Ha ismerünk egy Gomory—Hu-fát egy páros pontszámú gráfban, akkor könnyű kiolvasni egy optimális páratlan vágást.
- Ekkor tesztelni tudjuk a nemnegatív súlyozás  $\mathcal{MP}(G)$ -hez tartozását, amennyiben minden csúcs körül 1 súlyösszeg van.

# Hol tartunk?

- Bevezettük a Gomory—Hu-fa fogalmát.
- Ha ismerünk egy Gomory—Hu-fát egy páros pontszámú gráfban, akkor könnyű kiolvasni egy optimális páratlan vágást.
- Ekkor tesztelni tudjuk a nemnegatív súlyozás  $\mathcal{MP}(G)$ -hez tartozását, amennyiben minden csúcs körül 1 súlyösszeg van.
- Ez alapján hatékonyan tesztelhető minden  $\mathbb{R}^{E(G)}$ -beli vektor.

# Hol tartunk?

- Bevezettük a Gomory—Hu-fa fogalmát.
- Ha ismerünk egy Gomory—Hu-fát egy páros pontszámú gráfban, akkor könnyű kiolvasni egy optimális páratlan vágást.
- Ekkor tesztelni tudjuk a nemnegatív súlyozás  $\mathcal{MP}(G)$ -hez tartozását, amennyiben minden csúcs körül 1 súlyösszeg van.
- Ez alapján hatékonyan tesztelhető minden  $\mathbb{R}^{E(G)}$ -beli vektor.

## 3. Cél $\equiv$ Gomory—Hu-tétel

Minden  $G$ ,  $w$ -hez létezik  $F$  Gomory—Hu-fa, és egy ilyen polinomiális időben kiszámolható.



# Hol tartunk?

- Bevezettük a Gomory—Hu-fa fogalmát.
- Ha ismerünk egy Gomory—Hu-fát egy páros pontszámú gráfban, akkor könnyű kiolvasni egy optimális páratlan vágást.
- Ekkor tesztelni tudjuk a nemnegatív súlyozás  $\mathcal{MP}(G)$ -hez tartozását, amennyiben minden csúcs körül 1 súlyösszeg van.
- Ez alapján hatékonyan tesztelhető minden  $\mathbb{R}^{E(G)}$ -beli vektor.

## 3. Cél $\equiv$ Gomory—Hu-tétel

Minden  $G$ ,  $w$ -hez létezik  $F$  Gomory—Hu-fa, és egy ilyen polinomiális időben kiszámolható.

## Következmény

Adott  $G$  gráf és  $w \in \mathbb{Q}^{E(G)}$ . Létezik polinomiális algoritmus, ami eldönti, hogy  $w$  eleme-e  $\mathcal{MP}(G)$ -nek; ha nem, akkor ad egy Edmonds-feltételt, amit megsért  $w$ .

# Szünet



# Bevezető Lemma

# Bevezető Lemma

## Lemma

Az  $f = w \circ \partial : \mathcal{P}(V) \rightarrow \mathbb{R}_+$  leképezés

- (i) szimmetrikus, azaz  $f(S) = f(\bar{S}) \quad \forall S \subseteq V$ ,
- (ii) szubmoduláris, azaz
$$f(S) + f(T) \geq f(S \cap T) + f(S \cup T) \quad \forall S, T \subseteq V,$$
- (iii) pozimoduláris, azaz
$$f(S) + f(T) \geq f(S \setminus T) + f(T \setminus S) \quad \forall S, T \subseteq V.$$

# Bizonyítás

# Bizonyítás

(i): A szimmetria világos, mivel  $\partial S = \partial \bar{S}$ .

# Bizonyítás

(i): A szimmetria világos, mivel  $\partial S = \partial \bar{S}$ .

(ii): A szubmodularitás is teljesül: Mindkét oldalon súlyokat összegzünk. A bal oldali kifejezésben minden él legalább annyiszor van számolva mint a jobb oldalon (eset analízissel adódik). A súlyok nem-negatívak, így az egyenlőtlenség igaz.

# Bizonyítás

(i): A szimmetria világos, mivel  $\partial S = \partial \bar{S}$ .

(ii): A szubmodularitás is teljesül: Mindkét oldalon súlyokat összegzünk. A bal oldali kifejezésben minden él legalább annyiszor van számolva mint a jobb oldalon (eset analízissel adódik). A súlyok nem-negatívak, így az egyenlőtlenség igaz.

(iii): A pozimodularitás következik az előző két tulajdonságból:

$$\begin{aligned} f(S) + f(T) &= f(S) + f(\bar{T}) \geq f(S \cap \bar{T}) + f(S \cup \bar{T}) = f(S \setminus T) + f(\overline{T \setminus S}) = \\ &= f(S \setminus T) + f(T \setminus S). \end{aligned}$$



# A Főlemma

## Főlemma

Legyen  $\mathcal{V}$  egy  $xy$  optimális vágás és  $x', y'$  csúcsok. Ekkor létezik egy  $\mathcal{V}'$   $x'y'$  vágás, ami  $x'y'$  optimális vágás, továbbá  $\mathcal{V}$  és  $\mathcal{V}'$  nem kereszteződő vágások.

# A Főlemma

## Főlemma

Legyen  $\mathcal{V}$  egy  $xy$  optimális vágás és  $x', y'$  csúcsok. Ekkor létezik egy  $\mathcal{V}'$   $x'y'$  vágás, ami  $x'y'$  optimális vágás, továbbá  $\mathcal{V}$  és  $\mathcal{V}'$  nem kereszteződő vágások.

## Definíció

Az  $(S, T)$  és az  $(S', T')$  vágások kereszteződő vágások, ha  $S \cap S', S \cap T', T \cap S', T \cap T' \neq \emptyset$ .

# A Főlemma

## Főlemma

Legyen  $\mathcal{V}$  egy  $xy$  optimális vágás és  $x', y'$  csúcsok. Ekkor létezik egy  $\mathcal{V}'$   $x'y'$  vágás, ami  $x'y'$  optimális vágás, továbbá  $\mathcal{V}$  és  $\mathcal{V}'$  nem kereszteződő vágások.

## Definíció

Az  $(S, T)$  és az  $(S', T')$  vágások kereszteződő vágások, ha  $S \cap S', S \cap T', T \cap S', T \cap T' \neq \emptyset$ .

Ami ezzel ekvivalens, hogy az  $(S, T)$  és az  $(S', T')$  vágások nem kereszteződő vágások, ha  $S \subseteq S'$  vagy  $S' \subseteq S$  vagy  $S \cap S' = \emptyset$ .

# A főlemma bizonyítása

# A főlemma bizonyítása

Legyen  $\mathcal{V}$  egy tetszőleges  $x'y'$  optimális vágás. Tegyük fel, hogy  $\mathcal{V}$  és  $\mathcal{V}'$  kereszteződő vágások. Két eset állhat fent.

# A főlemma bizonyítása

Legyen  $\mathcal{V}'$  egy tetszőleges  $x'y'$  optimális vágás. Tegyük fel, hogy  $\mathcal{V}$  és  $\mathcal{V}'$  kereszteződő vágások. Két eset állhat fent.

**1. eset:**  $x', y'$   $\mathcal{V}$  ugyanazon oldalán van (feltehető, hogy ez  $x$  oldala). Nevezzük el  $x'$ -t és  $y'$ -t úgy, hogy  $\mathcal{V}'$ -nek  $x$ -szel azonos oldalára  $x'$  essen.

# A főlemma bizonyítása

Legyen  $\mathcal{V}'$  egy tetszőleges  $x'y'$  optimális vágás. Tegyük fel, hogy  $\mathcal{V}$  és  $\mathcal{V}'$  kereszteződő vágások. Két eset állhat fent.

- 1. eset:**  $x', y'$   $\mathcal{V}$  ugyanazon oldalán van (feltehető, hogy ez  $x$  oldala). Nevezzük el  $x'$ -t és  $y'$ -t úgy, hogy  $\mathcal{V}'$ -nek  $x$ -szel azonos oldalára  $x'$  essen.
- 2. eset:**  $x', y'$   $\mathcal{V}$  különböző oldalára esik (feltehető, hogy  $x'$  az  $x$  oldalára esik).

# A főlemma bizonyítása: 1. eset





# A főlemma bizonyítása: 1. eset

Itt lehetséges még két aleset (fenti ábrák) attól függően, hogy  $\mathcal{V}'$  az  $x$  és  $y$  csúcsokat elvágja-e vagy sem.


# A főlemma bizonyítása: 1. eset

Itt lehetséges még két aleset (fenti ábrák) attól függően, hogy  $\mathcal{V}'$  az  $x$  és  $y$  csúcsokat elvágja-e vagy sem.



# A főlemma bizonyítása: 1. eset

Itt lehetséges még két aleset (fenti ábrák) attól függően, hogy  $\mathcal{V}'$  az  $x$  és  $y$  csúcsokat elvágja-e vagy sem.



Az ábrán pirossal jelölt vágások közül az egyik  $xy$  vágás (ez legyen  $\mathcal{V}^*$ ), a másik  $x'y'$  vágás (ez legyen  $\mathcal{V}^{**}$ ).

# A főlemma bizonyítása: 1. eset (folytatás)

# A főlemma bizonyítása: 1. eset (folytatás)

Ekkor a szubmodularitás, illetve a pozimodularitás (attól függően, hogy melyik esetben vagyunk és hogy nevezzük el az  $S$ -oldalakat) miatt

$$f(\mathcal{V}) + f(\mathcal{V}') \geq f(\mathcal{V}^*) + f(\mathcal{V}^{**})$$

# A főlemma bizonyítása: 1. eset (folytatás)

Ekkor a szubmodularitás, illetve a pozimodularitás (attól függően, hogy melyik esetben vagyunk és hogy nevezzük el az  $S$ -oldalakat) miatt

$$f(\mathcal{V}) + f(\mathcal{V}') \geq f(\mathcal{V}^*) + f(\mathcal{V}^{**})$$

Azonban egyenlőségnek kell fennállnia, mivel  $\mathcal{V}$  és  $\mathcal{V}'$  optimális/minimális vágások voltak és „feladatukat”  $\mathcal{V}^*$  és  $\mathcal{V}^{**}$  is elvégzi. Tehát

$$f(\mathcal{V}') = f(\mathcal{V}^{**})$$

és  $\mathcal{V}^{**}$  nem keresztezi  $\mathcal{V}$ -t, tehát  $\mathcal{V}^{**}$  teljesíti a kívántakat.

# A főlemma bizonyítása: 2. eset

## A főlemma bizonyítása: 2. eset


Ha  $\mathcal{V}'$  elválasztja  $x$ -t és  $y$ -t, akkor  $\mathcal{V}'$  választható  $\mathcal{V}$ -nek, és készen vagyunk (egy vágás saját magával nem kereszteződő).



# A főlemma bizonyítása: 2. eset

Ha  $\mathcal{V}'$  elválasztja  $x$ -t és  $y$ -t, akkor  $\mathcal{V}'$  választható  $\mathcal{V}$ -nek, és készen vagyunk (egy vágás saját magával nem kereszteződő).

Ha pedig  $\mathcal{V}'$  nem választja el  $x$ -t és  $y$ -t, akkor hasonlóan, mint az 1. esetben található egy másik  $x'y'$  optimális vágás, ami nem keresztezi  $\mathcal{V}$ -t:



Figure

# Algoritmusunk kezdete: szabdalás

# Algoritmusunk kezdete: szabdalás

Válasszunk tetszőlegesen két csúcsot, legyenek ezek  $x$  és  $y$ .  
Határozzunk meg az optimális  $xy$  vágást. Legyen ez  $(S, T)$  úgy,  
hogy  $x \in S$  és  $y \in T$ .

# Algoritmusunk kezdete: szabdalás

Válasszunk tetszőlegesen két csúcsot, legyenek ezek  $x$  és  $y$ .  
Határozzunk meg az optimális  $xy$  vágást. Legyen ez  $(S, T)$  úgy,  
hogy  $x \in S$  és  $y \in T$ .

*$G$ -t két részre szabdaljuk:  $G/T$  legyen az a gráf, amelynek csúcsai az  $S$ -beli csúcsok plusz egy  $m_T$  metacsúcs, ami  $T$ -t reprezentálja, élei pedig az  $S$ -n belüli élek plusz  $\partial S$ -beli élek úgy, hogy az adott  $S$ -beli csúcsot nem az eredeti  $T$ -beli végpontjával, hanem  $m_T$ -vel köti össze.*


# Algoritmusunk kezdete: szabdalás

Válasszunk tetszőlegesen két csúcst, legyenek ezek  $x$  és  $y$ .  
Határozzunk meg az optimális  $xy$  vágást. Legyen ez  $(S, T)$  úgy,  
hogy  $x \in S$  és  $y \in T$ .

*$G$ -t két részre szabdaljuk:  $G/T$  legyen az a gráf, amelynek csúcsai az  $S$ -beli csúcsok plusz egy  $m_T$  metacsúcs, ami  $T$ -t reprezentálja, élei pedig az  $S$ -n belüli élek plusz  $\partial S$ -beli élek úgy, hogy az adott  $S$ -beli csúcst nem az eredeti  $T$ -beli végpontjával, hanem  $m_T$ -vel köti össze.*

$G/S$  definíciója hasonló, csak itt  $m_S$  az új metacsúcs.

## Szabdalás ábrán



Figure

# Az algoritmus: Rekurzív szabdalás

# Az algoritmus: Rekurzív szabdalás

Végül a két részt egy  $m$  metaélel összekötjük, ami  $m_T$ -re és  $m_S$ -re illeszkedik.



# Az algoritmus: Rekurzív szabdalás

Végül a két részt egy  $m$  metaéllal összekötjük, ami  $m_T$ -re és  $m_S$ -re illeszkedik.

Majd a két rész tovább szabdaljuk, amíg lehet:

# Az algoritmus: Rekurzív szabdalás

Végül a két részt egy  $m$  metaélel összekötjük, ami  $m_T$ -re és  $m_S$ -re illeszkedik.


Majd a két rész tovább szabdaljuk, amíg lehet:

## Gomory—Hu-algoritmus: Rekurzív szabdalási algoritmus

Elvégezzük a kezdeti szabdalást.

**Amíg** egy részben van legalább 2 eredeti csúcs, **addig** tovább szabdaljuk (a szabdalást leíró  $x$  és  $y$  csúcs mindig eredeti csúcs).

# A Gomory—Hu-algoritmus képen



**Figure:** A metacsúcsok a pirossal karikázott csúcsok, a köztük haladó élk a metaélek.  $x$  és  $y$  definiálta az eredeti  $\mathcal{V}$  vágást. A kiszámított fából egyetlen él halad ezen vágásban. Ez nem szükségszerűen az  $xy$  él.

# Mi az output?

# Mi az output?

- A rekurzió végén a gráfot szétszabdaltuk részekre úgy, hogy minden részben pontosan egy eredeti csúcs szerepel.

# Mi az output?

- A rekurzió végén a gráfot szétszabdaltuk részekre úgy, hogy minden részben pontosan egy eredeti csúcs szerepel.
- Azaz az algoritmus által kiszámított részek azonosítottak a csúcsokkal.

# Mi az output?

- A rekurzió végén a gráfot szétszabdaltuk részekre úgy, hogy minden részben pontosan egy eredeti csúcs szerepel.
- Azaz az algoritmus által kiszámított részek azonosítottak a csúcsokkal.
- A metaélek különböző csúcsoknak megfelelő részeket kötnek össze.

# Mi az output?

- A rekurzió végén a gráfot szétszabdaltuk részekre úgy, hogy minden részben pontosan egy eredeti csúcs szerepel.
- Azaz az algoritmus által kiszámított részek azonosítottak a csúcsokkal.
- A metaélek különböző csúcsoknak megfelelő részeket kötnek össze.
- Így a metaélek felfoghatók mint az eredeti csúcsok közötti élek.



# Mi az output?

- A rekurzió végén a gráfot szétszabdaltuk részekre úgy, hogy minden részben pontosan egy eredeti csúcs szerepel.
- Azaz az algoritmus által kiszámított részek azonosítottak a csúcsokkal.
- A metaélek különböző csúcsoknak megfelelő részeket kötnek össze.
- Így a metaélek felfoghatók mint az eredeti csúcsok közötti élek.
- Ezek a metaélek alkotják a kiszámolt gráfot (a  $G$  gráf csúcshalmazán).

# Hol a fa? ... Megvan a fa!

# Hol a fa? ... Megvan a fa!

## Észrevétel

A Gomory—Hu-algoritmus által kiszámolt gráf egy fa.

# Hol a fa? ... Megvan a fa!

## Észrevétel

A Gomory—Hu-algoritmus által kiszámolt gráf egy fa.

Valóban:

# Hol a fa? ... Megvan a fa!

## Észrevétel

A Gomory—Hu-algoritmus által kiszámolt gráf egy fa.

Valóban:

- Egy  $n - 1$  élű gráfot számolunk ki  $n$  csúcson.

# Hol a fa? ... Megvan a fa!

## Észrevétel

A Gomory—Hu-algoritmus által kiszámolt gráf egy fa.

Valóban:

- Egy  $n - 1$  élű gráfot számolunk ki  $n$  csúcson.
- A rekurzióból világos (indukcióval formálisan is igazolható), hogy összefüggő gráf lesz outputunk.

# A Gomory—Hu-algoritmus helyessége

# A Gomory—Hu-algoritmus helyessége

## Tétel

A Gomory—Hu-algoritmus által kiszámolt fa egy Gomory—Hu-fa.



# A Gomory—Hu-algoritmus helyessége

## Tétel

A Gomory—Hu-algoritmus által kiszámolt fa egy Gomory—Hu-fa.

A Tétel állítása annak igazolása, hogy minden metaél által definiált vágás egy optimális szeparációja a két végpontjának. Azaz  $n - 1$  állítást kell igazolnunk.

# Grágunk vágásai az alapvágáshoz képest

# Grágunk vágásai az alapvágáshoz képest

Legyen  $\mathcal{V}$  az első szabdaláshoz tartozó vágás.  $G$  vágásai következőképpen csoportosíthatóak:

1.  $\mathcal{V}$ -vel kereszteződők,
2.  $\mathcal{V}$ -vel nem kereszteződő  $\mathcal{V}'$  vágások:
  - a)  $\mathcal{V}' = \mathcal{V}$
  - b)  $\mathcal{V}' = (S', T')$ ,  $S' \subsetneq S$
  - c)  $\mathcal{V}' = (S', T')$ ,  $T' \subsetneq T$

# Grágunk vágásai az alapvágáshoz képest

Legyen  $\mathcal{V}$  az első szabdaláshoz tartozó vágás.  $G$  vágásai következőképpen csoportosíthatóak:

1.  $\mathcal{V}$ -vel kereszteződők,
2.  $\mathcal{V}$ -vel nem kereszteződő  $\mathcal{V}'$  vágások:
  - a)  $\mathcal{V}' = \mathcal{V}$
  - b)  $\mathcal{V}' = (S', T')$ ,  $S' \subsetneq S$
  - c)  $\mathcal{V}' = (S', T')$ ,  $T' \subsetneq T$

## Észrevétel

$G/T$  vágásai azonosíthatók/párbaállíthatók  $\mathcal{V}$ -vel és 2.b) típusú vágásokkal.  $G/S$  vágásai azonosíthatók/párbaállíthatók  $\mathcal{V}$ -vel és 2.c) típusú vágásokkal.  $G/S$ -ben és  $G/T$ -ben ott van  $G$  összes olyan vágása, ami nem keresztezi  $\mathcal{V}$ -t (más nincs).

# A helyesség igazolása: indukció

# A helyesség igazolása: indukció

- Indukciót végzünk, rekurzíven bizonyítunk.

# A helyesség igazolása: indukció

- Indukciót végzünk, rekurzíven bizonyítunk.
- Az indukció elindulása nyilvánvaló.


# A helyesség igazolása: indukció

- Indukciót végzünk, rekurzíven bizonyítunk.
- Az indukció elindulása nyilvánvaló.
- Az  $n - 1$  állításból  $(|S| - 1) + (|T| - 1) = |V| - 2 = n - 2$  él a  $G/S$ , illetve  $G/T$  Gomory—Hu-fájából jön. Ezekre tudjuk a rekurzió alapján a  $G/S$ , illetve  $G/T$  gráfokra vonatkozó optimalitást.



# A helyesség igazolása: indukció

- Indukciót végzünk, rekurzíven bizonyítunk.
- Az indukció elindulása nyilvánvaló.
- Az  $n - 1$  állításból  $(|S| - 1) + (|T| - 1) = |V| - 2 = n - 2$  él a  $G/S$ , illetve  $G/T$  Gomory—Hu-fájából jön. Ezekre tudjuk a rekurzió alapján a  $G/S$ , illetve  $G/T$  gráfokra vonatkozó optimalitást.



**Figure:** A főlemma alapján  $x'y'$  (és így az összes kék él) teljesíti a Gomory—Hu-fától elvártakat

# A főél

# A főél

Az egyetlen probléma a piros él (az első szabdalásból eredő él).

# A főél


Az egyetlen probléma a piros él (az első szabdalásból eredő él).

A Gomory—Hu-fa keresztéle  $x'y'$ . Ez az egyetlen él  $F$ -ben, amire még nem tudjuk az állítást. A probléma, hogy a kiinduló  $\mathcal{V}$  vágást egy optimális  $xy$  vágásnak választottuk. A szabdalás azonban egy  $x'y'$  keresztélhez vezetett és  $x \neq x'$ ,  $y \neq y'$  lehetséges.

# A főél

Az egyetlen probléma a piros él (az első szabdalásból eredő él).

A Gomory—Hu-fa keresztéle  $x'y'$ . Ez az egyetlen él  $F$ -ben, amire még nem tudjuk az állítást. A probléma, hogy a kiinduló  $\mathcal{V}$  vágást egy optimális  $xy$  vágásnak választottuk. A szabdalás azonban egy  $x'y'$  keresztélhez vezetett és  $x \neq x'$ ,  $y \neq y'$  lehetséges.



A metacsúcsok a pirossal karikázott csúcsok, a köztük haladó élek a metaélek.  $x$  és  $y$  definiálta az eredeti  $\mathcal{V}$  vágást. A kiszámított fából egyetlen él halad ezen vágásban. Ez nem szükségszerűen az  $xy$  él.

# Az egyetlen hátramaradt állítás

# Az egyetlen hátramaradt állítás

## Állítás

$x'y'$  él vágása  $(S, T) = \mathcal{V}$  (ami  $w$ -optimális  $xy$  vágásnak lett választva)  $w$ -optimális  $x'y'$  vágás is.

# Az egyetlen hátramaradt állítás

## Állítás

$x'y'$  él vágása  $(S, T) = \mathcal{V}$  (ami  $w$ -optimális  $xy$  vágásnak lett választva)  $w$ -optimális  $x'y'$  vágás is.

Indirekten bizonyítjuk az állítást. Tegyük fel, hogy létezik olyan  $\mathcal{V}'$   $w$ -optimális  $x'y'$  vágás, amelyre  $w(\mathcal{V}') < w(\mathcal{V})$ .



# Az egyetlen hátramaradt állítás

## Állítás

$x'y'$  él vágása  $(S, T) = \mathcal{V}$  (ami  $w$ -optimális  $xy$  vágásnak lett választva)  $w$ -optimális  $x'y'$  vágás is.

Indirekten bizonyítjuk az állítást. Tegyük fel, hogy létezik olyan  $\mathcal{V}'$   $w$ -optimális  $x'y'$  vágás, amelyre  $w(\mathcal{V}') < w(\mathcal{V})$ .

A főlemmából következik, hogy  $\mathcal{V}' = (S', T')$  választható úgy, hogy  $S' \subset S$  vagy  $T' \subset T$ . Feltehető, hogy  $S' \subsetneq S$ .

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)


## Észrevétel

Nem lehet, hogy  $\mathcal{V}'$  ne válassza el  $x$ -et és  $x'$ -t.

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

## Észrevétel

Nem lehet, hogy  $\mathcal{V}'$  ne válassza el  $x$ -et és  $x'$ -t.




Figure

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

## Észrevétel

Nem lehet, hogy  $\mathcal{V}'$  ne válassza el  $x$ -et és  $x'$ -t.




Figure

Azaz nem lehet, hogy  $x$  és  $x'$  ugyanazon az oldalon legyen, míg a másik oldalon van a teljes  $T$ , így  $y$  is.

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

## Észrevétel

Nem lehet, hogy  $\mathcal{V}'$  ne válassza el  $x$ -et és  $x'$ -t.



Figure

Azaz nem lehet, hogy  $x$  és  $x'$  ugyanazon az oldalon legyen, míg a másik oldalon van a teljes  $T$ , így  $y$  is.

Ekkor  $\mathcal{V}'$   $xy$  vágás lenne, ami ellentmondás.  $\mathcal{V}'$  elválasztja  $x$ -et és  $x'$ -t.

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

## Észrevétel

$G/T$ -nek a Gomory-Hu-fájában ott van egy  $\mathcal{V}''$  optimális  $xx'$  vágás.



# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

## Észrevétel

$G/T$ -nek a Gomory-Hu-fájában ott van egy  $\mathcal{V}''$  optimális  $xx'$  vágás.

A  $\mathcal{V}''$  vágás egyik oldalán ott van  $x$ , másik oldalán ott van  $x'$  és vele együtt a  $m_T$  metacsúcs ( $x'$  és  $m_T$  végig együtt marad a szabdalások után, így lett  $F$  keresztéle  $x'$ -re illeszkedő).

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

## Észrevétel

$G/T$ -nek a Gomory-Hu-fájában ott van egy  $\mathcal{V}''$  optimális  $xx'$  vágás.

A  $\mathcal{V}''$  vágás egyik oldalán ott van  $x$ , másik oldalán ott van  $x'$  és vele együtt a  $m_T$  metacsúcs ( $x'$  és  $m_T$  végig együtt marad a szabdalások után, így lett  $F$  keresztéle  $x'$ -re illeszkedő).

Kezdeti észrevételünk alapján  $\mathcal{V}''$ -nek megfelel egy  $\widetilde{\mathcal{V}}''$  vágás  $G$ -ben. A fentiek alapján ez egy  $xy$  vágás,  $w$ -súlya kisebb mint  $\mathcal{V}$ -é, ellentmondás.

# Az egyetlen hátramaradt állítás bizonyítása (folytatás)

## Észrevétel

$G/T$ -nek a Gomory-Hu-fájában ott van egy  $\mathcal{V}''$  optimális  $xx'$  vágás.

A  $\mathcal{V}''$  vágás egyik oldalán ott van  $x$ , másik oldalán ott van  $x'$  és vele együtt a  $m_T$  metacsúcs ( $x'$  és  $m_T$  végig együtt marad a szabdalások után, így lett  $F$  keresztéle  $x'$ -re illeszkedő).

Kezdeti észrevételünk alapján  $\mathcal{V}''$ -nek megfelel egy  $\widetilde{\mathcal{V}}''$  vágás  $G$ -ben. A fentiek alapján ez egy  $xy$  vágás,  $w$ -súlya kisebb mint  $\mathcal{V}$ -é, ellentmondás.

Az ellentmondás igazolja az állítást, ami az egyetlen hiányzó rész volt a Gomory—Hu-algoritmus helyességének bizonyításából.

# Összefoglalás

## Gomory—Hu-tétel

Minden  $(G, w)$ -hez létezik  $F$  Gomory-Hu-fa, és ez kiszámolható  $n - 1$  darab minimális  $st$  vágás meghatározásával, ami a folyam algoritmus  $n - 1$ -szeres alkalmazásával megoldható. Speciálisan a Gomory—Hu-algoritmus polinomiális.

# Vége van!

Köszönöm a figyelmet!