

# Egész politópok

Hajnal Péter

2021. tavasz

# IP feladatok LP relaxációja

# IP feladatok LP relaxációja

## Definíció

Az alábbi egész értékű optimalizálási (IP) feladattól

Minimalizáljuk	$c^T x - t$
Feltéve, hogy	$x \in \mathcal{P}$
	$x \in \mathbb{Z}^n$

elhagyjuk az  $x \in \mathbb{Z}^n$  feltételt. Ezzel a feladattal szoros kapcsolatban lévő

Minimalizáljuk	$c^T x - t$
Feltéve, hogy	$x \in \mathcal{P}$

LP feladatot kapunk. Ezt az eredeti IP feladat LP relaxációjának nevezzük.

# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

- Az IP feladat nagyon általános.

# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

- Az IP feladat nagyon általános.  $\mathcal{NP}$ -teljes problémák könnyen megfogalmazhatók benne.

# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

- Az IP feladat nagyon általános.  $\mathcal{NP}$ -teljes problémák könnyen megfogalmazhatók benne. Nem várható, hogy általában hatékonyan megoldható lenne.

# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

- Az IP feladat nagyon általános.  $\mathcal{NP}$ -teljes problémák könnyen megfogalmazhatók benne. Nem várható, hogy általában hatékonyan megoldható lenne.
- Az LP problémák viszont hatékonyan kezelhetők.



# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

- Az IP feladat nagyon általános.  $\mathcal{NP}$ -teljes problémák könnyen megfogalmazhatók benne. Nem várható, hogy általában hatékonyan megoldható lenne.
- Az LP problémák viszont hatékonyan kezelhetők.
- Általában ez a relaxáció valódi egyszerűsítés.

# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

- Az IP feladat nagyon általános.  $\mathcal{NP}$ -teljes problémák könnyen megfogalmazhatók benne. Nem várható, hogy általában hatékonyan megoldható lenne.
- Az LP problémák viszont hatékonyan kezelhetők.
- Általában ez a relaxáció valódi egyszerűsítés. Ennek ellenére ez is adhat hasznos információt a kiinduló feladatról.

# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

- Az IP feladat nagyon általános.  $\mathcal{NP}$ -teljes problémák könnyen megfogalmazhatók benne. Nem várható, hogy általában hatékonyan megoldható lenne.
- Az LP problémák viszont hatékonyan kezelhetők.
- Általában ez a relaxáció valódi egyszerűsítés. Ennek ellenére ez is adhat hasznos információt a kiinduló feladatról.

## Észrevétel

Ha a kiinduló IP feladat optimuma  $p_I^*$ , az LP relaxációé  $p^*$ , akkor

$$p^* \leq p_I^*.$$

# IP feladat és LP relaxációjának kapcsolata

- Az IP feladat nagyon általános.  $\mathcal{NP}$ -teljes problémák könnyen megfogalmazhatók benne. Nem várható, hogy általában hatékonyan megoldható lenne.
- Az LP problémák viszont hatékonyan kezelhetők.
- Általában ez a relaxáció valódi egyszerűsítés. Ennek ellenére ez is adhat hasznos információt a kiinduló feladatról.

## Észrevétel

Ha a kiinduló IP feladat optimuma  $p_I^*$ , az LP relaxációé  $p^*$ , akkor

$$p^* \leq p_I^*.$$

- Az LP relaxáción keresztül könnyen kiszámítható alsó becslést kapunk az optimális értékre.

# Egész poliéderek

# Egész poliéderek

## Definíció

$\mathcal{P} = \{x: Ax \preceq b\}$  rendes poliéder egész, ha  $\text{ext}(\mathcal{P}) \subseteq \mathbb{Z}^n$ , azaz minden extrémális pontja egész koordinátájú, továbbá  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ .

# Egész poliéderek

## Definíció

$\mathcal{P} = \{x: Ax \preceq b\}$  rendes poliéder egész, ha  $\text{ext}(\mathcal{P}) \subseteq \mathbb{Z}^n$ , azaz minden extrémális pontja egész koordinátájú, továbbá  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ .

- Politópok esetén az előző definíció ekvivalens azzal, hogy  $\mathcal{P}$  politóp egész, ha véges sok  $\mathbb{Z}^n$ -beli pont konvex burka.

# Egész poliéderek

## Definíció

$\mathcal{P} = \{x: Ax \preceq b\}$  rendes poliéder egész, ha  $\text{ext}(\mathcal{P}) \subseteq \mathbb{Z}^n$ , azaz minden extrémális pontja egész koordinátájú, továbbá  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ .

- Politópok esetén az előző definíció ekvivalens azzal, hogy  $\mathcal{P}$  politóp egész, ha véges sok  $\mathbb{Z}^n$ -beli pont konvex burka.
- A fentiekből ha az IP feladat folytonos feltételei által definiált  $\mathcal{P}$  poliéder egész, akkor az LP relaxáció optimális helyei között lesz egész koordinátájú (hiszen a  $\mathcal{P}$  csúcsai ilyenek). Azaz ebben az esetben  $p_j^* = p^*$ .



# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják I

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják I

## Edmonds—Giles-tétel

$\mathcal{P} = \{x: Ax \preceq b\} \neq \emptyset$  poliéder,  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Ekkor a következők ekvivalensek:

- (i)  $\mathcal{P}$  poliéder egész (azaz  $\text{ext}(\mathcal{P}) \subseteq \mathbb{Z}^n$ ).
- (ii) Minden  $c \in \mathbb{R}^n$  célvektor esetén

Minimalizáljuk	$c^T x$ -t
Feltéve, hogy	$x \in \mathcal{P}$

LP feladatra vagy  $p^* = -\infty$  vagy van  $\mathbb{Z}^n$ -beli optimumhelye.

- (iii) Minden  $c \in \mathbb{Z}^n$ -re

Minimalizáljuk	$c^T x$ -t
Feltéve, hogy	$x \in \mathcal{P}$

optimális értéke  $-\infty$  vagy egész.

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják I

## Edmonds—Giles-tétel

$\mathcal{P} = \{x: Ax \preceq b\} \neq \emptyset$  poliéder,  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Ekkor a következők ekvivalensek:

- (i)  $\mathcal{P}$  poliéder egész (azaz  $\text{ext}(\mathcal{P}) \subseteq \mathbb{Z}^n$ ).
- (ii) Minden  $c \in \mathbb{R}^n$  célvektor esetén

Minimalizáljuk	$c^T x$ -t
Feltéve, hogy	$x \in \mathcal{P}$

LP feladatra vagy  $p^* = -\infty$  vagy van  $\mathbb{Z}^n$ -beli optimumhelye.

- (iii) Minden  $c \in \mathbb{Z}^n$ -re

Minimalizáljuk	$c^T x$ -t
Feltéve, hogy	$x \in \mathcal{P}$

optimális értéke  $-\infty$  vagy egész.

# Bizonyítás

# Bizonyítás

(iii)  $\Rightarrow$  (i)

# Bizonyítás

(iii) $\Rightarrow$ (i)

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ , ami azt jelenti, hogy van olyan  $\nu \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ , és  $\tau \in \mathbb{R}$ , hogy

$$(\star) \quad \mathcal{P} \subset \{x: \nu^T x \geq \tau\} \text{ és } \nu^T e = \tau.$$

# Bizonyítás

(iii) $\Rightarrow$ (i)

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ , ami azt jelenti, hogy van olyan  $\nu \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ , és  $\tau \in \mathbb{R}$ , hogy

$$(\star) \quad \mathcal{P} \subset \{x: \nu^T x \geq \tau\} \text{ és } \nu^T e = \tau.$$

- A  $\nu$  normálvektor nem egyértelmű.

# Bizonyítás

(iii) $\Rightarrow$ (i)

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ , ami azt jelenti, hogy van olyan  $\nu \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ , és  $\tau \in \mathbb{R}$ , hogy

$$(\star) \quad \mathcal{P} \subset \{x: \nu^T x \geq \tau\} \text{ és } \nu^T e = \tau.$$

- A  $\nu$  normálvektor nem egyértelmű. Nyilván szorozható pozitív számmal és új lehetséges  $\nu$ -t kapunk (új  $\tau$ -val).



# Bizonyítás

(iii) $\Rightarrow$ (i)

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ , ami azt jelenti, hogy van olyan  $\nu \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ , és  $\tau \in \mathbb{R}$ , hogy

$$(\star) \quad \mathcal{P} \subset \{x: \nu^T x \geq \tau\} \text{ és } \nu^T e = \tau.$$

- A  $\nu$  normálvektor nem egyértelmű. Nyilván szorozható pozitív számmal és új lehetséges  $\nu$ -t kapunk (új  $\tau$ -val). Geometrialig „érezhető” és egyszerűen belátható, hogy egy alkalmas pozitív  $\varepsilon$  esetén egy lehetséges  $\nu$ -höz legfeljebb  $\varepsilon$  távolságra lévő vektorok is jók normálvektornak.

# Bizonyítás

(iii) $\Rightarrow$ (i)

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ , ami azt jelenti, hogy van olyan  $\nu \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ , és  $\tau \in \mathbb{R}$ , hogy

$$(\star) \quad \mathcal{P} \subset \{x: \nu^T x \geq \tau\} \text{ és } \nu^T e = \tau.$$

- A  $\nu$  normálvektor nem egyértelmű. Nyilván szorozható pozitív számmal és új lehetséges  $\nu$ -t kapunk (új  $\tau$ -val). Geometrialig „érezhető” és egyszerűen belátható, hogy egy alkalmas pozitív  $\varepsilon$  esetén egy lehetséges  $\nu$ -höz legfeljebb  $\varepsilon$  távolságra lévő vektorok is jók normálvektornak.
- Ezen két megjegyzés alapján van olyan  $\nu \in \mathbb{Z}^n$  vektor, hogy  $\nu$  és a  $\nu + e_i$  vektorok is alkalmasak legyenek  $(\star)$  kielégítésére,

# Bizonyítás

(iii)  $\Rightarrow$  (i)

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ , ami azt jelenti, hogy van olyan  $\nu \neq 0 \in \mathbb{R}^n$ , és  $\tau \in \mathbb{R}$ , hogy

$$(*) \quad \mathcal{P} \subset \{x: \nu^T x \geq \tau\} \text{ és } \nu^T e = \tau.$$

- A  $\nu$  normálvektor nem egyértelmű. Nyilván szorozható pozitív számmal és új lehetséges  $\nu$ -t kapunk (új  $\tau$ -val). Geometrialig „érezhető” és egyszerűen belátható, hogy egy alkalmas pozitív  $\varepsilon$  esetén egy lehetséges  $\nu$ -höz legfeljebb  $\varepsilon$  távolságra lévő vektorok is jók normálvektornak.
- Ezen két megjegyzés alapján van olyan  $\nu \in \mathbb{Z}^n$  vektor, hogy  $\nu$  és a  $\nu + e_i$  vektorok is alkalmasak legyenek  $(*)$  kielégítésére, ahol  $e_i$ -k a standard  $n$  dimenziós egységvektorok ( $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ ).

# Bizonyítás (folytatás)

# Bizonyítás (folytatás)

- A  $\nu$  és az  $(\nu + e_j)$ -k lehetséges  $c$  értékek a tétel (iii) feltételében.

# Bizonyítás (folytatás)

- A  $\nu$  és az  $(\nu + e_i)$ -k lehetséges  $c$  értékek a tétel (iii) feltételében.
- Továbbá a hozzájuk tartozó optimális értékek  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$ .

# Bizonyítás (folytatás)

- A  $\nu$  és az  $(\nu + e_i)$ -k lehetséges  $c$  értékek a tétel (iii) feltételében.
- Továbbá a hozzájuk tartozó optimális értékek  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$ .
- Valóban.

# Bizonyítás (folytatás)

- A  $\nu$  és az  $(\nu + e_i)$ -k lehetséges  $c$  értékek a tétel (iii) feltételében.
- Továbbá a hozzájuk tartozó optimális értékek  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$ .
- Valóban. Ha  $\nu^T x$ -et minimalizáljuk  $\mathcal{P}$ -n, akkor legalább akkora értéket kapunk mintha a  $\mathcal{P}$ -t tartalmazó  $\{x: \nu^T x \geq \tau\}$  féltéren optimalizálnánk.



# Bizonyítás (folytatás)

- A  $\nu$  és az  $(\nu + e_i)$ -k lehetséges  $c$  értékek a tétel (iii) feltételében.
- Továbbá a hozzájuk tartozó optimális értékek  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$ .
- Valóban. Ha  $\nu^T x$ -et minimalizáljuk  $\mathcal{P}$ -n, akkor legalább akkora értéket kapunk mintha a  $\mathcal{P}$ -t tartalmazó  $\{x: \nu^T x \geq \tau\}$  féltéren optimalizálnánk. Azaz a minimum érték legalább  $\tau$ , ami fel is vevődik az  $e$  csúcsban.

# Bizonyítás (folytatás)

- A  $\nu$  és az  $(\nu + e_i)$ -k lehetséges  $c$  értékek a tétel (iii) feltételében.
- Továbbá a hozzájuk tartozó optimális értékek  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$ .
- Valóban. Ha  $\nu^T x$ -et minimalizáljuk  $\mathcal{P}$ -n, akkor legalább akkora értéket kapunk mintha a  $\mathcal{P}$ -t tartalmazó  $\{x: \nu^T x \geq \tau\}$  félteren optimalizálnánk. Azaz a minimum érték legalább  $\tau$ , ami fel is vevődik az  $e$  csúcsban.
- Tehát (iii) alapján az  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$  optimális értékek egészek.

# Bizonyítás (folytatás)

- A  $\nu$  és az  $(\nu + e_i)$ -k lehetséges  $c$  értékek a tétel (iii) feltételében.
- Továbbá a hozzájuk tartozó optimális értékek  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$ .
- Valóban. Ha  $\nu^T x$ -et minimalizáljuk  $\mathcal{P}$ -n, akkor legalább akkora értéket kapunk mintha a  $\mathcal{P}$ -t tartalmazó  $\{x: \nu^T x \geq \tau\}$  féltéren optimalizálnánk. Azaz a minimum érték legalább  $\tau$ , ami fel is vevődik az  $e$  csúcsban.
- Tehát (iii) alapján az  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$  optimális értékek egészek.
- Speciálisan  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$   $i$ -edik koordinátája:  
 $e_i^T e = (\nu + e_i)^T e - \nu^T e$  is egész.

# Bizonyítás (folytatás)

- A  $\nu$  és az  $(\nu + e_i)$ -k lehetséges  $c$  értékek a tétel (iii) feltételében.
- Továbbá a hozzájuk tartozó optimális értékek  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$ .
- Valóban. Ha  $\nu^T x$ -et minimalizáljuk  $\mathcal{P}$ -n, akkor legalább akkora értéket kapunk mintha a  $\mathcal{P}$ -t tartalmazó  $\{x: \nu^T x \geq \tau\}$  féltéren optimalizálnánk. Azaz a minimum érték legalább  $\tau$ , ami fel is vevődik az  $e$  csúcsban.
- Tehát (iii) alapján az  $\nu^T e$  és  $(\nu + e_i)^T e$  optimális értékek egészek.
- Speciálisan  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$   $i$ -edik koordinátája:  
 $e_i^T e = (\nu + e_i)^T e - \nu^T e$  is egész.
- Tehát  $e$  tetszőleges komponense egész, azaz  $e$  egész vektor.

## Szünet



# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják II: Totálisan unimoduláris mátrixok

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják II: Totálisan unimoduláris mátrixok

## Definíció

$M \in \mathbb{R}^{k \times n}$  totálisan unimodulárisnak (röviden TU) nevezük, ha minden  $N$  négyzetes részmátrixára teljesül, hogy  $\det N \in \{-1, 0, 1\}$ .

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják II: Totálisan unimoduláris mátrixok

## Definíció

$M \in \mathbb{R}^{k \times n}$  totálisan unimodulárisnak (röviden TU) nevezük, ha minden  $N$  négyzetes részmátrixára teljesül, hogy  $\det N \in \{-1, 0, 1\}$ .

- Speciálisan egy TU mátrix minden  $1 \times 1$  méretű részmátrixának determinánsa is 0 vagy  $\pm 1$ .



# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják II: Totálisan unimoduláris mátrixok

## Definíció

$M \in \mathbb{R}^{k \times n}$  totálisan unimodulárisnak (röviden TU) nevezük, ha minden  $N$  négyzetes részmátrixára teljesül, hogy  $\det N \in \{-1, 0, 1\}$ .

- Speciálisan egy TU mátrix minden  $1 \times 1$  méretű részmátrixának determinánsa is 0 vagy  $\pm 1$ . Azaz elemei csak  $-1, 0$  vagy  $1$  értékűek lehetnek.

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják II: Totálisan unimoduláris mátrixok

## Definíció

$M \in \mathbb{R}^{k \times n}$  totálisan unimodulárisnak (röviden TU) nevezük, ha minden  $N$  négyzetes részmátrixára teljesül, hogy  $\det N \in \{-1, 0, 1\}$ .

- Speciálisan egy TU mátrix minden  $1 \times 1$  méretű részmátrixának determinánsa is 0 vagy  $\pm 1$ . Azaz elemei csak  $-1, 0$  vagy  $1$  értékűek lehetnek.

## Tétel

Ha  $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$  totálisan unimoduláris mátrix és  $b \in \mathbb{Z}^k$ , akkor  $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \preceq b\}$  egész poliéder.

# Bizonyítás

# Bizonyítás

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ .

# Bizonyítás

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ . Speciálisan  $e \in \mathcal{P}$  és azon egyenlőtlenségek, amelyeket  $e$  élessé tesz olyanok, hogy bal oldalain szereplő vektorok kifeszítik  $\mathbb{R}^n$ -et.

# Bizonyítás

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ . Speciálisan  $e \in \mathcal{P}$  és azon egyenlőtlenségek, amelyeket  $e$  élessé tesz olyanok, hogy bal oldalain szereplő vektorok kifeszítik  $\mathbb{R}^n$ -et.
- Azaz  $A$ -nak vannak olyan sorai:  $a_{i_1}^\top, \dots, a_{i_n}^\top$ , melyek lineárisan függetlenek és

$$\begin{aligned} a_{i_1}^\top e &= b_{i_1} \\ &\vdots \\ a_{i_n}^\top e &= b_{i_n}. \end{aligned}$$

# Bizonyítás

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ . Speciálisan  $e \in \mathcal{P}$  és azon egyenlőtlenségek, amelyeket  $e$  élessé tesz olyanok, hogy bal oldalain szereplő vektorok kifeszítik  $\mathbb{R}^n$ -et.
- Azaz  $A$ -nak vannak olyan sorai:  $a_{i_1}^\top, \dots, a_{i_n}^\top$ , melyek lineárisan függetlenek és

$$\begin{aligned} a_{i_1}^\top e &= b_{i_1} \\ &\vdots \\ a_{i_n}^\top e &= b_{i_n}. \end{aligned}$$

- Ebből ( $A$  és  $b$  ismeretében)  $e$  kifejezhető a Cramer-szabály segítségével.

# Bizonyítás

- Legyen  $e \in \text{ext}(\mathcal{P})$ . Speciálisan  $e \in \mathcal{P}$  és azon egyenlőtlenségek, amelyeket  $e$  élessé tesz olyanok, hogy bal oldalain szereplő vektorok kifeszítik  $\mathbb{R}^n$ -et.
- Azaz  $A$ -nak vannak olyan sorai:  $a_{i_1}^\top, \dots, a_{i_n}^\top$ , melyek lineárisan függetlenek és

$$\begin{aligned} a_{i_1}^\top e &= b_{i_1} \\ &\vdots \\ a_{i_n}^\top e &= b_{i_n}. \end{aligned}$$

- Ebből ( $A$  és  $b$  ismeretében)  $e$  kifejezhető a Cramer-szabály segítségével.

Az egyes koordináták számolásánál egész számokkal dolgozunk, és egyetlen osztás fordul elő. Az osztó az  $A$  mátrix egy négyzetes almatrixának determinánsa. Az almatrix nem elfajuló, azaz a determináns nem lehet 0. Tehát értéke  $-1$  vagy  $1$ . Az ezzel való osztás pedig szintén nem vezet ki az egészek köréből.



# TU mátrixok: Példa I

# TU mátrixok: Példa I

- $G$  hurokél-nélküli gráf pont-él illeszkedési mátrixa az a  $\mathcal{B}_G$  mátrix, amely sorai a csúcsokkal, oszlopai az élekkel azonosítottak és egy  $v \in V$  csúcs sorának és egy  $e \in E$  éloszlopának találkozásánál

$$(\mathcal{B}_G)_{v,e} = \begin{cases} 1, & \text{ha } v \text{ illeszkedik } e\text{-re,} \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

# TU mátrixok: Példa I

- $G$  hurokél-nélküli gráf pont-él illeszkedési mátrixa az a  $\mathcal{B}_G$  mátrix, amely sorai a csúcsokkal, oszlopai az élekkel azonosítottak és egy  $v \in V$  csúcs sorának és egy  $e \in E$  éloszlopának találkozásánál

$$(\mathcal{B}_G)_{v,e} = \begin{cases} 1, & \text{ha } v \text{ illeszkedik } e\text{-re,} \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

- Vegyük észre, hogy  $\mathcal{B}_G$  minden oszlopa pontosan két nem-0 elemet tartalmaz, két darab 1-est.

# TU mátrixok: Példa I

- $G$  hurokél-nélküli gráf pont-él illeszkedési mátrixa az a  $\mathcal{B}_G$  mátrix, amely sorai a csúcsokkal, oszlopai az élekkel azonosítottak és egy  $v \in V$  csúcs sorának és egy  $e \in E$  éloszlopának találkozásánál

$$(\mathcal{B}_G)_{v,e} = \begin{cases} 1, & \text{ha } v \text{ illeszkedik } e\text{-re,} \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

- Vegyük észre, hogy  $\mathcal{B}_G$  minden oszlopa pontosan két nem-0 elemet tartalmaz, két darab 1-est.
- Legyen  $G$  egy három pontú teljes gráf: Ekkor

$$\mathcal{B}_{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

# TU mátrixok: Példa I

- $G$  hurokél-nélküli gráf pont-él illeszkedési mátrixa az a  $\mathcal{B}_G$  mátrix, amely sorai a csúcsokkal, oszlopai az élekkel azonosítottak és egy  $v \in V$  csúcs sorának és egy  $e \in E$  éloszlopának találkozásánál

$$(\mathcal{B}_G)_{v,e} = \begin{cases} 1, & \text{ha } v \text{ illeszkedik } e\text{-re,} \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

- Vegyük észre, hogy  $\mathcal{B}_G$  minden oszlopa pontosan két nem-0 elemet tartalmaz, két darab 1-est.
- Legyen  $G$  egy három pontú teljes gráf: Ekkor

$$\mathcal{B}_{K_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- A teljes mátrix önmaga egy négyzetes részmátrixa. Mivel  $\det \mathcal{B}_{K_3} = 2$ , ezért  $\mathcal{B}_{K_3}$  nem TU.

# TU mátrixok: Példák II

# TU mátrixok: Példák II

- Így ha  $G$  tartalmaz három elemű klikket, akkor  $\mathcal{B}_G$  tartalmazza a fenti rész mátrixot, speciálisan nem TU.

# TU mátrixok: Példák II

- Így ha  $G$  tartalmaz három elemű klikket, akkor  $\mathcal{B}_G$  tartalmazza a fenti részmátrixot, speciálisan nem TU.
- Hasonlóan megmutatható, hogy egy páratlan hosszú kör pont-él illeszkedési mátrixa (ami négyzetes) szintén 2 determinánsú.



# TU mátrixok: Példák II

- Így ha  $G$  tartalmaz három elemű klikket, akkor  $\mathcal{B}_G$  tartalmazza a fenti részmátrixot, speciálisan nem TU.
- Hasonlóan megmutatható, hogy egy páratlan hosszú kör pont-él illeszkedési mátrixa (ami négyzetes) szintén 2 determinánsú.
- Speciálisan, ha egy gráf tartalmaz páratlan hosszú kört feszítve (ami azzal ekvivalens, hogy nem páros), akkor pont-él illeszkedési mátrixa nem TU.

# TU mátrixok: Példák II

- Így ha  $G$  tartalmaz három elemű klikket, akkor  $B_G$  tartalmazza a fenti részmátrixot, speciálisan nem TU.
- Hasonlóan megmutatható, hogy egy páratlan hosszú kör pont-él illeszkedési mátrixa (ami négyzetes) szintén 2 determinánsú.
- Speciálisan, ha egy gráf tartalmaz páratlan hosszú kört feszítve (ami azzal ekvivalens, hogy nem páros), akkor pont-él illeszkedési mátrixa nem TU.
- Látni fogjuk, hogy ha  $G$  páros gráf, akkor  $B_G$  egy TU mátrix.

# TU mátrixok: Példák III

## TU mátrixok: Példák III

## Példa

$\vec{G}$  hurokmentes irányított gráf. Ekkor a  $\vec{G}$  gráf  $\mathcal{D}$  pont-él illeszkedési mátrixának egy  $\mathcal{D}_{v,e}$  eleme (a  $v$  sorának és  $e$  él oszlopának találkozásában álló elem) a következő:

$$\mathcal{D}_{v,e} = \begin{cases} +1, & \text{ha a pontba "befut" az él} \\ -1, & \text{ha a pontból "kifut" az él} \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

## TU mátrixok: Példák III

## Példa

$\vec{G}$  hurokmentes irányított gráf. Ekkor a  $\vec{G}$  gráf  $\mathcal{D}$  pont-él illeszkedési mátrixának egy  $\mathcal{D}_{v,e}$  eleme (a  $v$  sorának és  $e$  él oszlopának találkozásában álló elem) a következő:

$$\mathcal{D}_{v,e} = \begin{cases} +1, & \text{ha a pontba "befut" az él} \\ -1, & \text{ha a pontból "kifut" az él} \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Látható, hogy  $\mathcal{D}_G$  minden oszlopában egy darab 1-es és egy darab  $(-1)$ -es szerepel, a többi elem 0.

## TU mátrixok: Példák III

## Példa

$\vec{G}$  hurokélmentes irányított gráf. Ekkor a  $\vec{G}$  gráf  $\mathcal{D}$  pont-él illeszkedési mátrixának egy  $\mathcal{D}_{v,e}$  eleme (a  $v$  sorának és  $e$  él oszlopának találkozásában álló elem) a következő:

$$\mathcal{D}_{v,e} = \begin{cases} +1, & \text{ha a pontba "befut" az él} \\ -1, & \text{ha a pontból "kifut" az él} \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Látható, hogy  $\mathcal{D}_G$  minden oszlopában egy darab 1-es és egy darab  $(-1)$ -es szerepel, a többi elem 0.

- Látni fogjuk, hogy tetszőleges  $G$  irányított gráfra  $\mathcal{D}_G$  mátrix totálisan unimoduláris.

# TU mátrixok: Operációk

# TU mátrixok: Operációk

## Lemma

Legyen  $A$  totálisan unimoduláris mátrix. Képezzük  $A$ -ból  $\tilde{A}$ -t a következő szabályok/operációk alkalmazásával:

- (i) Sorok/oszlopok  $-1$ -gyel való szorzása.
- (ii) Sorok/oszlopok elhagyása.
- (iii) Egy létező sorok/oszlopok megismétlése.
- (iv)  $e_i$  sorok/oszlopok hozzáadásával, ahol  $e_i$  egy darab nem nulla elemet tartalmaz, ami  $1$ -es.
- (v) Transzponálás.

Ekkor az így kapott  $\tilde{A}$  mátrix is totálisan unimoduláris.



# TU mátrixok: Példák és bizonyításuk

# TU mátrixok: Példák és bizonyításuk

## Tétel

- (i) Legyen  $G$  egy tetszőleges páros gráf. Ekkor  $\mathcal{B}_G$  egy TU mátrix.
- (ii) Legyen  $\vec{G}$  egy tetszőleges irányított gráf. Ekkor  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  egy TU mátrix.

# TU mátrixok: Példák és bizonyításuk

## Tétel

- (i) Legyen  $G$  egy tetszőleges páros gráf. Ekkor  $\mathcal{B}_G$  egy TU mátrix.
  - (ii) Legyen  $\vec{G}$  egy tetszőleges irányított gráf. Ekkor  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  egy TU mátrix.
- A két állítást egy ideig párhuzamosan igazoljuk.  $k$ -ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítunk.

# TU mátrixok: Példák és bizonyításuk

## Tétel

- (i) Legyen  $G$  egy tetszőleges páros gráf. Ekkor  $\mathcal{B}_G$  egy TU mátrix.
  - (ii) Legyen  $\vec{G}$  egy tetszőleges irányított gráf. Ekkor  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  egy TU mátrix.
- 
- A két állítást egy ideig párhuzamosan igazoljuk.  $k$ -ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítunk.
  - $k = 1$ -re teljesül az állítás, hiszen mindkét mátrix elemei a  $\{-1, 0, 1\}$  halmazból kerülnek ki.

# TU mátrixok: Példák és bizonyításuk

## Tétel

- (i) Legyen  $G$  egy tetszőleges páros gráf. Ekkor  $\mathcal{B}_G$  egy TU mátrix.
- (ii) Legyen  $\vec{G}$  egy tetszőleges irányított gráf. Ekkor  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  egy TU mátrix.

- A két állítást egy ideig párhuzamosan igazoljuk.  $k$ -ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítunk.
- $k = 1$ -re teljesül az állítás, hiszen mindkét mátrix elemei a  $\{-1, 0, 1\}$  halmazból kerülnek ki.
- Indukcós lépés.

# TU mátrixok: Példák és bizonyításuk

## Tétel

- (i) Legyen  $G$  egy tetszőleges páros gráf. Ekkor  $\mathcal{B}_G$  egy TU mátrix.
- (ii) Legyen  $\vec{G}$  egy tetszőleges irányított gráf. Ekkor  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  egy TU mátrix.

- A két állítást egy ideig párhuzamosan igazoljuk.  $k$ -ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítunk.
- $k = 1$ -re teljesül az állítás, hiszen mindkét mátrix elemei a  $\{-1, 0, 1\}$  halmazból kerülnek ki.
- Indukcós lépés. Tegyük fel, hogy  $k$ -nál kevesebb sorú négyzetes almátrixokról tudjuk, hogy determinánsuk  $\pm 1$  vagy  $0$ . Legyen  $N$  egy  $k \times k$  méretű részmatrix.

# TU mátrixok: Példák és bizonyításuk

## Tétel

- (i) Legyen  $G$  egy tetszőleges páros gráf. Ekkor  $\mathcal{B}_G$  egy TU mátrix.
- (ii) Legyen  $\vec{G}$  egy tetszőleges irányított gráf. Ekkor  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  egy TU mátrix.

- A két állítást egy ideig párhuzamosan igazoljuk.  $k$ -ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítunk.
- $k = 1$ -re teljesül az állítás, hiszen mindkét mátrix elemei a  $\{-1, 0, 1\}$  halmazból kerülnek ki.
- Indukcós lépés. Tegyük fel, hogy  $k$ -nál kevesebb sorú négyzetes almátrixokról tudjuk, hogy determinánsuk  $\pm 1$  vagy  $0$ . Legyen  $N$  egy  $k \times k$  méretű részmátrix. Erre is igazolnunk kell, hogy determinánsának értéke  $\pm 1$  vagy  $0$ .

# Bizonyítás (folytatás): 3 eset



# Bizonyítás (folytatás): 3 eset

## 1. eset:

# Bizonyítás (folytatás): 3 eset

1. eset:  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz.

# Bizonyítás (folytatás): 3 eset

**1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.

# Bizonyítás (folytatás): 3 eset

- 1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.
- 2. eset:**  $N$  valamelyik oszlopa egyetlen nem-0 értéket és 0-kat tartalmaz. Tudjuk, hogy a nem-0 elem  $-1$  vagy  $1$  (a páros esetben csak  $1$  lehet a nem-0 elem).

## Bizonyítás (folytatás): 3 eset

- 1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.
- 2. eset:**  $N$  valamelyik oszlopa egyetlen nem-0 értéket és 0-kat tartalmaz. Tudjuk, hogy a nem-0 elem  $-1$  vagy  $1$  (a páros esetben csak  $1$  lehet a nem-0 elem). Ekkor van erre az oszlopra vonatkozó kifejtés és az indukciós feltevés adja az állítást.

## Bizonyítás (folytatás): 3 eset

- 1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.
- 2. eset:**  $N$  valamelyik oszlopa egyetlen nem-0 értéket és 0-kat tartalmaz. Tudjuk, hogy a nem-0 elem  $-1$  vagy  $1$  (a páros esetben csak  $1$  lehet a nem-0 elem). Ekkor van erre az oszlopra vonatkozó kifejtés és az indukciós feltevés adja az állítást.
- 3. eset:** A fenti két eset komplementere. A kétféle mátrix esetében ez azt jelenti, hogy minden oszlopban pontosan két nem-0 elem szerepel.

## Bizonyítás (folytatás): 3 eset

- 1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.
- 2. eset:**  $N$  valamelyik oszlopa egyetlen nem-0 értéket és 0-kat tartalmaz. Tudjuk, hogy a nem-0 elem  $-1$  vagy  $1$  (a páros esetben csak  $1$  lehet a nem-0 elem). Ekkor van erre az oszlopra vonatkozó kifejtés és az indukciós feltevés adja az állítást.
- 3. eset:** A fenti két eset komplementere. A kétféle mátrix esetében ez azt jelenti, hogy minden oszlopban pontosan két nem-0 elem szerepel.

A bizonyítás most kétfelé ágazik.

## Bizonyítás (folytatás): 3 eset

- 1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.
- 2. eset:**  $N$  valamelyik oszlopa egyetlen nem-0 értéket és 0-kat tartalmaz. Tudjuk, hogy a nem-0 elem  $-1$  vagy  $1$  (a páros esetben csak  $1$  lehet a nem-0 elem). Ekkor van erre az oszlopra vonatkozó kifejtés és az indukciós feltevés adja az állítást.
- 3. eset:** A fenti két eset komplementere. A kétféle mátrix esetében ez azt jelenti, hogy minden oszlopban pontosan két nem-0 elem szerepel.

A bizonyítás most kétfelé ágazik.  $\mathcal{D}_{\vec{g}}$  esetén tudjuk, hogy a sorok összege a 0 vektor lesz.



## Bizonyítás (folytatás): 3 eset

- 1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.
- 2. eset:**  $N$  valamelyik oszlopa egyetlen nem-0 értéket és 0-kat tartalmaz. Tudjuk, hogy a nem-0 elem  $-1$  vagy  $1$  (a páros esetben csak  $1$  lehet a nem-0 elem). Ekkor van erre az oszlopra vonatkozó kifejtés és az indukciós feltevés adja az állítást.
- 3. eset:** A fenti két eset komplementere. A kétféle mátrix esetében ez azt jelenti, hogy minden oszlopban pontosan két nem-0 elem szerepel.

A bizonyítás most kétfelé ágazik.  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  esetén tudjuk, hogy a sorok összege a 0 vektor lesz.  $\mathcal{B}_G$  esetén tudjuk, hogy az alsó csúcsoknak megfelelő sorok és a felső csúcsoknak megfelelő sorok összege is a csupa 1 vektor lesz.

## Bizonyítás (folytatás): 3 eset

- 1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.
- 2. eset:**  $N$  valamelyik oszlopa egyetlen nem-0 értéket és 0-kat tartalmaz. Tudjuk, hogy a nem-0 elem  $-1$  vagy  $1$  (a páros esetben csak  $1$  lehet a nem-0 elem). Ekkor van erre az oszlopra vonatkozó kifejtés és az indukciós feltevés adja az állítást.
- 3. eset:** A fenti két eset komplementere. A kétféle mátrix esetében ez azt jelenti, hogy minden oszlopban pontosan két nem-0 elem szerepel.

A bizonyítás most kétfelé ágazik.  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  esetén tudjuk, hogy a sorok összege a 0 vektor lesz.  $\mathcal{B}_G$  esetén tudjuk, hogy az alsó csúcsoknak megfelelő sorok és a felső csúcsoknak megfelelő sorok összege is a csupa 1 vektor lesz. Mindkét esetben egy nem triviális lineáris összefüggés van a sorok között.

## Bizonyítás (folytatás): 3 eset

- 1. eset:**  $N$  egyik oszlopa csak 0-kat tartalmaz. Ekkor  $\det N = 0$  és készen vagyunk.
- 2. eset:**  $N$  valamelyik oszlopa egyetlen nem-0 értéket és 0-kat tartalmaz. Tudjuk, hogy a nem-0 elem  $-1$  vagy  $1$  (a páros esetben csak  $1$  lehet a nem-0 elem). Ekkor van erre az oszlopra vonatkozó kifejtés és az indukciós feltevés adja az állítást.
- 3. eset:** A fenti két eset komplementere. A kétféle mátrix esetében ez azt jelenti, hogy minden oszlopban pontosan két nem-0 elem szerepel.

A bizonyítás most kétfelé ágazik.  $\mathcal{D}_{\vec{G}}$  esetén tudjuk, hogy a sorok összege a 0 vektor lesz.  $\mathcal{B}_G$  esetén tudjuk, hogy az alsó csúcsoknak megfelelő sorok és a felső csúcsoknak megfelelő sorok összege is a csupa 1 vektor lesz. Mindkét esetben egy nem triviális lineáris összefüggés van a sorok között. Azaz a determináns 0, készen vagyunk.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma

## A súlyozott párosítási probléma

Adott egy  $G$  gráf egy  $c : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  élsúlyozással.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma

## A súlyozott párosítási probléma

Adott egy  $G$  gráf egy  $c : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  élsúlyozással.

Keressünk maximális súlyú párosítást, ahol egy  $M$  párosítás/élhalmaz súlya  $\sum_{e:e \in M} c(e)$ .

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma

## A súlyozott párosítási probléma

Adott egy  $G$  gráf egy  $c : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$  élsúlyozással.

Keressünk maximális súlyú párosítást, ahol egy  $M$  párosítás/élhalmaz súlya  $\sum_{e:e \in M} c(e)$ .

## Következmény

Súlyozott párosítási probléma páros gráfokra megoldható LP algoritmussal.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma mint IP



# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma mint IP

- A  $c$  súlyfüggvényt  $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$  vektorral azonosítva/kódolva a probléma a következő

Minimalizáljuk	$c^T x$
Feltéve, hogy	$\sum_{e: v \in e} x_e \leq 1, \quad \forall v \in V$
	$0 \leq x_e, \quad \forall e \in E$
	$x_e \in \mathbb{Z}, \quad \forall e \in E$

egész értékűségi feltételekkel bővített LP feladattal a ekvivalens.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma mint IP

- A  $c$  súlyfüggvényt  $c \in \mathbb{R}^{E(G)}$  vektorral azonosítva/kódolva a probléma a következő

Minimalizáljuk	$c^T x$ -t
Feltéve, hogy	$\sum_{e: v \in e} x_e \leq 1, \quad \forall v \in V$
	$0 \leq x_e, \quad \forall e \in E$
	$x_e \in \mathbb{Z}, \quad \forall e \in E$

egész értékűségi feltételekkel bővített LP feladattal a ekvivalens.

- Ennek LP relaxációja kapjuk, ha az  $x_e \in \mathbb{Z}$  feltételeket elhagyjuk:

Minimalizáljuk	$c^T x$ -t
Feltéve, hogy	$\sum_{e: v \in e} x_e \leq 1,$
	$x_e \geq 0.$

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

- Ez már egy LP feladat és mátrixa totálisan unimoduláris HA  $G$  PÁROS.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

- Ez már egy LP feladat és mátrixa totálisan unimoduláris HA  $G$  PÁROS.
- Valóban.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

- Ez már egy LP feladat és mátrixa totálisan unimoduláris HA  $G$  PÁROS.
- Valóban. A mátrix lényeges része a páros gráf pont-él illeszkedési mátrixa. erről láttuk a TU tulajdonságot.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

- Ez már egy LP feladat és mátrixa totálisan unimoduláris HA  $G$  PÁROS.
- Valóban. A mátrix lényeges része a páros gráf pont-él illeszkedési mátrixa. erről láttuk a TU tulajdonságot. A teljes mátrix TU tulajdonsága könnyen adódik ebből.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

- Ez már egy LP feladat és mátrixa totálisan unimoduláris HA  $G$  PÁROS.
- Valóban. A mátrix lényeges része a páros gráf pont-él illeszkedési mátrixa. erről láttuk a TU tulajdonságot. A teljes mátrix TU tulajdonsága könnyen adódik ebből.
- Így az LP relaxáció politópjának csúcsai egész koordinátájúak,



# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

- Ez már egy LP feladat és mátrixa totálisan unimoduláris HA  $G$  PÁROS.
- Valóban. A mátrix lényeges része a páros gráf pont-él illeszkedési mátrixa. erről láttuk a TU tulajdonságot. A teljes mátrix TU tulajdonsága könnyen adódik ebből.
- Így az LP relaxáció politópjának csúcsai egész koordinátájúak, azaz párosítások karakterisztikus vektorai.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

- Ez már egy LP feladat és mátrixa totálisan unimoduláris HA  $G$  PÁROS.
- Valóban. A mátrix lényeges része a páros gráf pont-él illeszkedési mátrixa. erről láttuk a TU tulajdonságot. A teljes mátrix TU tulajdonsága könnyen adódik ebből.
- Így az LP relaxáció politópjának csúcsai egész koordinátájúak, azaz párosítások karakterisztikus vektorai.
- Azaz az LP relaxáció ekvivalens az eredeti alakkal.

# Következmányek: Súlyozott párosítási probléma: LP relaxáció

- Ez már egy LP feladat és mátrixa totálisan unimoduláris HA  $G$  PÁROS.
- Valóban. A mátrix lényeges része a páros gráf pont-él illeszkedési mátrixa. erről láttuk a TU tulajdonságot. A teljes mátrix TU tulajdonsága könnyen adódik ebből.
- Így az LP relaxáció politópjának csúcsai egész koordinátájúak, azaz párosítások karakterisztikus vektorai.
- Azaz az LP relaxáció ekvivalens az eredeti alakkal. Egy LP feladat sokféle módszerrel hatékonyan kezelhető.

# Következmények: Hálózatok

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.
- A fentiekből is adódik.

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.
- A fentiekből is adódik. A folyamprobléma algebrai leírása egy LP feladat.



# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.
- A fentiekből is adódik. A folyamprobléma algebrai leírása egy LP feladat. Mátrixa TU.

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.
- A fentiekből is adódik. A folyamprobléma algebrai leírása egy LP feladat. Mátrixa TU. Azaz politópjának csúcsai egész koordinátájú vektorok.

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.
- A fentiekből is adódik. A folyamprobléma algebrai leírása egy LP feladat. Mátrixa TU. Azaz politópjának csúcsai egész koordinátájú vektorok. Az optimális helyek között lesz egész is.

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.
- A fentiekből is adódik. A folyamprobléma algebrai leírása egy LP feladat. Mátrixa TU. Azaz politópjának csúcsai egész koordinátájú vektorok. Az optimális helyek között lesz egész is.
- A duális feladatra is el lehet ezt mondani.

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.
- A fentiekből is adódik. A folyamprobléma algebrai leírása egy LP feladat. Mátrixa TU. Azaz politópjának csúcsai egész koordinátájú vektorok. Az optimális helyek között lesz egész is.
- A duális feladatra is el lehet ezt mondani. Az optimális duális megoldás keresésénél szorítkozhatunk az egész koordinátájú duális lehetséges megoldásokra.

# Következmények: Hálózatok

## Tétel

Ha egy hálózatban minden élkapacitása egész, akkor van benne olyan optimális folyam, amelyben minden élen egész anyagmennyiség folyik.

- Ezt a tételt diszkrét matematika előadáson láttuk, igazoltuk.
- A fentiekből is adódik. A folyamprobléma algebrai leírása egy LP feladat. Mátrixa TU. Azaz politópjának csúcsai egész koordinátájú vektorok. Az optimális helyek között lesz egész is.
- A duális feladatra is el lehet ezt mondani. Az optimális duális megoldás keresésénél szorítkozhatunk az egész koordinátájú duális lehetséges megoldásokra. Ezt egyik korábbi dualizálási példánkban kihasználtuk.

# Szünet



# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják III: TDI egyenlőtlenségrendszerek



# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják III: TDI egyenlőtlenségrendszerek

- Legyen  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egy egyenlőtlenségrendszer.

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják III: TDI egyenlőtlenségrendszerek

- Legyen  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egy egyenlőtlenségrendszer. Tegyük fel, hogy  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ .

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják III: TDI egyenlőtlenségrendszerek

- Legyen  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egy egyenlőtlenségrendszer. Tegyük fel, hogy  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Legyen  $\mathcal{P} : \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \preceq b\}$  a megfelelő nemüres poliéder (megoldáshalmaz).

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják III: TDI egyenlőtlenségrendszerek

- Legyen  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egy egyenlőtlenségrendszer. Tegyük fel, hogy  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Legyen  $\mathcal{P} : \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \preceq b\}$  a megfelelő nemüres poliéder (megoldáshalmaz).
- Vizsgáljuk az alábbi négy  $\mathcal{E}$ -vel kapcsolatos optimalizálási feladatot.

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják III: TDI egyenlőtlenségrendszerek

- Legyen  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egy egyenlőtlenségrendszer. Tegyük fel, hogy  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Legyen  $\mathcal{P} : \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \preceq b\}$  a megfelelő nemüres poliéder (megoldáshalmaz).
- Vizsgáljuk az alábbi négy  $\mathcal{E}$ -vel kapcsolatos optimalizálási feladatot.

(P) $_{\mathbb{Z}}$  :

(P) :

(D) :

(D) $_{\mathbb{Z}}$  :Min.  $c^T x$ -etF.h.  $Ax \preceq b$  $x \in \mathbb{Z}^n$ Min.  $c^T x$ -etF.h.  $Ax \preceq b$ Max.  $-b^T \lambda$ -etF.h.  $c + A^T \lambda = 0$  $\lambda \succeq 0$ Max.  $-b^T \lambda$ -etF.h.  $c + A^T \lambda = 0$  $\lambda \in \mathbb{N}^k$

# Feltételek, amelyek az egész tulajdonságot garantálják III: TDI egyenlőtlenségrendszerek

- Legyen  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egy egyenlőtlenségrendszer. Tegyük fel, hogy  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Legyen  $\mathcal{P} : \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \preceq b\}$  a megfelelő nemüres poliéder (megoldáshalmaz).
- Vizsgáljuk az alábbi négy  $\mathcal{E}$ -vel kapcsolatos optimalizálási feladatot.

(P) $_{\mathbb{Z}}$  :

(P) :

(D) :

(D) $_{\mathbb{Z}}$  :

Min. $c^T x$ -et
F.h. $Ax \preceq b$
$x \in \mathbb{Z}^n$

Min. $c^T x$ -et
F.h. $Ax \preceq b$

Max. $-b^T \lambda$ -et
F.h. $c + A^T \lambda = 0$
$\lambda \succeq 0$

Max. $-b^T \lambda$ -et
F.h. $c + A^T \lambda = 0$
$\lambda \in \mathbb{N}^k$

$$p_{\mathbb{Z}}^* \geq p^* = d^* \geq d_{\mathbb{Z}}^*,$$

ahol  $p_{\mathbb{Z}}^*$ ,  $p^*$ ,  $d^*$ ,  $d_{\mathbb{Z}}^*$  a fenti optimalizálási feladatok optimális értékei (a megfelelő sorrendben).

# Megjegyzések

# Megjegyzések

- Példák adhatók  $\mathcal{E}$  egyenlőtlenségrendszerre és  $c$  vektorra, hogy az első és utolsó egyenlőtlenség tetszőlegesen alakuljon az élesség szempontjából.



# Megjegyzések

- Példák adhatók  $\mathcal{E}$  egyenlőtlenségrendszerre és  $c$  vektorra, hogy az első és utolsó egyenlőtlenség tetszőlegesen alakuljon az élesség szempontjából.
  - Alkalmos  $\mathcal{E}$  egyenlőtlenségrendszerre és  $c$  vektorra végig egyenlőség lehet.
  - Alkalmos  $\mathcal{E}$  egyenlőtlenségrendszerre és  $c$  vektorra az első egyenlőtlenség szigorú lehet, míg az utolsó egyenlőséggé válhat.
  - Alkalmos  $\mathcal{E}$  egyenlőtlenségrendszerre és  $c$  vektorra az első egyenlőtlenség egyenlőséggé válhat, míg az utolsó egyenlőtlenség szigorú lehet.
  - Alkalmos  $\mathcal{E}$  egyenlőtlenségrendszerre és  $c$  vektorra az első és utolsó egyenlőtlenség is szigorú lehet.

# TPI rendszerek

# TPI rendszerek

- Más a helyzet, ha  $c$  nem fix, hanem tetszőleges  $\mathbb{Z}^n$ -beli vektor.

# TPI rendszerek

- Más a helyzet, ha  $c$  nem fix, hanem tetszőleges  $\mathbb{Z}^n$ -beli vektor.
- Vannak egyenlőtlenségrendszerek, amelyekre minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén  $p_{\mathbb{Z}}^* = p^*$

# TPI rendszerek

- Más a helyzet, ha  $c$  nem fix, hanem tetszőleges  $\mathbb{Z}^n$ -beli vektor.
- Vannak egyenlőtlenségrendszer, amelyekre minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén  $p_{\mathbb{Z}}^* = p^*$  Ezeket nevezzük *totálisan primál egész* (integer) egyenlőtlenségrendszernek: TPI rendszer.

# TPI rendszerek

- Más a helyzet, ha  $c$  nem fix, hanem tetszőleges  $\mathbb{Z}^n$ -beli vektor.
- Vannak egyenlőtlenségrendszerek, amelyekre minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén  $p_{\mathbb{Z}}^* = p^*$  Ezeket nevezzük *totálisan primál egész* (integer) egyenlőtlenségrendszernek: TPI rendszer.
- Így speciálisan egy TPI rendszerre (mivel  $p_{\mathbb{Z}}^*$  nyilván egész, ha véges)  $p^*$  is egész (amennyiben véges).

# TPI rendszerek

- Más a helyzet, ha  $c$  nem fix, hanem tetszőleges  $\mathbb{Z}^n$ -beli vektor.
- Vannak egyenlőtlenségrendszerek, amelyekre minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén  $p_{\mathbb{Z}}^* = p^*$  Ezeket nevezzük *totálisan primál egész* (integer) egyenlőtlenségrendszernek: TPI rendszer.
- Így speciálisan egy TPI rendszerre (mivel  $p_{\mathbb{Z}}^*$  nyilván egész, ha véges)  $p^*$  is egész (amennyiben véges).
- Tudjuk, hogy ez ekvivalens azzal, hogy  $\mathcal{P}$  egész poliéder.

# TDI rendszerek



# TDI rendszerek

## Definíció

Legyen  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Az  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egyenlőtlenségrendszer duál egész rendszer (TDI), ha minden  $c \in \mathbb{Z}^n$ -re  $d^* = d_{\mathbb{Z}}^*$  (feltéve, hogy  $d^*$  véges).

# TDI rendszerek

## Definíció

Legyen  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Az  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egyenlőtlenségrendszer duál egész rendszer (TDI), ha minden  $c \in \mathbb{Z}^n$ -re  $d^* = d_{\mathbb{Z}}^*$  (feltéve, hogy  $d^*$  véges).

- A TDI tulajdonság alaptétele azt mondja ki, ha minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén egyenlőtlenségláncunkban az utolsó egyenlőtlenség egyenlőség, akkor szükségszerűen az első egyenlőtlenség is egyenlőség minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén.

# TDI rendszerek

## Definíció

Legyen  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Az  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egyenlőtlenségrendszer duál egész rendszer (TDI), ha minden  $c \in \mathbb{Z}^n$ -re  $d^* = d_{\mathbb{Z}}^*$  (feltéve, hogy  $d^*$  véges).

- A TDI tulajdonság alaptétele azt mondja ki, ha minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén egyenlőtlenségláncunkban az utolsó egyenlőtlenség egyenlőség, akkor szükségszerűen az első egyenlőtlenség is egyenlőség minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén.

## Edmonds—Giles-tétel

Ha  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  TDI tulajdonságú és  $b \in \mathbb{Z}^k$ , akkor TPI tulajdonságú is.

# TDI rendszerek

## Definíció

Legyen  $A \in \mathbb{Q}^{k \times n}$ ,  $b \in \mathbb{Q}^k$ . Az  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  egyenlőtlenségrendszer duál egész rendszer (TDI), ha minden  $c \in \mathbb{Z}^n$ -re  $d^* = d_{\mathbb{Z}}^*$  (feltéve, hogy  $d^*$  véges).

- A TDI tulajdonság alaptétele azt mondja ki, ha minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén egyenlőtlenségláncunkban az utolsó egyenlőtlenség egyenlőség, akkor szükségszerűen az első egyenlőtlenség is egyenlőség minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén.

## Edmonds—Giles-tétel

Ha  $\mathcal{E} : Ax \preceq b$  TDI tulajdonságú és  $b \in \mathbb{Z}^k$ , akkor TPI tulajdonságú is. Így  $\mathcal{P}$  egész poliéder.

# Fontos megjegyzés

# Fontos megjegyzés

- Az állítás NEM a  $\mathcal{P} = \{x : Ax \preceq b\}$  poliéderről szól.

# Fontos megjegyzés

- Az állítás NEM a  $\mathcal{P} = \{x : Ax \preceq b\}$  poliéderről szól.

## Példa

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \preceq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

nem TDI.

# Fontos megjegyzés

- Az állítás NEM a  $\mathcal{P} = \{x : Ax \preceq b\}$  poliéderről szól.

## Példa

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \preceq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

nem TDI.

## Példa

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \preceq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

TDI.



# Fontos megjegyzés (folytatás)

# Fontos megjegyzés (folytatás)

- Ismert, hogy minden egész poliéderhez található leíró  $A$  mátrix,  $b$  vektor, hogy  $Ax \preceq b$  TDI legyen.

# Fontos megjegyzés (folytatás)

- Ismert, hogy minden egész poliéderhez található leíró  $A$  mátrix,  $b$  vektor, hogy  $Ax \preceq b$  TDI legyen.
- Így ha egy poliéderről szeretnénk belátni, hogy egész, akkor a következő tervünk lehet:
  - (1) A poliédert „ügyesen" felírjuk  $\{x : Ax \preceq b\}$  alakba.
  - (2) Belátjuk, hogy  $Ax \preceq b$  egy TDI rendszer.

# Fontos megjegyzés (folytatás)

- Ismert, hogy minden egész poliéderhez található leíró  $A$  mátrix,  $b$  vektor, hogy  $Ax \preceq b$  TDI legyen.
- Így ha egy poliéderről szeretnénk belátni, hogy egész, akkor a következő tervünk lehet:
  - (1) A poliédert „ügyesen” felírjuk  $\{x : Ax \preceq b\}$  alakba.
  - (2) Belátjuk, hogy  $Ax \preceq b$  egy TDI rendszer. Azaz belátjuk, hogy az

Minimalizáljuk	$b^T x - t$
Feltéve, hogy	$A^T \lambda = -c$
	$\lambda \succeq 0$

feladatnak minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén van egész optimális helye.

- (3) Következtetünk  $\mathcal{P}$  egész mivoltára.

# Edmonds—Giles-tétel: A bizonyítás

# Edmonds—Giles-tétel: A bizonyítás

- Feltételünk, hogy  $b \in \mathbb{Z}^k$ .

# Edmonds—Giles-tétel: A bizonyítás

- Feltételünk, hogy  $b \in \mathbb{Z}^k$ .
- A TDI tulajdonság alapján tudjuk, hogy minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén  $p^* = d^* = d_{\mathbb{Z}}^*$ .  $b \in \mathbb{Z}^k$  miatt  $d_{\mathbb{Z}}^*$  egész. Azaz  $p^*$  is egész minden  $c \in \mathbb{Z}^n$ -re.

# Edmonds—Giles-tétel: A bizonyítás

- Feltételünk, hogy  $b \in \mathbb{Z}^k$ .
- A TDI tulajdonság alapján tudjuk, hogy minden  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén  $p^* = d^* = d_{\mathbb{Z}}^*$ .  $b \in \mathbb{Z}^k$  miatt  $d_{\mathbb{Z}}^*$  egész. Azaz  $p^*$  is egész minden  $c \in \mathbb{Z}^n$ -re.
- Láttuk („korábbi” Edmonds—Giles-tétel), hogy ebből következik  $\mathcal{P}$  egész mivolta.



$MP(G)$  párosítási politóp ( $G$  hurokélmentes)

# $\mathcal{MP}(G)$ párosítási politóp ( $G$ hurokélmentes)

- Vegyük a párosítások karakterisztikus vektorainak konvex burkát:

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \}.$$

# $\mathcal{MP}(G)$ párosítási politóp ( $G$ hurokélmentes)

- Vegyük a párosítások karakterisztikus vektorainak konvex burkát:

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \}.$$

- Minden olyan lineáris egyenlőtlenség, ami minden  $\chi_M$  vektorra teljesül ( $M$  párosítás) az a konvex burok összes elemére igaz.

# $\mathcal{MP}(G)$ párosítási politóp ( $G$ hurokélmentes)

- Vegyük a párosítások karakterisztikus vektorainak konvex burkát:

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \}.$$

- Minden olyan lineáris egyenlőtlenség, ami minden  $\chi_M$  vektorra teljesül ( $M$  párosítás) az a konvex burok összes elemére igaz. Ha egy féltérbe esik az összes  $\chi_M$ , akkor konvex burkuk is oda esik.

# $\mathcal{MP}(G)$ párosítási politóp ( $G$ hurokélmentes)

- Vegyük a párosítások karakterisztikus vektorainak konvex burkát:

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \}.$$

- Minden olyan lineáris egyenlőtlenség, ami minden  $\chi_M$  vektorra teljesül ( $M$  párosítás) az a konvex burok összes elemére igaz. Ha egy féltérbe esik az összes  $\chi_M$ , akkor konvex burkuk is oda esik.
- Így könnyen lehet egy „felső becslést” adni a konvex burokra:

# $\mathcal{MP}(G)$ párosítási politóp ( $G$ hurokélmentes)

- Vegyük a párosítások karakterisztikus vektorainak konvex burkát:

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \}.$$

- Minden olyan lineáris egyenlőtlenség, ami minden  $\chi_M$  vektorra teljesül ( $M$  párosítás) az a konvex burok összes elemére igaz. Ha egy féltérbe esik az összes  $\chi_M$ , akkor konvex burkuk is oda esik.
- Így könnyen lehet egy „felső becslést” adni a konvex burokra:

$$\text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \} \subseteq$$

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^{E(G)} : x_e \geq 0, \sum_{e: v \in e} x_e \leq 1, v \in V(G) \right\} \subseteq \mathbb{R}^{E(G)}$$

# $\mathcal{MP}(G)$ párosítási politóp ( $G$ hurokélmentes)

- Vegyük a párosítások karakterisztikus vektorainak konvex burkát:

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \}.$$

- Minden olyan lineáris egyenlőtlenség, ami minden  $\chi_M$  vektorra teljesül ( $M$  párosítás) az a konvex burok összes elemére igaz. Ha egy féltérbe esik az összes  $\chi_M$ , akkor konvex burkuk is oda esik.
- Így könnyen lehet egy „felső becslést” adni a konvex burokra:

$$\text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \} \subseteq$$

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^{E(G)} : x_e \geq 0, \sum_{e: v \in e} x_e \leq 1, v \in V(G) \right\} \subseteq \mathbb{R}^{E(G)}$$

- Ha  $G$  páros gráf, akkor egyenlőség van.

# $\mathcal{MP}(G)$ párosítási politóp ( $G$ hurokélmentes)

- Vegyük a párosítások karakterisztikus vektorainak konvex burkát:

$$\mathcal{MP}(G) = \text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \}.$$

- Minden olyan lineáris egyenlőtlenség, ami minden  $\chi_M$  vektorra teljesül ( $M$  párosítás) az a konvex burok összes elemére igaz. Ha egy féltérbe esik az összes  $\chi_M$ , akkor konvex burkuk is oda esik.
- Így könnyen lehet egy „felső becslést” adni a konvex burokra:

$$\text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \} \subseteq$$

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^{E(G)} : x_e \geq 0, \sum_{e: v \in e} x_e \leq 1, v \in V(G) \right\} \subseteq \mathbb{R}^{E(G)}$$

- Ha  $G$  páros gráf, akkor egyenlőség van. Az általános esetben több egyenlőtlenség szükséges a konvex burok leírására.



# Edmonds poliédertétele

# Edmonds poliédertétele

## Edmonds-féle poliédertétel

Legyen  $G$  tetszőleges egyszerű gráf. Ekkor

$$\text{conv} \{ \chi_M : M \text{ párosítás} \} = \{ x \in \mathbb{R}^{E(G)} :$$

$$x_e \geq 0 \quad \forall e \in E(G)$$

$$\sum_{e: v \in e} x_e \leq 1 \quad \forall v \in V(G)$$

$$\sum_{\substack{e=uv \in E(G): \\ u, v \in S}} x_e \leq \frac{|S| - 1}{2} \quad \forall S \in \mathcal{O} \},$$

ahol  $\mathcal{O}$  a  $V$  csúcshalmaz páratlan elemszámú részhalmazainak halmaza.

# Bizonyítás: Cunningham—Marsh-tétel

# Bizonyítás: Cunningham—Marsh-tétel

- Azt kell belátnunk, hogy a jobb oldali politóp csúcsai egészek.

# Bizonyítás: Cunningham—Marsh-tétel

- Azt kell belátnunk, hogy a jobb oldali politóp csúcsai egészek.
- Ez egyből következik az alábbi tételből

# Bizonyítás: Cunningham—Marsh-tétel

- Azt kell belátnunk, hogy a jobb oldali politóp csúcsai egészek.
- Ez egyből következik az alábbi tételből

## Cunningham—Marsh-tétel

A  $\mathcal{MP}(G)$  Edmonds-féle leírásában szereplő egyenlőtlenségrendszer (TDI) tulajdonságú.

# Bizonyítás: Cunningham—Marsh-tétel

- Azt kell belátnunk, hogy a jobb oldali politóp csúcsai egészek.
- Ez egyből következik az alábbi tételből

## Cunningham—Marsh-tétel

A  $\mathcal{MP}(G)$  Edmonds-féle leírásában szereplő egyenlőtlenségrendszer (TDI) tulajdonságú.

- Azaz tetszőleges  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén

Minimalizáljuk

$$\sum_{v \in V(G)} \lambda_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{|S|-1}{2} \cdot \lambda_S - t$$

Feltéve, hogy

$$-c_e + \lambda_u + \lambda_v + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ u, v \in S}} \lambda_S - \lambda_e = 0$$

$$\forall e = uv \in E(G), \text{ továbbá } \lambda \succeq 0.$$

Ekkor van egész koordinátájú optimális hely.

# Szünet





# Edmonds-poliédertétel II. alak

## Edmonds-poliédertétel II. alak

## Edmonds-tétel, II. alak

$$\begin{aligned}
 \mathcal{PM}\mathcal{P}(G) &= \text{conv}\{\chi_M : M \text{ teljes párosítás}\} = \\
 &= \{x \in \mathbb{R}^{E(G)} : \\
 &\quad x_e \geq 0, \quad e \in E(G) \\
 &\quad \sum_{e: v \in e} x_e \leq 1, \quad v \in V(G), \\
 &\quad \sum_{\substack{e=xy \in E(G) \\ x \in S, y \notin S}} x_e \geq 1, \quad S \subseteq V(G), \\
 &\quad |S| \text{ páratlan}\}.
 \end{aligned}$$

## Edmonds-poliédertétel II. alak

## Edmonds-tétel, II. alak

$$\begin{aligned}
 \mathcal{PMP}(G) &= \text{conv}\{\chi_M : M \text{ teljes párosítás}\} = \\
 &= \{x \in \mathbb{R}^{E(G)} : \quad \quad \quad x_e \geq 0, \quad e \in E(G) \\
 &\quad \quad \quad \sum_{e: v \in e} x_e \leq 1, \quad v \in V(G), \\
 &\quad \quad \quad \sum_{\substack{e=xy \in E(G) \\ x \in S, y \notin S}} x_e \geq 1, \quad S \subseteq V(G), \\
 &\quad \quad \quad |S| \text{ páratlan}\}.
 \end{aligned}$$

- $\mathcal{PMP}(G)$  a  $G$  gráf teljes párosítási politopja (angolul: perfect matching polytope).

# Edmonds poliédertételének következménye

# Edmonds poliédertételének következménye

## Tétel

$G$  egy  $k$ -reguláris,  $k$ -szorosan élösszefüggő gráf páros sok csúccsal ( $k > 0$ ). Ekkor létezik pozitív  $t$  egész, hogy

$$\chi_e(t \times G) = t \cdot k,$$

ahol  $t \times G$  az a gráf, amelyet  $G$ -ből kapunk éleinek meg  $t$ -szerezésével (alternatív módon  $G$  minden éle mellé  $t - 1$  „iker-példányt” teszünk).

# Edmonds poliédertételének következménye

## Tétel

$G$  egy  $k$ -reguláris,  $k$ -szorosan élösszefüggő gráf páros sok csúccsal ( $k > 0$ ). Ekkor létezik pozitív  $t$  egész, hogy

$$\chi_e(t \times G) = t \cdot k,$$

ahol  $t \times G$  az a gráf, amelyet  $G$ -ből kapunk éleinek meg  $t$ -szerezésével (alternatív módon  $G$  minden éle mellé  $t - 1$  „iker-példányt” teszünk).

- A tételben szereplő  $\chi_e$  az élkromatikus szám:

# Edmonds poliédertételének következménye

## Tétel

$G$  egy  $k$ -reguláris,  $k$ -szorosán élösszefüggő gráf páros sok csúccsal ( $k > 0$ ). Ekkor létezik pozitív  $t$  egész, hogy

$$\chi_e(t \times G) = t \cdot k,$$

ahol  $t \times G$  az a gráf, amelyet  $G$ -ből kapunk éleinek meg  $t$ -szerezésével (alternatív módon  $G$  minden éle mellé  $t - 1$  „iker-példányt” teszünk).

- A tételben szereplő  $\chi_e$  az élkromatikus szám: A gráf éleit színezzük úgy, hogy összefutó élek különböző színűek legyenek, azaz egy színosztályt alkotó élek párosítást alkossanak.

# Edmonds poliédertételének következménye

## Tétel

$G$  egy  $k$ -reguláris,  $k$ -szorosan élösszefüggő gráf páros sok csúccsal ( $k > 0$ ). Ekkor létezik pozitív  $t$  egész, hogy

$$\chi_e(t \times G) = t \cdot k,$$

ahol  $t \times G$  az a gráf, amelyet  $G$ -ből kapunk éleinek meg  $t$ -szerezésével (alternatív módon  $G$  minden éle mellé  $t - 1$  „iker-példányt” teszünk).

- A tételben szereplő  $\chi_e$  az élkromatikus szám: A gráf éleit színezzük úgy, hogy összefutó élek különböző színűek legyenek, azaz egy színosztályt alkotó élek párosítást alkossanak.
- A minimális színszám, amivel ez megoldható, a gráf élkromatikus száma.



# Emlékeztető

## Emlékeztető: Vizing-tétel

Ha  $G$  egy egyszerű gráf, akkor

$$D(G) \leq \chi_e(G) \leq D(G) + 1,$$

ahol  $D(G)$  a gráf maximális fokszámát jelöli.

# Emlékeztető

## Emlékeztető: Vizing-tétel

Ha  $G$  egy egyszerű gráf, akkor

$$D(G) \leq \chi_e(G) \leq D(G) + 1,$$

ahol  $D(G)$  a gráf maximális fokszámát jelöli.

- Nem egyszerű gráfokra a megfelelő felső becslés nem igaz.

# Emlékeztető

## Emlékeztető: Vizing-tétel

Ha  $G$  egy egyszerű gráf, akkor

$$D(G) \leq \chi_e(G) \leq D(G) + 1,$$

ahol  $D(G)$  a gráf maximális fokszámát jelöli.

- Nem egyszerű gráfokra a megfelelő felső becslés nem igaz.

## Emlékeztető: Shannon-tétel

$$D(G) \leq \chi_e(G) \leq \frac{3}{2} \cdot D(G),$$

# Emlékeztető

## Emlékeztető: Vizing-tétel

Ha  $G$  egy egyszerű gráf, akkor

$$D(G) \leq \chi_e(G) \leq D(G) + 1,$$

ahol  $D(G)$  a gráf maximális fokszámát jelöli.

- Nem egyszerű gráfokra a megfelelő felső becslés nem igaz.

## Emlékeztető: Shannon-tétel

$$D(G) \leq \chi_e(G) \leq \frac{3}{2} \cdot D(G),$$

- A tétel éles:  $\chi_e(t \times K_3) = 3t$ , míg  $D(t \times K_3) = 2t$ . Azaz élek sokszorozásával a Shannon-becslés felső határáig tudunk eljutni.

# Emlékeztető

## Emlékeztető: Vizing-tétel

Ha  $G$  egy egyszerű gráf, akkor

$$D(G) \leq \chi_e(G) \leq D(G) + 1,$$

ahol  $D(G)$  a gráf maximális fokszámát jelöli.

- Nem egyszerű gráfokra a megfelelő felső becslés nem igaz.

## Emlékeztető: Shannon-tétel

$$D(G) \leq \chi_e(G) \leq \frac{3}{2} \cdot D(G),$$

- A tétel éles:  $\chi_e(t \times K_3) = 3t$ , míg  $D(t \times K_3) = 2t$ . Azaz élek sokszorozásával a Shannon-becslés felső határáig tudunk eljutni.
- A tétel állítása:  $G$  reguláris páros pontszám esetén élsokszorozással a Shannon-becslés alsó határát érhetjük el.

# Következmény: Bizonyítás

# Következmény: Bizonyítás

- Vegyük észre, hogy  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathcal{MP}(\mathcal{G})$ , ahol  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathbb{Q}^E$  a csupa  $1/k$  koordinátát tartalmazó vektor.

# Következmény: Bizonyítás

- Vegyük észre, hogy  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathcal{MP}(\mathcal{G})$ , ahol  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathbb{Q}^E$  a csupa  $1/k$  koordinátát tartalmazó vektor.
- Ehhez elég ellenőrizni, hogy  $\mathcal{MP}(\mathcal{G})$  Edmonds-leírásának mindegyik feltételét teljesíti.



# Következmény: Bizonyítás

- Vegyük észre, hogy  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathcal{MP}(\mathcal{G})$ , ahol  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathbb{Q}^E$  a csupa  $1/k$  koordinátát tartalmazó vektor.
- Ehhez elég ellenőrizni, hogy  $\mathcal{MP}(\mathcal{G})$  Edmonds-leírásának mindegyik feltételét teljesíti.
- Nyilván komponensei nemnegatívak.

# Következmény: Bizonyítás

- Vegyük észre, hogy  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathcal{MP}(\mathcal{G})$ , ahol  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathbb{Q}^E$  a csupa  $1/k$  koordinátát tartalmazó vektor.
- Ehhez elég ellenőrizni, hogy  $\mathcal{MP}(\mathcal{G})$  Edmonds-leírásának mindegyik feltételét teljesíti.
- Nyilván komponensei nemnegatívak. Minden csúcsban összefutó élekhez tartozó komponensek összege egy  $k$  tagú  $1/k$  tagokat tartalmazó összeg, értéke pontosan 1.

# Következmény: Bizonyítás

- Vegyük észre, hogy  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathcal{MP}(\mathcal{G})$ , ahol  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathbb{Q}^E$  a csupa  $1/k$  koordinátát tartalmazó vektor.
- Ehhez elég ellenőrizni, hogy  $\mathcal{MP}(\mathcal{G})$  Edmonds-leírásának mindegyik feltételét teljesíti.
- Nyilván komponensei nemnegatívak. Minden csúcsban összefutó élekhez tartozó komponensek összege egy  $k$  tagú  $1/k$  tagokat tartalmazó összeg, értéke pontosan 1.
- A harmadik típusú feltételt egy  $S \in \mathcal{O}$  halmazra ellenőrizzük ( $|V|$  páros, így  $S \neq \emptyset, V$ ):

# Következmény: Bizonyítás

- Vegyük észre, hogy  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathcal{MP}(\mathcal{G})$ , ahol  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathbb{Q}^E$  a csupa  $1/k$  koordinátát tartalmazó vektor.
- Ehhez elég ellenőrizni, hogy  $\mathcal{MP}(\mathcal{G})$  Edmonds-leírásának mindegyik feltételét teljesíti.
- Nyilván komponensei nemnegatívak. Minden csúcsban összefutó élekhez tartozó komponensek összege egy  $k$  tagú  $1/k$  tagokat tartalmazó összeg, értéke pontosan 1.
- A harmadik típusú feltételt egy  $S \in \mathcal{O}$  halmazra ellenőrizzük ( $|V|$  páros, így  $S \neq \emptyset, V$ ): Először egy tetszőleges  $(x_e)$  vektor esetén  $S$  elemeire adjuk össze az ott összefutó éleknek megfelelő komponensösszegeket:

# Következmény: Bizonyítás

- Vegyük észre, hogy  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathcal{MP}(\mathcal{G})$ , ahol  $\frac{1}{k} \cdot \underline{1} \in \mathbb{Q}^E$  a csupa  $1/k$  koordinátát tartalmazó vektor.
- Ehhez elég ellenőrizni, hogy  $\mathcal{MP}(\mathcal{G})$  Edmonds-leírásának mindegyik feltételét teljesíti.
- Nyilván komponensei nemnegatívak. Minden csúcsban összefutó élekhez tartozó komponensek összege egy  $k$  tagú  $1/k$  tagokat tartalmazó összeg, értéke pontosan 1.
- A harmadik típusú feltételt egy  $S \in \mathcal{O}$  halmazra ellenőrizzük ( $|V|$  páros, így  $S \neq \emptyset, V$ ): Először egy tetszőleges  $(x_e)$  vektor esetén  $S$  elemeire adjuk össze az ott összefutó éleknek megfelelő komponensösszegeket:

$$\sum_{v \in S} \sum_{e: v \in e} x_e = 2 \sum_{e=xy: x, y \in S} x_e + \sum_{e \in \partial S} x_e.$$

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Rendezve

$$\sum_{e \subseteq S} x_e = \frac{\sum_{v \in S} \sum_{e: v \in e} x_e - \sum_{e \in \partial S} x_e}{2}$$

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Rendezve

$$\sum_{e \subseteq S} x_e = \frac{\sum_{v \in S} \sum_{e: v \in e} x_e - \sum_{e \in \partial S} x_e}{2}$$

- A  $k$ -szoros élösszefüggőségből következik, hogy  $|\partial S| \geq k$ .



# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Rendezve

$$\sum_{e \in S} x_e = \frac{\sum_{v \in S} \sum_{e: v \in e} x_e - \sum_{e \in \partial S} x_e}{2}$$

- A  $k$ -szoros élösszefüggőségből következik, hogy  $|\partial S| \geq k$ .
- Ha most ezt  $(x_e) = \frac{1}{k} \cdot \underline{1}$  esetén alkalmazzuk, akkor a számlálóban a kivonandó tag legalább 1 (legalább  $k$  darab  $1/k$  érték összege).  
Kapjuk a harmadik típusú ellenőrizendő egyenlőtlenséget.

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Rendezve

$$\sum_{e \in S} x_e = \frac{\sum_{v \in S} \sum_{e: v \in e} x_e - \sum_{e \in \partial S} x_e}{2}$$

- A  $k$ -szoros élösszefüggőségből következik, hogy  $|\partial S| \geq k$ .
- Ha most ezt  $(x_e) = \frac{1}{k} \cdot \underline{1}$  esetén alkalmazzuk, akkor a számlálóban a kivonandó tag legalább 1 (legalább  $k$  darab  $1/k$  érték összege). Kapjuk a harmadik típusú ellenőrizendő egyenlőtlenséget.
- Összegezve:  $\frac{1}{k} \underline{1} \in \mathcal{MP}(\mathcal{G})$

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Edmonds tétele alapján tudjuk, hogy vektorunk előáll mint a politóp csúcsvektorainak konvex kombinációja:

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Edmonds tétele alapján tudjuk, hogy vektorunk előáll mint a politóp csúcsvektorainak konvex kombinációja:

$$\frac{1}{k} \cdot \underline{1} = \sum_{M \text{ párosítás}} \alpha_M \chi_M = \sum_{M \text{ párosítás}} \frac{\ell_M}{L} \chi_M,$$

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Edmonds tétele alapján tudjuk, hogy vektorunk előáll mint a politóp csúcsvektorainak konvex kombinációja:

$$\frac{1}{k} \cdot \underline{1} = \sum_{M \text{ párosítás}} \alpha_M \chi_M = \sum_{M \text{ párosítás}} \frac{\ell_M}{L} \chi_M,$$

ahol  $\sum_{M: \text{ párosítás}} \alpha_M = 1, \alpha_M \geq 0$ .

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Edmonds tétele alapján tudjuk, hogy vektorunk előáll mint a politóp csúcsvektorainak konvex kombinációja:

$$\frac{1}{k} \cdot \mathbf{1} = \sum_{M \text{ párosítás}} \alpha_M \chi_M = \sum_{M \text{ párosítás}} \frac{\ell_M}{L} \chi_M,$$

ahol  $\sum_M$ : párosítás  $\alpha_M = 1$ ,  $\alpha_M \geq 0$ .

- A politóp csúcsai egészek, vektorunk racionális, így az  $\alpha_M$ -ekről feltehető, hogy racionálisak, azaz  $(\alpha_M) \in \mathbb{Q}^E$ , azaz  $L \in \mathbb{N}_+$ ,  $\ell_M \in \mathbb{N}$ .

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Edmonds tétele alapján tudjuk, hogy vektorunk előáll mint a politóp csúcsvektorainak konvex kombinációja:

$$\frac{1}{k} \cdot \underline{1} = \sum_{M \text{ párosítás}} \alpha_M \chi_M = \sum_{M \text{ párosítás}} \frac{\ell_M}{L} \chi_M,$$

ahol  $\sum_M$ : párosítás  $\alpha_M = 1$ ,  $\alpha_M \geq 0$ .

- A politóp csúcsai egészek, vektorunk racionális, így az  $\alpha_M$ -ekről feltehető, hogy racionálisak, azaz  $(\alpha_M) \in \mathbb{Q}^E$ , azaz  $L \in \mathbb{N}_+$ ,  $\ell_M \in \mathbb{N}$ .
- Összefüggésünk rendezve

$$L \cdot \underline{1} = \sum (k \cdot \ell_M) \chi_M.$$



# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Belátjuk, hogy ez az egyenlőség éppen azt jelenti, hogy állításunk igaz  $t = L$ -lel.

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Belátjuk, hogy ez az egyenlőség éppen azt jelenti, hogy állításunk igaz  $t = L$ -lel.
- Valóban, vegyük mindegyik  $M$  párosításnak  $k \cdot \ell_M$  példányát.

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Belátjuk, hogy ez az egyenlőség éppen azt jelenti, hogy állításunk igaz  $t = L$ -lel.
- Valóban, vegyük mindegyik  $M$  párosításnak  $k \cdot \ell_M$  példányát. A párosítások lehetséges színosztályok.

## Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Belátjuk, hogy ez az egyenlőség éppen azt jelenti, hogy állításunk igaz  $t = L$ -lel.
- Valóban, vegyük mindegyik  $M$  párosításnak  $k \cdot \ell_M$  példányát. A párosítások lehetséges színosztályok.
- A fenti egyenlőség alapján minden  $G$ -beli él  $L$ -szeresen van lefedve ezen párosítások által.

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Belátjuk, hogy ez az egyenlőség éppen azt jelenti, hogy állításunk igaz  $t = L$ -lel.
- Valóban, vegyük mindegyik  $M$  párosításnak  $k \cdot \ell_M$  példányát. A párosítások lehetséges színosztályok.
- A fenti egyenlőség alapján minden  $G$ -beli él  $L$ -szeresen van lefedve ezen párosítások által. Azaz ezek kiadják  $L \times G$  egy élpartícióját, egy jó élszínezését.

# Következmény: Bizonyítás (folytatás)

- Belátjuk, hogy ez az egyenlőség éppen azt jelenti, hogy állításunk igaz  $t = L$ -lél.
- Valóban, vegyük mindegyik  $M$  párosításnak  $k \cdot \ell_M$  példányát. A párosítások lehetséges színosztályok.
- A fenti egyenlőség alapján minden  $G$ -beli él  $L$ -szeresen van lefedve ezen párosítások által. Azaz ezek kiadják  $L \times G$  egy élpartícióját, egy jó élszínezését.
- A színigény:

$$\begin{aligned} \sum_{M \text{ párosítás}} k \ell_M &= k \sum_{M \text{ párosítás}} \ell_M = kL \sum_{M \text{ párosítás}} \frac{\ell_M}{L} = \\ &= kL \sum_{M \text{ párosítás}} \alpha_M = kL, \text{ hiszen } \sum_{M \text{ párosítás}} \alpha_M = 1. \end{aligned}$$

# Szünet





# Emlékeztető: Cunningham—Marsh-tétel

## Emlékeztető: Cunningham—Marsh-tétel

- Tetszőleges  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén

Minimalizáljuk	$\sum_{v \in V(G)} \lambda_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{ S -1}{2} \cdot \lambda_S$
Feltéve, hogy	$-c_e + \lambda_u + \lambda_v + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ u, v \in S}} \lambda_S - \lambda_e = 0$
	$\forall e = uv \in E(G), \text{ továbbá } \lambda \succeq 0.$

Ekkor van egész koordinátájú optimális hely.

## Emlékeztető: Cunningham—Marsh-tétel

- Tetszőleges  $c \in \mathbb{Z}^n$  esetén

Minimalizáljuk	$\sum_{v \in V(G)} \lambda_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{ S -1}{2} \cdot \lambda_S$
Feltéve, hogy	$-c_e + \lambda_u + \lambda_v + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ u,v \in S}} \lambda_S - \lambda_e = 0$
	$\forall e = uv \in E(G), \text{ továbbá } \lambda \succeq 0.$

Ekkor van egész koordinátájú optimális hely.

- Ekvivalens módon:

Minimalizáljuk	$\sum_{v \in V(G)} \lambda_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{ S -1}{2} \cdot \lambda_S$
Feltéve, hogy	$\lambda_u + \lambda_v + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ u,v \in S}} \lambda_S \geq c_e$
	$\forall e = uv \in E(G), \text{ továbbá } \lambda \succeq 0.$

Ekkor van egész koordinátájú optimális hely.

# Cunningham—Marsh-tétel új alak

# Cunningham—Marsh-tétel új alak

## Cunningham—Marsh-tétel

Legyen  $(c_e)_{e \in E(G)} \in \mathbb{Z}^{E(G)}$  a  $G$  gráf egy tetszőleges egész élsúlyozása. Ekkor létezik olyan  $(\lambda_v) \in \mathbb{R}_+^V, (\lambda_S) \in \mathbb{R}_+^{\mathcal{O}}$  megoldása

$$\lambda_u + \lambda_v + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ u, v \in S}} \lambda_S \geq c_e \quad \forall e = uv \in E(G)$$

egyenlőtlenségeknek, amelyre

$$\sum_{v \in V(G)} \lambda_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{|S| - 1}{2} \lambda_S \leq \nu_c(G),$$

továbbá egész koordinátájú.

# Cunningham—Marsh-tétel új alak: Indoklás

# Cunningham—Marsh-tétel új alak: Indoklás

- A feltételrendszer a duálizált feladat feltételei a  $\lambda_e$  (előjel kötött) változók természetes kiküszöbölésével (ezek a cél függvényben nem szerepeltek).

# Cunningham—Marsh-tétel új alak: Indoklás

- A feltételrendszer a duálizált feladat feltételei a  $\lambda_e$  (előjel kötött) változók természetes kiküszöbölésével (ezek a cél függvényben nem szerepeltek).
- Az optimalizálás eltűnéséért a plusz feltétel felel.



# Cunningham—Marsh-tétel új alak: Indoklás

- A feltételrendszer a duálizált feladat feltételei a  $\lambda_e$  (előjel kötött) változók természetes kiküszöbölésével (ezek a cél függvényben nem szerepeltek).
- Az optimalizálás eltűnéséért a plusz feltétel felel.
- A plusz feltétel teljesülése esetén

$$\sum_{v \in V(G)} \lambda_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{|S| - 1}{2} \lambda_S \leq \nu_c(G) \leq p^* \leq d^*$$

# Cunningham—Marsh-tétel új alak: Indoklás

- A feltételrendszer a duálizált feladat feltételei a  $\lambda_e$  (előjel kötött) változók természetes kiküszöbölésével (ezek a cél függvényben nem szerepeltek).
- Az optimalizálás eltűnéséért a plusz feltétel felel.
- A plusz feltétel teljesülése esetén

$$\sum_{v \in V(G)} \lambda_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{|S| - 1}{2} \lambda_S \leq \nu_c(G) \leq p^* \leq d^*$$

Az utolsó egyenlőtlenség a maximalizálási feladatokra vonatkozó gyenge dualitás miatt teljesül), miatt garantálja, hogy a lehetséges duális megoldásunk optimális.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást. Azon páratlan elemszámú pontthalmazokhoz tartozó duális változókhoz, amelyek több komponensbe is „beleharapnak” 0 értéket rendelünk.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást. Azon páratlan elemszámú pontthalmazokhoz tartozó duális változókhoz, amelyek több komponensbe is „beleharapnak” 0 értéket rendelünk.
- Párhuzamos élek egyszerűen kezelhetők.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást. Azon páratlan elemszámú pontthalmazokhoz tartozó duális változókhoz, amelyek több komponensbe is „beleharapnak” 0 értéket rendelünk.
- Párhuzamos élek egyszerűen kezelhetők. A továbbiakban feltesszük, hogy gráfunk egyszerű.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást. Azon páratlan elemszámú pontthalmazokhoz tartozó duális változókhoz, amelyek több komponensbe is „beleharapnak” 0 értéket rendelünk.
- Párhuzamos élek egyszerűen kezelhetők. A továbbiakban feltesszük, hogy gráfunk egyszerű.
- Ha a  $(c_e)_{e \in E(G)}$  vektor valamely komponense nem pozitív, akkor a duális feladatban az él semmilyen feltételt nem szab.



# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást. Azon páratlan elemszámú pontthalmazokhoz tartozó duális változókhoz, amelyek több komponensbe is „beleharapnak” 0 értéket rendelünk.
- Párhuzamos élek egyszerűen kezelhetők. A továbbiakban feltesszük, hogy gráfunk egyszerű.
- Ha a  $(c_e)_{e \in E(G)}$  vektor valamely komponense nem pozitív, akkor a duális feladatban az él semmilyen feltételt nem szab. Így ezek az élek elhagyhatók gráfunkból.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást. Azon páratlan elemszámú pontthalmazokhoz tartozó duális változókhoz, amelyek több komponensbe is „beleharapnak” 0 értéket rendelünk.
- Párhuzamos élek egyszerűen kezelhetők. A továbbiakban feltesszük, hogy gráfunk egyszerű.
- Ha a  $(c_e)_{e \in E(G)}$  vektor valamely komponense nem pozitív, akkor a duális feladatban az él semmilyen feltételt nem szab. Így ezek az élek elhagyhatók gráfunkból. Azaz feltehető, hogy  $(c_e)_{e \in E(G)} \in \mathbb{N}_+^{E(G)}$ .

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást. Azon páratlan elemszámú pontthalmazokhoz tartozó duális változókhoz, amelyek több komponensbe is „beleharapnak” 0 értéket rendelünk.
- Párhuzamos élek egyszerűen kezelhetők. A továbbiakban feltesszük, hogy gráfunk egyszerű.
- Ha a  $(c_e)_{e \in E(G)}$  vektor valamely komponense nem pozitív, akkor a duális feladatban az él semmilyen feltételt nem szab. Így ezek az élek elhagyhatók gráfunkból. Azaz feltehető, hogy  $(c_e)_{e \in E(G)} \in \mathbb{N}_+^{E(G)}$ .
- $|V| + |E| + \sum_{e \in E(G)} c(e)$ -re vonatkozó teljes indukciót végzünk.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: Első lépések

- Ha összefüggő gráfokra tudjuk a tételt, akkor a komponensekhez talált duális megoldásokból össze lehet rakni a teljes  $G$ -re vonatkozó megoldást. Azon páratlan elemszámú pontthalmazokhoz tartozó duális változókhoz, amelyek több komponensbe is „beleharapnak” 0 értéket rendelünk.
- Párhuzamos élek egyszerűen kezelhetők. A továbbiakban feltesszük, hogy gráfunk egyszerű.
- Ha a  $(c_e)_{e \in E(G)}$  vektor valamely komponense nem pozitív, akkor a duális feladatban az él semmilyen feltételt nem szab. Így ezek az élek elhagyhatók gráfunkból. Azaz feltehető, hogy  $(c_e)_{e \in E(G)} \in \mathbb{N}_+^{E(G)}$ .
- $|V| + |E| + \sum_{e \in E(G)} c(e)$ -re vonatkozó teljes indukciót végzünk. A kis gráfok (kis súlyokkal) eseteinek ellenőrzése egyszerű, az érdeklődő hallgató könnyen elvégezheti.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 1. eset és sémája

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 1. eset és sémája

**1. eset:** Legyen  $G$  és  $c$  olyan, hogy létezik  $v \in V(G)$  csúcs, hogy minden  $c$ -optimális párosítás lefedi  $v$ -t.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 1. eset és sémája

**1. eset:** Legyen  $G$  és  $c$  olyan, hogy létezik  $v \in V(G)$  csúcs, hogy minden  $c$ -optimális párosítás lefedi  $v$ -t.  $c$ -optimális párosítás alatt olyan  $M$  párosítást értünk, melyre  $c(M) = \nu_c(G)$ .

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 1. eset és sémája

**1. eset:** Legyen  $G$  és  $c$  olyan, hogy létezik  $v \in V(G)$  csúcs, hogy minden  $c$ -optimális párosítás lefedi  $v$ -t.  $c$ -optimális párosítás alatt olyan  $M$  párosítást értünk, melyre  $c(M) = \nu_c(G)$ .

- Ekkor bizonyításunk sémája a következő lesz:



# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 1. eset és sémája

**1. eset:** Legyen  $G$  és  $c$  olyan, hogy létezik  $v \in V(G)$  csúcs, hogy minden  $c$ -optimális párosítás lefedi  $v$ -t.  $c$ -optimális párosítás alatt olyan  $M$  párosítást értjük, melyre  $c(M) = \nu_c(G)$ .

- Ekkor bizonyításunk sémája a következő lesz:

$$\begin{array}{ccc}
 G, c & \xrightarrow[\text{lépés}]{\text{vissza-}} & G' = G \text{ (a gráf marad)} \\
 & & c'_e = \begin{cases} c_e - 1, & \text{ha } v \in e \\ c_e, & \text{különb.} \end{cases} \\
 & & \downarrow \begin{array}{l} \text{indukciós} \\ \text{feltevés} \end{array} \\
 & & \text{duális lehetséges, egész } \lambda' \\
 \lambda_u = \begin{cases} \lambda'_v + 1, & \text{ha } u = v \\ \lambda'_u, & \text{különb.} \end{cases} & \longleftarrow & \sum_{v \in V(G)} \lambda'_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{|S| - 1}{2} \lambda'_S \leq \nu_{c'}(G) \\
 \lambda_S = \lambda'_S \text{ minden } S \in \mathcal{O} \text{ esetén} & & 
 \end{array}$$

# 1. eset bizonyítása

## Állítás

A fenti sémában definiált  $\lambda$  igazolja a bizonyítandót. Azaz lehetséges, egész duális helyek és az optimalitást bizonyító egyenlőtlenséget teljesítik.

# 1. eset bizonyítása

## Állítás

A fenti sémában definiált  $\lambda$  igazolja a bizonyítandót. Azaz lehetséges, egész duális helyek és az optimalitást bizonyító egyenlőtlenséget teljesítik.

- A nem-negatív, egész mivolt nyilvánvaló.

# 1. eset bizonyítása

## Állítás

A fenti sémában definiált  $\lambda$  igazolja a bizonyítandót. Azaz lehetséges, egész duális helyek és az optimalitást bizonyító egyenlőtlenséget teljesítik.

- A nem-negatív, egész mivolt nyilvánvaló.
- Az indukciós feltevésből tudjuk, hogy

$$\sum_x \lambda'_x + \sum_S \frac{|S| - 1}{2} \lambda'_S \leq \nu_{c'}(G).$$

# 1. eset bizonyítása

## Állítás

A fenti sémában definiált  $\lambda$  igazolja a bizonyítandót. Azaz lehetséges, egész duális helyek és az optimalitást bizonyító egyenlőtlenséget teljesítik.

- A nem-negatív, egész mivolt nyilvánvaló.
- Az indukciós feltevésekből tudjuk, hogy

$$\sum_x \lambda'_x + \sum_S \frac{|S|-1}{2} \lambda'_S \leq \nu_{c'}(G).$$

- Kérdéses:

$$\sum_x \lambda_x + \sum_S \frac{|S|-1}{2} \lambda_S \leq \nu_c(G).$$

# 1. eset bizonyítása (folytatás)

# 1. eset bizonyítása (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?

# 1. eset bizonyítása (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- Az 1. eset feltétele és  $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal eggyel nő. A bal oldalon is nyilván ez történik.



# 1. eset bizonyítása (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- Az 1. eset feltétele és  $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal eggyel nő. A bal oldalon is nyilván ez történik.
- A lehetséges hely mivoltához minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él.

# 1. eset bizonyítása (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- Az 1. eset feltétele és  $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal eggyel nő. A bal oldalon is nyilván ez történik.
- A lehetséges hely mivoltához minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él. Tudjuk a következőt:

$$\lambda'_x + \lambda'_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c'_e.$$

# 1. eset bizonyítása (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- Az 1. eset feltétele és  $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal eggyel nő. A bal oldalon is nyilván ez történik.
- A lehetséges hely mivoltához minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él. Tudjuk a következőt:

$$\lambda'_x + \lambda'_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c'_e.$$

- Igazolnunk kell, hogy

$$\lambda_x + \lambda_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c_e.$$

# 1. eset bizonyítása (befejezés)

# 1. eset bizonyítása (befejezés)

- Ha  $v$  nem illeszkedik  $e$ -re, akkor  $\lambda'_x = \lambda_x$ ,  $\lambda'_y = \lambda_y$ ,  $c'_e = c_e$ , amiből az állítás nyilvánvaló.

# 1. eset bizonyítása (befejezés)

- Ha  $v$  nem illeszkedik  $e$ -re, akkor  $\lambda'_x = \lambda_x$ ,  $\lambda'_y = \lambda_y$ ,  $c'_e = c_e$ , amiből az állítás nyilvánvaló.
- Ha  $v$  illeszkedik  $e$ -re, akkor ismét a változást vizsgáljuk a tudott és a bizonyítandó egyenlőtlenségek oldalai között.

# 1. eset bizonyítása (befejezés)

- Ha  $v$  nem illeszkedik  $e$ -re, akkor  $\lambda'_x = \lambda_x$ ,  $\lambda'_y = \lambda_y$ ,  $c'_e = c_e$ , amiből az állítás nyilvánvaló.
- Ha  $v$  illeszkedik  $e$ -re, akkor ismét a változást vizsgáljuk a tudott és a bizonyítandó egyenlőtlenségek oldalai között.
- Könnyű látni, hogy a  $'$ -k elhagyásával mindkét oldal 1-gyel nő, amiből az állítás nyilvánvaló.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 2. eset és sémája



# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 2. eset és sémája

**2. eset:** Minden  $v$  csúcsra létezik  $M$   $c$ -optimális párosítás, ami nem fedi le (kihagyja)  $v$ -t.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 2. eset és sémája

**2. eset:** Minden  $v$  csúcsra létezik  $M$   $c$ -optimális párosítás, ami nem fedi le (kihagyja)  $v$ -t.

- Ekkor bizonyításunk sémája a következő lesz:

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 2. eset és sémája

**2. eset:** Minden  $v$  csúcsra létezik  $M$   $c$ -optimális párosítás, ami nem fedi le (kihagyja)  $v$ -t.

- Ekkor bizonyításunk sémája a következő lesz:

$$\begin{array}{ccc}
 G, c & \xrightarrow[\text{lépés}]{\text{vissza-}} & G' = G \text{ (a gráf marad)} \\
 & & c' = c - 1 \\
 & & \downarrow \begin{array}{l} \text{indukciós} \\ \text{lépés} \end{array} \\
 & & \text{duális lehetséges, egész } \lambda' \\
 \lambda_S = \begin{cases} \lambda'_S + 1, & \text{ha } S = V(G) \\ \lambda'_S, & \text{különben.} \end{cases} & \xleftarrow[\text{TÉTEL}]{* \text{ FEL-}} & \sum_{v \in V(G)} \lambda'_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{|S| - 1}{2} \lambda'_S \leq \nu_{c'}(G)
 \end{array}$$

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 2. eset és sémája

**2. eset:** Minden  $v$  csúcsra létezik  $M$   $c$ -optimális párosítás, ami nem fedi le (kihagyja)  $v$ -t.

- Ekkor bizonyításunk sémája a következő lesz:

$$\begin{array}{ccc}
 G, c & \xrightarrow[\text{lépés}]{\text{vissza-}} & G' = G \text{ (a gráf marad)} \\
 & & c' = c - 1 \\
 & & \downarrow \begin{array}{l} \text{indukciós} \\ \text{lépés} \end{array} \\
 & & \text{duális lehetséges, egész } \lambda' \\
 \lambda_S = \begin{cases} \lambda'_S + 1, & \text{ha } S = V(G) \\ \lambda'_S, & \text{különben.} \end{cases} & \xleftarrow[\text{TÉTEL}]{\text{* FEL-}} & \sum_{v \in V(G)} \lambda'_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{|S| - 1}{2} \lambda'_S \leq \nu_{c'}(G)
 \end{array}$$

- A 2. eset tárgyalásánál feltesszük

## ★ FELTÉTEL

A  $c'$ -optimális párosítás olyan, hogy csak egy csúcsot nem párosít.

# Cunningham—Marsh-tétel bizonyítása: 2. eset és sémája

**2. eset:** Minden  $v$  csúcsra létezik  $M$   $c$ -optimális párosítás, ami nem fedi le (kihagyja)  $v$ -t.

- Ekkor bizonyításunk sémája a következő lesz:

$$\begin{array}{ccc}
 G, c & \xrightarrow[\text{lépés}]{\text{vissza-}} & G' = G \text{ (a gráf marad)} \\
 & & c' = c - 1 \\
 & & \downarrow \begin{array}{l} \text{indukciós} \\ \text{lépés} \end{array} \\
 & & \text{duális lehetséges, egész } \lambda' \\
 \lambda_S = \begin{cases} \lambda'_S + 1, & \text{ha } S = V(G) \\ \lambda'_S, & \text{különben.} \end{cases} & \xleftarrow{\text{* FEL-}} & \sum_{v \in V(G)} \lambda'_v + \sum_{S \in \mathcal{O}} \frac{|S| - 1}{2} \lambda'_S \leq \nu_{c'}(G) \\
 \text{TÉTEL} & & 
 \end{array}$$

- A 2. eset tárgyalásánál feltesszük

## ★ FELTÉTEL

A  $c'$ -optimális párosítás olyan, hogy csak egy csúcsot nem párosít.

Speciálisan  $V$  elemszáma páratlan, vagyis  $V \in \mathcal{O}$ .

## 2. eset bizonyítása ★ mellett

## 2. eset bizonyítása ★ mellett

### Állítás

A fenti sémában definiált  $\lambda$  igazolja a bizonyítandót.

## 2. eset bizonyítása ★ mellett

### Állítás

A fenti sémában definiált  $\lambda$  igazolja a bizonyítandót.

- A nem-negatív, egész mivolt nyilvánvaló.



## 2. eset bizonyítása ★ mellett

### Állítás

A fenti sémában definiált  $\lambda$  igazolja a bizonyítandót.

- A nem-negatív, egész mivolt nyilvánvaló.
- Az optimalitást biztosító egyenlőtlenség igazolásához tudjuk, hogy

$$\sum_x \lambda'_x + \sum_S \frac{|S| - 1}{2} \lambda'_S \leq \nu_{c'}(G).$$

## 2. eset bizonyítása ★ mellett

### Állítás

A fenti sémában definiált  $\lambda$  igazolja a bizonyítandót.

- A nem-negatív, egész mivolt nyilvánvaló.
- Az optimalitást biztosító egyenlőtlenség igazolásához tudjuk, hogy

$$\sum_x \lambda'_x + \sum_S \frac{|S|-1}{2} \lambda'_S \leq \nu_{c'}(G).$$

- Kérdéses:

$$\sum_x \lambda_x + \sum_S \frac{|S|-1}{2} \lambda_S \leq \nu_c(G).$$

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal  $|M|$ -mel nő, ahol  $M$  egy  $c'$ -optimális párosítás.

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal  $|M|$ -mel nő, ahol  $M$  egy  $c'$ -optimális párosítás.
- A 2. eset feltétele garantálja, hogy a növekmény  $|M| = \frac{|V|-1}{2}$ .

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal  $|M|$ -mel nő, ahol  $M$  egy  $c'$ -optimális párosítás.
- A 2. eset feltétele garantálja, hogy a növekmény  $|M| = \frac{|V|-1}{2}$ . A bal oldalon egyetlen tag változik: a  $V$ -vel indexelt duális változó.

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal  $|M|$ -mel nő, ahol  $M$  egy  $c'$ -optimális párosítás.
- A 2. eset feltétele garantálja, hogy a növekmény  $|M| = \frac{|V|-1}{2}$ . A bal oldalon egyetlen tag változik: a  $V$ -vel indexelt duális változó. Együtthatója  $\frac{|V|-1}{2}$ , értéke 1-gyel nő.



## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- Hogyan változik az első egyenlőtlenség két oldala, amikor elhagyjuk a  $'$ -ket?
- $c'$  definíciója garantálja, hogy a jobb oldal  $|M|$ -mel nő, ahol  $M$  egy  $c'$ -optimális párosítás.
- A 2. eset feltétele garantálja, hogy a növekmény  $|M| = \frac{|V|-1}{2}$ . A bal oldalon egyetlen tag változik: a  $V$ -vel indexelt duális változó. Együtthatója  $\frac{|V|-1}{2}$ , értéke 1-gyel nő. A bizonyítandó nyilvánvaló.

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- A lehetséges hely mivolthoz minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt.

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- A lehetséges hely mivolthoz minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él.

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- A lehetséges hely mivelthoz minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él. Tudjuk a következőt:

$$\lambda'_x + \lambda'_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c'_e.$$

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- A lehetséges hely mivoltához minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él. Tudjuk a következőt:

$$\lambda'_x + \lambda'_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c'_e.$$

- Igazolnunk kell, hogy

$$\lambda_x + \lambda_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c_e.$$

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- A lehetséges hely mivelthoz minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él. Tudjuk a következőt:

$$\lambda'_x + \lambda'_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c'_e.$$

- Igazolnunk kell, hogy

$$\lambda_x + \lambda_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c_e.$$

- Ismét a változást vizsgáljuk a tudott és a bizonyítandó egyenlőtlenségek oldalai között.

## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- A lehetséges hely mivoltához minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él. Tudjuk a következőt:

$$\lambda'_x + \lambda'_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c'_e.$$

- Igazolnunk kell, hogy

$$\lambda_x + \lambda_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c_e.$$

- Ismét a változást vizsgáljuk a tudott és a bizonyítandó egyenlőtlenségek oldalai között. Könnyű látni, hogy a  $'$ -k elhagyásával mindkét oldal 1-gyel nő,



## 2. eset bizonyítása ★ mellett (folytatás)

- A lehetséges hely mivelthoz minden élre ellenőrizni kell az előírt feltételt. Legyen  $e = xy$  egy tetszőleges él. Tudjuk a következőt:

$$\lambda'_x + \lambda'_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c'_e.$$

- Igazolnunk kell, hogy

$$\lambda_x + \lambda_y + \sum_{\substack{S \in \mathcal{O} \\ xy \in S}} \lambda_S \geq c_e.$$

- Ismét a változást vizsgáljuk a tudott és a bizonyítandó egyenlőtlenségek oldalai között. Könnyű látni, hogy a  $'$ -k elhagyásával mindkét oldal 1-gyel nő, amiből az állítás nyilvánvaló.

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma

# A $\star$ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma

## Állítás

Az 1. eset után/a 2. esetben a  $\star$  FELTÉTEL feltehető.

# A $\star$ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma

## Állítás

Az 1. eset után/a 2. esetben a  $\star$  FELTÉTEL feltehető.

- Ez következik az alábbi két lemmából. Az indoklás során feltesszük, hogy a 2. eset feltételei teljesülnek.

# A $\star$ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma

## Állítás

Az 1. eset után/a 2. esetben a  $\star$  FELTÉTEL feltehető.

- Ez következik az alábbi két lemmából. Az indoklás során feltesszük, hogy a 2. eset feltételei teljesülnek.

## Lemma

$c'$ -optimális párosítás nem lehet teljes párosítás.

# A $\star$ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma

## Állítás

Az 1. eset után/a 2. esetben a  $\star$  FELTÉTEL feltehető.

- Ez következik az alábbi két lemmából. Az indoklás során feltesszük, hogy a 2. eset feltételei teljesülnek.

## Lemma

$c'$ -optimális párosítás nem lehet teljes párosítás.

- Legyen  $M$  egy  $c$ -optimális párosítás. Mivel a 2. esetben vagyunk feltehetjük, hogy  $M$  nem teljes.

# A $\star$ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma

## Állítás

Az 1. eset után/a 2. esetben a  $\star$  FELTÉTEL feltehető.

- Ez következik az alábbi két lemmából. Az indoklás során feltesszük, hogy a 2. eset feltételei teljesülnek.

## Lemma

$c'$ -optimális párosítás nem lehet teljes párosítás.

- Legyen  $M$  egy  $c$ -optimális párosítás. Mivel a 2. esetben vagyunk feltehetjük, hogy  $M$  nem teljes.
- Legyen  $M'$   $c'$ -optimális párosítás. Indirekt tegyük fel, hogy teljes párosítás.

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma (folytatás)



## A ★ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma (folytatás)

- Mivel  $M$   $c$ -optimális, ezért  $c(M') \leq c(M)$  teljesül. Mivel tudjuk, hogy  $M$  nem teljes, ezért  $c'$  súlyáról is mondhatunk valamit:

$$c'(M) = c(M) - |M| > c(M) - \frac{|V|}{2} \geq c(M') - \frac{|V|}{2}.$$

## A ★ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma (folytatás)

- Mivel  $M$   $c$ -optimális, ezért  $c(M') \leq c(M)$  teljesül. Mivel tudjuk, hogy  $M$  nem teljes, ezért  $c'$  súlyáról is mondhatunk valamit:

$$c'(M) = c(M) - |M| > c(M) - \frac{|V|}{2} \geq c(M') - \frac{|V|}{2}.$$

- Továbbá  $M'$  teljes párosítás

$$c'(M') = c(M') - |M'| = c(M') - \frac{|V|}{2} (< c'(M)).$$

## A ★ FELTÉTEL jogossága: 1. Lemma (folytatás)

- Mivel  $M$   $c$ -optimális, ezért  $c(M') \leq c(M)$  teljesül. Mivel tudjuk, hogy  $M$  nem teljes, ezért  $c'$  súlyáról is mondhatunk valamit:

$$c'(M) = c(M) - |M| > c(M) - \frac{|V|}{2} \geq c(M') - \frac{|V|}{2}.$$

- Továbbá  $M'$  teljes párosítás

$$c'(M') = c(M') - |M'| = c(M') - \frac{|V|}{2} (< c'(M)).$$

- Ez ellentmond annak, hogy  $M'$  egy  $c'$ -optimális párosítás.

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma

## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma

## Lemma

Nem lehet, hogy minden  $c'$ -optimális párosítás legalább két csúcsot párosítatlanul hagy.

## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma

## Lemma

Nem lehet, hogy minden  $c'$ -optimális párosítás legalább két csúcsot párosítatlanul hagy.

- Indirekt tegyük fel, hogy  $M'$   $c'$ -optimális párosítás és  $x, y \in V$  úgy, hogy  $M'$  nem fedti le  $x$ -et és  $y$ -t. Legyen  $(M', x, y)$  olyan, hogy  $d(x, y)$  minimális.

## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma

## Lemma

Nem lehet, hogy minden  $c'$ -optimális párosítás legalább két csúcsot párosítatlanul hagy.

- Indirekt tegyük fel, hogy  $M'$   $c'$ -optimális párosítás és  $x, y \in V$  úgy, hogy  $M'$  nem fedile  $x$ -et és  $y$ -t. Legyen  $(M', x, y)$  olyan, hogy  $d(x, y)$  minimális.
- $d(x, y) > 1$ , mert  $x$  és  $y$  összekötöttsége garantálná, hogy  $M' \cup \{xy \text{ él}\}$  szintén párosítás lenne, ami ellentmondás  $c'$ -optimalitásával ( $c' > 0$ ). (Általában egy optimális párosítás nem hagyhat két összekötött csúcsot párosítatlanul.)

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)



# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Legyen  $x^+$  egy  $P$  legrövidebb  $xy$  úton az első  $x$ -et követő csúcs ( $y$  felé haladva). (A fentiek miatt  $x^+ \neq y$ .) Tekintsük a következő két párosítást:
  - (1)  $M_{x^+}$ :  $c$ -optimális párosítás, nem fedí le  $x^+$ -t (a 2. esetben ilyen létezése garantált).
  - (2)  $M'$ . A  $c'$ -optimalitás garantálja, hogy  $M'$  lefedi az  $x^+$  csúcsot ( $x$  és  $x^+$  összekötött).

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Legyen  $x^+$  egy  $P$  legrövidebb  $xy$  úton az első  $x$ -et követő csúcs ( $y$  felé haladva). (A fentiek miatt  $x^+ \neq y$ .) Tekintsük a következő két párosítást:
  - (1)  $M_{x^+}$ :  $c$ -optimális párosítás, nem fedi le  $x^+$ -t (a 2. esetben ilyen létezése garantált).
  - (2)  $M'$ . A  $c'$ -optimalitás garantálja, hogy  $M'$  lefedi az  $x^+$  csúcsot ( $x$  és  $x^+$  összekötött).
- $M_{x^+} \Delta M'$  élek által alkotott  $\mathcal{M}$  gráf komponensei körök és utak (BSc Kombinatorika kurzus).

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Legyen  $x^+$  egy  $P$  legrövidebb  $xy$  úton az első  $x$ -et követő csúcs ( $y$  felé haladva). (A fentiek miatt  $x^+ \neq y$ .) Tekintsük a következő két párosítást:
  - (1)  $M_{x^+}$ :  $c$ -optimális párosítás, nem fedi le  $x^+$ -t (a 2. esetben ilyen létezése garantált).
  - (2)  $M'$ . A  $c'$ -optimalitás garantálja, hogy  $M'$  lefedi az  $x^+$  csúcsot ( $x$  és  $x^+$  összekötött).
- $M_{x^+} \Delta M'$  élek által alkotott  $\mathcal{M}$  gráf komponensei körök és utak (BSc Kombinatorika kurzus).
- Párosításaink tulajdonságai miatt  $x^+$  egy 1 fokú csúcs az  $\mathcal{M}$  gráfban.


## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Legyen  $x^+$  egy  $P$  legrövidebb  $xy$  úton az első  $x$ -et követő csúcs ( $y$  felé haladva). (A fentiek miatt  $x^+ \neq y$ .) Tekintsük a következő két párosítást:
  - (1)  $M_{x^+}$ :  $c$ -optimális párosítás, nem fedi le  $x^+$ -t (a 2. esetben ilyen létezése garantált).
  - (2)  $M'$ . A  $c'$ -optimalitás garantálja, hogy  $M'$  lefedi az  $x^+$  csúcsot ( $x$  és  $x^+$  összekötött).
- $M_{x^+} \Delta M'$  élek által alkotott  $\mathcal{M}$  gráf komponensei körök és utak (BSc Kombinatorika kurzus).
- Párosításaink tulajdonságai miatt  $x^+$  egy 1 fokú csúcs az  $\mathcal{M}$  gráfban. Azaz az  $x^+$  a végpontja egy  $Q$  útnak  $\mathcal{M}$ -ben. Legyen

$$\tilde{M}_{x^+} = M_{x^+} \Delta E(Q) \quad \text{és} \quad \tilde{M}' = M' \Delta E(Q).$$

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma: Ábra

# A $\star$ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma: Ábra



A bal oldalon a fekete élek a  $P$  út élei, a piros élek  $M_{x^+}$  élei, a kék élek  $M'$  élei, lila jelöli a  $Q$  utat. A jobb oldalon a módosított párosítások ( $\tilde{M}'$  és  $\tilde{M}_{x^+}$ ): a  $Q$ /lila út mentén a piros és kék éleket felcseréljük. A két oldalon a piros és kék élek együttes súlya ugyanaz.

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Ekkor  $M_{x^+}$   $c$ -optimalitása miatt

$$c(\tilde{M}_{x^+}) \leq c(M_{x^+}).$$



## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Ekkor  $M_{x^+}$   $c$ -optimalitása miatt

$$c(\widetilde{M}_{x^+}) \leq c(M_{x^+}).$$

- Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható  $M'$ -re  $c'$ -optimalitása miatt:  $c'(\widetilde{M}') \leq c'(M')$ .

## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Ekkor  $M_{x^+}$   $c$ -optimalitása miatt

$$c(\tilde{M}_{x^+}) \leq c(M_{x^+}).$$

- Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható  $M'$ -re  $c'$ -optimalitása miatt:  $c'(\tilde{M}')$   $\leq c'(M')$ .
- Egy kis ötlettel azonban többet is mondhatunk:  $\tilde{M}'$  nem fedi le az  $x^+$  csúcsot.

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Ekkor  $M_{x^+}$   $c$ -optimalitása miatt

$$c(\tilde{M}_{x^+}) \leq c(M_{x^+}).$$

- Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható  $M'$ -re  $c'$ -optimalitása miatt:  $c'(\tilde{M}')$   $\leq c'(M')$ .
- Egy kis ötlettel azonban többet is mondhatunk:  $\tilde{M}'$  nem fedti le az  $x^+$  csúcsot. Továbbá  $x$  vagy  $y$  is fedetlen marad (a csere csak a  $Q$  út két végpontjánál változtatja meg a párosítottságot és az egyik végpont biztos nem  $x$  vagy  $y$  (hanem  $x^+$ )).

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- Ekkor  $M_{x^+}$   $c$ -optimalitása miatt

$$c(\tilde{M}_{x^+}) \leq c(M_{x^+}).$$

- Ugyanez a gondolatmenet alkalmazható  $M'$ -re  $c'$ -optimalitása miatt:  $c'(\tilde{M}') \leq c'(M')$ .
- Egy kis ötlettel azonban többet is mondhatunk:  $\tilde{M}'$  nem fedti le az  $x^+$  csúcsot. Továbbá  $x$  vagy  $y$  is fedetlen marad (a csere csak a  $Q$  út két végpontjánál változtatja meg a párosítottságot és az egyik végpont biztos nem  $x$  vagy  $y$  (hanem  $x^+$ )).
- Mivel  $d(x^+, x) = 1 < d(x, y)$  és  $d(x^+, y) = d(x, y) - 1 < d(x, y)$  is teljesül, ezért  $(M', x, y)$  választása miatt  $\tilde{M}'$  nem lehet  $c'$ -optimális:

$$c'(\tilde{M}') < c'(M').$$

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- $x^+$ -ra (a  $Q$  út egyik végpontjára) a  $Q$  úton egy  $M'$ -beli él illeszkedik.

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- $x^+$ -ra (a  $Q$  út egyik végpontjára) a  $Q$  úton egy  $M'$ -beli él illeszkedik. Ebből nyilvánvaló, hogy  $Q$  mentén legalább annyi  $M'$ -beli él szerepel, mint  $M_{x^+}$ -beli él.

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- $x^+$ -ra (a  $Q$  út egyik végpontjára) a  $Q$  úton egy  $M'$ -beli él illeszkedik. Ebből nyilvánvaló, hogy  $Q$  mentén legalább annyi  $M'$ -beli él szerepel, mint  $M_{x^+}$ -beli él. Azaz a cserével  $M'$  élszáma nem nőhet:  $|\widetilde{M}'| \leq |M'|$ .



## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- $x^+$ -ra (a  $Q$  út egyik végpontjára) a  $Q$  úton egy  $M'$ -beli él illeszkedik. Ebből nyilvánvaló, hogy  $Q$  mentén legalább annyi  $M'$ -beli él szerepel, mint  $M_{x^+}$ -beli él. Azaz a cserével  $M'$  élszáma nem nőhet:  $|\widetilde{M}'| \leq |M'|$ .

- Így

$$c(\widetilde{M}') = c'(\widetilde{M}') + |\widetilde{M}'| < c'(M') + |\widetilde{M}'| \leq c'(M') + |M'| = c(M').$$

## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- $x^+$ -ra (a  $Q$  út egyik végpontjára) a  $Q$  úton egy  $M'$ -beli él illeszkedik. Ebből nyilvánvaló, hogy  $Q$  mentén legalább annyi  $M'$ -beli él szerepel, mint  $M_{x^+}$ -beli él. Azaz a cserével  $M'$  élszáma nem nőhet:  $|\widetilde{M}'| \leq |M'|$ .

- Így

$$c(\widetilde{M}') = c'(\widetilde{M}') + |\widetilde{M}'| < c'(M') + |\widetilde{M}'| \leq c'(M') + |M'| = c(M').$$

- A módosításunk a két párosítás szerepét cserélte egy út élhalmaza mentén.

## A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- $x^+$ -ra (a  $Q$  út egyik végpontjára) a  $Q$  úton egy  $M'$ -beli él illeszkedik. Ebből nyilvánvaló, hogy  $Q$  mentén legalább annyi  $M'$ -beli él szerepel, mint  $M_{x^+}$ -beli él. Azaz a cserével  $M'$  élszáma nem nőhet:  $|\widetilde{M}'| \leq |M'|$ .

- Így

$$c(\widetilde{M}') = c'(\widetilde{M}') + |\widetilde{M}'| < c'(M') + |\widetilde{M}'| \leq c'(M') + |M'| = c(M').$$

- A módosításunk a két párosítás szerepét cserélte egy út élhalmaza mentén. A két párosítás együttes súlya nem változott, azaz

$$c(\widetilde{M}') + c(\widetilde{M}_{x^+}) = c(M') + c(M_{x^+}).$$

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- $x^+$ -ra (a  $Q$  út egyik végpontjára) a  $Q$  úton egy  $M'$ -beli él illeszkedik. Ebből nyilvánvaló, hogy  $Q$  mentén legalább annyi  $M'$ -beli él szerepel, mint  $M_{x^+}$ -beli él. Azaz a cserével  $M'$  élszáma nem nőhet:  $|\widetilde{M}'| \leq |M'|$ .

- Így

$$c(\widetilde{M}') = c'(\widetilde{M}') + |\widetilde{M}'| < c'(M') + |\widetilde{M}'| \leq c'(M') + |M'| = c(M').$$

- A módosításunk a két párosítás szerepét cserélte egy út élhalmaza mentén. A két párosítás együttes súlya nem változott, azaz

$$c(\widetilde{M}') + c(\widetilde{M}_{x^+}) = c(M') + c(M_{x^+}).$$

- Ennek ellentmond (1) és (2) összegének.

# A ★ FELTÉTEL jogossága: 2. Lemma (folytatás)

- $x^+$ -ra (a  $Q$  út egyik végpontjára) a  $Q$  úton egy  $M'$ -beli él illeszkedik. Ebből nyilvánvaló, hogy  $Q$  mentén legalább annyi  $M'$ -beli él szerepel, mint  $M_{x^+}$ -beli él. Azaz a cserével  $M'$  élszáma nem nőhet:  $|\widetilde{M}'| \leq |M'|$ .

- Így

$$c(\widetilde{M}') = c'(\widetilde{M}') + |\widetilde{M}'| < c'(M') + |\widetilde{M}'| \leq c'(M') + |M'| = c(M').$$

- A módosításunk a két párosítás szerepét cserélte egy út élhalmaza mentén. A két párosítás együttes súlya nem változott, azaz

$$c(\widetilde{M}') + c(\widetilde{M}_{x^+}) = c(M') + c(M_{x^+}).$$

- Ennek ellentmond (1) és (2) összegének. Ebből adódik az állítás.

# A bizonyítás vége

# A bizonyítás vége

- A két lemma bizonyítja a FELTEVÉS realitását.

# A bizonyítás vége

- A két lemma bizonyítja a FELTEVÉS realitását.
- Így a 2. eset tárgyalása korrekt.



# A bizonyítás vége

- A két lemma bizonyítja a FELTEVÉS realitását.
- Így a 2. eset tárgyalása korrekt.
- A bizonyítás teljes.

# Vége van!

Köszönöm a figyelmet!