

# Sorbaállítások, átrendezések

Hajnal Péter

2021. tavasz

# Az alapkérdés: Egy konkrét példa

## Az alapkérdés: Egy konkrét példa

- Van három plüss figuránk: egy elefánt, egy zsiráf és egy kutya. Napközben ezekkel játszunk, de este Édesanyánk azt mondja rendet kell csinálni. A plüss figurákat egy polcon tartjuk, ahol egymás mellett férnek el. Este sorba kell raknunk őket a polcon. Hány lehetőségünk van?

## Az alapkérdés: Egy konkrét példa

- Van három plüss figuránk: egy elefánt, egy zsiráf és egy kutya. Napközben ezekkel játszunk, de este Édesanyánk azt mondja rendet kell csinálni. A plüss figurákat egy polcon tartjuk, ahol egymás mellett férnek el. Este sorba kell raknunk őket a polcon. Hány lehetőségünk van?
- A játékokat értelemszerűen jelöljük  $E$ ,  $Zs$  és  $K$  jelekkel.

## Az alapkérdés: Egy konkrét példa

- Van három plüss figuránk: egy elefánt, egy zsiráf és egy kutya. Napközben ezekkel játszunk, de este Édesanyánk azt mondja rendet kell csinálni. A plüss figurákat egy polcon tartjuk, ahol egymás mellett férnek el. Este sorba kell raknunk őket a polcon. Hány lehetőségünk van?
- A játékokat értelemszerűen jelöljük  $E$ ,  $Zs$  és  $K$  jelekkel. A lehetőségeket listázhatjuk:

$$\begin{array}{lll} E K Zs, & E Zs K, & K E Zs, \\ K Zs E, & Zs E K, & Zs K E. \end{array}$$

## Az alapkérdés: Egy konkrét példa

- Van három plüss figuránk: egy elefánt, egy zsiráf és egy kutya. Napközben ezekkel játszunk, de este Édesanyánk azt mondja rendet kell csinálni. A plüss figurákat egy polcon tartjuk, ahol egymás mellett férnek el. Este sorba kell raknunk őket a polcon. Hány lehetőségünk van?
- A játékokat értelemszerűen jelöljük  $E$ ,  $Zs$  és  $K$  jelekkel. A lehetőségeket listázhatjuk:

$$\begin{array}{lll} E K Zs, & E Zs K, & K E Zs, \\ K Zs E, & Zs E K, & Zs K E. \end{array}$$

Hat lehetőségünk van.

# A sorbaállítás definíciója

# A sorbaállítás definíciója

- A sorbaállítás egy „nyelvet” is ad számunkra. Lesz első, második/középső, harmadik/utolsó játék, mondhatjuk, hogy az első és utolsó közrefogja a középsőt.



# A sorbaállítás definíciója

- A sorbaállítás egy „nyelvet” is ad számunkra. Lesz első, második/középső, harmadik/utolsó játék, mondhatjuk, hogy az első és utolsó közrefogja a középsőt.
- Egy  $H$  halmazt alkotó  $n$  elem sorbaállításánál van  $n$  pozíció, amit az  $1, 2, \dots, n$  számokkal jelölhetünk.

# A sorbaállítás definíciója

- A sorbaállítás egy „nyelvet” is ad számunkra. Lesz első, második/középső, harmadik/utolsó játék, mondhatjuk, hogy az első és utolsó közrefogja a középsőt.
- Egy  $H$  halmazt alkotó  $n$  elem sorbaállításánál van  $n$  pozíció, amit az  $1, 2, \dots, n$  számokkal jelölhetünk. A sorbaállításnál a pozíciókat és  $H$  elemeit párba állítjuk.

# A sorbaállítás definíciója

- A sorbaállítás egy „nyelvet” is ad számunkra. Lesz első, második/középső, harmadik/utolsó játék, mondhatjuk, hogy az első és utolsó közrefogja a középsőt.
- Egy  $H$  halmazt alkotó  $n$  elem sorbaállításánál van  $n$  pozíció, amit az  $1, 2, \dots, n$  számokkal jelölhetünk. A sorbaállításnál a pozíciókat és  $H$  elemeit párba állítjuk.

## Definíció

Egy  $n$  elemű  $H$  halmaz sorbaállítása egy

$$\pi : [n] = \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow H$$

bijekció.

# A formalizmusról

# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

1	2	3
<hr/>	<hr/>	<hr/>
K	Zs	E

# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

1	2	3
$K$	$Zs$	$E$
$\underbrace{1}$	$\underbrace{2}$	$\underbrace{3}$
$K$	$Zs$	$E$

# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

1	2	3
$K$	$Zs$	$E$

$\underbrace{\quad}$       $\underbrace{\quad}$       $\underbrace{\quad}$

$K$      $Zs$      $E$

$K Zs E$

ugyanannak a sorbaállításnak a leírása.



# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

1	2	3
$K$	$Zs$	$E$

$\underbrace{\quad}$       $\underbrace{\quad}$       $\underbrace{\quad}$

$K$      $Zs$      $E$

$K Zs E$

ugyanannak a sorbaállításnak a leírása.

- Nyilván a legutolsó a legrövidebb, legemberibb.

# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

1	2	3
K	Zs	E
⏟	⏟	⏟
K	Zs	E
$K Zs E$		

ugyanannak a sorbaállításnak a leírása.

- Nyilván a legutolsó a legrövidebb, legemberibb. Tömörsege köszönhető annak, hogy néhány megállapodáson alapul olvasata. Például a sor első eleme a bal oldali elem.

# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

1	2	3
K	Zs	E
⏟	⏟	⏟
K	Zs	E
K Zs E		

ugyanannak a sorbaállításnak a leírása.

- Nyilván a legutolsó a legrövidebb, legemberibb. Tömörsege köszönhető annak, hogy néhány megállapodáson alapul olvasata. Például a sor első eleme a bal oldali elem. Héber közösségben esetleg más olvasat lehetséges.

# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

1	2	3
K	Zs	E
⏟	⏟	⏟
K	Zs	E
$K Zs E$		

ugyanannak a sorbaállításnak a leírása.

- Nyilván a legutolsó a legrövidebb, legemberibb. Tömörsege köszönhető annak, hogy néhány megállapodáson alapul olvasata. Például a sor első eleme a bal oldali elem. Héber közösségben esetleg más olvasat lehetséges.
- Ennek ellenére a formális matematikai leírás az első.

# A formalizmusról

## Példa

Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Ekkor

1	2	3
K	Zs	E
⏟	⏟	⏟
K	Zs	E
$K Zs E$		

ugyanannak a sorbaállításnak a leírása.

- Nyilván a legutolsó a legrövidebb, legemberibb. Tömörsege köszönhető annak, hogy néhány megállapodáson alapul olvasata. Például a sor első eleme a bal oldali elem. Héber közösségben esetleg más olvasat lehetséges.
- Ennek ellenére a formális matematikai leírás az első. A bijekciót leíró táblázat oszlopai felcserélhetők, olvasata „robusztus”.

# Az alapkérdés

# Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $\sigma(H)$  a  $H$  halmaz sorbaállításainak halmaza.

# Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $\sigma(H)$  a  $H$  halmaz sorbaállításainak halmaza.

- Az alapkérdés: Legyen  $H$  egy  $n$  elemű halmaz. Határozzuk meg  $|\sigma(H)|$ -t.



# Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $\sigma(H)$  a  $H$  halmaz sorbaállításainak halmaza.

- Az alapkérdés: Legyen  $H$  egy  $n$  elemű halmaz. Határozzuk meg  $|\sigma(H)|$ -t. Speciálisabban: Határozzuk meg  $|\sigma([n])|$ -t.

# Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $\sigma(H)$  a  $H$  halmaz sorbaállításainak halmaza.

- Az alapkérdés: Legyen  $H$  egy  $n$  elemű halmaz. Határozzuk meg  $|\sigma(H)|$ -t. Speciálisabban: Határozzuk meg  $|\sigma([n])|$ -t.
- Ez „középiskolás nyelven”: Adott  $n$  különböző tárgy. Hányféleképpen állíthatjuk sorba őket?

# Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $\sigma(H)$  a  $H$  halmaz sorbaállításainak halmaza.

- Az alapkérdés: Legyen  $H$  egy  $n$  elemű halmaz. Határozzuk meg  $|\sigma(H)|$ -t. Speciálisabban: Határozzuk meg  $|\sigma([n])|$ -t.
- Ez „középiskolás nyelven”: Adott  $n$  különböző tárgy. Hányféleképpen állíthatjuk sorba őket?

## Jelölés

Legyen  $n$  egy természetes szám. Ekkor  $n!$  (olvasata  $n$  faktoriális) a következő értéket jelöli

$$n! = \begin{cases} 1, & n = 0, 1 \\ 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, & \text{különb} \end{cases}$$

# A tétel

# A tétel

- Szavakkal:  $n$  faktoriális az első  $n$  pozitív egész szorzata.

# A tétel

- Szavakkal:  $n$  faktoriális az első  $n$  pozitív egész szorzata.
- Ha  $n = 0$  vagy  $n = 1$ , akkor ennek értelmezése nem világos.

# A tétel

- Szavakkal:  $n$  faktoriális az első  $n$  pozitív egész szorzata.
- Ha  $n = 0$  vagy  $n = 1$ , akkor ennek értelmezése nem világos. Mit értünk 0 tényezős/üres szorzat alatt?

# A tétel

- Szavakkal:  $n$  faktoriális az első  $n$  pozitív egész szorzata.
- Ha  $n = 0$  vagy  $n = 1$ , akkor ennek értelmezése nem világos. Mit értünk 0 tényezős/üres szorzat alatt? Mit értünk egytényezős szorzat alatt?



# A tétel

- Szavakkal:  $n$  faktoriális az első  $n$  pozitív egész szorzata.
- Ha  $n = 0$  vagy  $n = 1$ , akkor ennek értelmezése nem világos. Mit értünk 0 tényezős/üres szorzat alatt? Mit értünk egytényezős szorzat alatt?
- Az üres szorzat értéke 1.

# A tétel

- Szavakkal:  $n$  faktoriális az első  $n$  pozitív egész szorzata.
- Ha  $n = 0$  vagy  $n = 1$ , akkor ennek értelmezése nem világos. Mit értünk 0 tényezős/üres szorzat alatt? Mit értünk egytényezős szorzat alatt?
- Az üres szorzat értéke 1. Az egy tényezős szorzat értéke az egyetlen tényező.

# A tétel

- Szavakkal:  $n$  faktoriális az első  $n$  pozitív egész szorzata.
- Ha  $n = 0$  vagy  $n = 1$ , akkor ennek értelmezése nem világos. Mit értünk 0 tényezős/üres szorzat alatt? Mit értünk egytényezős szorzat alatt?
- Az üres szorzat értéke 1. Az egy tényezős szorzat értéke az egyetlen tényező. Fent a megállapodások alapján kijövő értékeket írtuk le.

# A tétel

- Szavakkal:  $n$  faktoriális az első  $n$  pozitív egész szorzata.
- Ha  $n = 0$  vagy  $n = 1$ , akkor ennek értelmezése nem világos. Mit értünk 0 tényezős/üres szorzat alatt? Mit értünk egytényezős szorzat alatt?
- Az üres szorzat értéke 1. Az egy tényezős szorzat értéke az egyetlen tényező. Fent a megállapodások alapján kijövő értékeket írtuk le.

## Tétel

$n$  tárgyat

$n!$ -féleképpen

állíthatunk sorba.

# Kis $n$ -ek esete

# Kis $n$ -ek esete

- Az  $n = 0$  eset nyilvánvaló.

# Kis $n$ -ek esete

- Az  $n = 0$  eset nyilvánvaló.
- A sorbaállításokra úgy kell gondolnunk mint egy-egy fénykép. Ha  $n = 0$ , akkor nincs sorbaállítandó tárgy, egyetlen egy fénykép lehetséges: az „üres polc” fényképe (feltettük, hogy a sor egy polcon kerül kialakításra).

# Kis $n$ -ek esete

- Az  $n = 0$  eset nyilvánvaló.
- A sorbaállításokra úgy kell gondolnunk mint egy-egy fénykép. Ha  $n = 0$ , akkor nincs sorbaállítandó tárgy, egyetlen egy fénykép lehetséges: az „üres polc” fényképe (feltettük, hogy a sor egy polcon kerül kialakításra).
- Az  $n = 1$  eset hasonlóan nyilvánvaló.



# Kis $n$ -ek esete

- Az  $n = 0$  eset nyilvánvaló.
- A sorbaállításokra úgy kell gondolnunk mint egy-egy fénykép. Ha  $n = 0$ , akkor nincs sorbaállítandó tárgy, egyetlen egy fénykép lehetséges: az „üres polc” fényképe (feltettük, hogy a sor egy polcon kerül kialakításra).
- Az  $n = 1$  eset hasonlóan nyilvánvaló.
- Egy játékunk van, amit egy polcon „felsorolunk” egyféle fénykép lehetséges (játék pontos helyzete nem lényeges).

# Kis $n$ -ek esete

- Az  $n = 0$  eset nyilvánvaló.
- A sorbaállításokra úgy kell gondolnunk mint egy-egy fénykép. Ha  $n = 0$ , akkor nincs sorbaállítandó tárgy, egyetlen egy fénykép lehetséges: az „üres polc” fényképe (feltettük, hogy a sor egy polcon kerül kialakításra).
- Az  $n = 1$  eset hasonlóan nyilvánvaló.
- Egy játékunk van, amit egy polcon „felsorolunk” egyféle fénykép lehetséges (játék pontos helyzete nem lényeges).
- Az  $n = 2$  eset könnyen meggondolható.

# I. Bizonyítás

# I. Bizonyítás

- Egy sorbaállítás kiválasztását döntések sorozataként fogjuk fel.

# I. Bizonyítás

- Egy sorbaállítás kiválasztását döntések sorozataként fogjuk fel.
- Kiválasztjuk az első pozícióban álló elemet, majd a második pozícióban álló elemet, majd a harmadik pozícióban álló elemet és így tovább.

# I. Bizonyítás

- Egy sorbaállítás kiválasztását döntések sorozataként fogjuk fel.
- Kiválasztjuk az első pozícióban álló elemet, majd a második pozícióban álló elemet, majd a harmadik pozícióban álló elemet és így tovább.
- Az első döntésre  $n$  lehetőségünk van. Az  $1, 2, \dots, n$  számok közül kell egyet kiválasztani, ami azonosít egy tárgyat.

# I. Bizonyítás

- Egy sorbaállítás kiválasztását döntések sorozataként fogjuk fel.
- Kiválasztjuk az első pozícióban álló elemet, majd a második pozícióban álló elemet, majd a harmadik pozícióban álló elemet és így tovább.
- Az első döntésre  $n$  lehetőségünk van. Az  $1, 2, \dots, n$  számok közül kell egyet kiválasztani, ami azonosít egy tárgyat. Mondjuk  $t$  azt jelenti, hogy a koruk szerint rendezett sorban az  $t$ -edik tárgyról van szó.

# I. Bizonyítás

- Egy sorbaállítás kiválasztását döntések sorozataként fogjuk fel.
- Kiválasztjuk az első pozícióban álló elemet, majd a második pozícióban álló elemet, majd a harmadik pozícióban álló elemet és így tovább.
- Az első döntésre  $n$  lehetőségünk van. Az  $1, 2, \dots, n$  számok közül kell egyet kiválasztani, ami azonosít egy tárgyat. Mondjuk  $t$  azt jelenti, hogy a koruk szerint rendezett sorban az  $t$ -edik tárgyról van szó.
- Az  $i$ -edik döntésnél vigyáznunk kell, hogy a korábban már sorbaállított emberekre vonatkozó döntésünkkel ne kerüljünk ellentmondába. Így  $n - (i - 1)$  tárgy közül választhatunk.



# I. Bizonyítás

- Egy sorbaállítás kiválasztását döntések sorozataként fogjuk fel.
- Kiválasztjuk az első pozícióban álló elemet, majd a második pozícióban álló elemet, majd a harmadik pozícióban álló elemet és így tovább.
- Az első döntésre  $n$  lehetőségünk van. Az  $1, 2, \dots, n$  számok közül kell egyet kiválasztani, ami azonosít egy tárgyat. Mondjuk  $t$  azt jelenti, hogy a koruk szerint rendezett sorban az  $t$ -edik tárgyról van szó.
- Az  $i$ -edik döntésnél vigyáznunk kell, hogy a korábban már sorbaállított emberekre vonatkozó döntésünkkel ne kerüljünk ellentmondába. Így  $n - (i - 1)$  tárgy közül választhatunk. Mondjuk  $t \in \{1, 2, \dots, n - i + 1\}$  azt jelenti, hogy a koruk/súlyuk/nevük szerint rendezett sorban az  $t$ -edik EDDIG BE NEM SOROLT tárgyról van szó.

# I. Bizonyítás (folytatás)

# I. Bizonyítás (folytatás)

- Ha így teszünk, akkor ezen választásunk független a korábbiaktól.

# I. Bizonyítás (folytatás)

- Ha így teszünk, akkor ezen választásunk független a korábbiaktól.
- A teljes döntéssorozat ad egy választott sorrendet.

# I. Bizonyítás (folytatás)

- Ha így teszünk, akkor ezen választásunk független a korábbiaktól.
- A teljes döntéssorozat ad egy választott sorrendet.
- A szorzásielv alapján erre  $n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$  lehetőség van.

## II. Bizonyítás

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.



## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között?

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály.

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály. A liberális tornatanáruk tetszőleges sorrendet megenged az órakezdeti tornasornak.

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály. A liberális tornatanáruk tetszőleges sorrendet megenged az órakezdeti tornasornak. Hány lehetőségük van?

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály. A liberális tornatanáruk tetszőleges sorrendet megenged az órakezdeti tornasornak. Hány lehetőségük van? A válaszra vezettük be az  $s_n$  jelölést.

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály. A liberális tornatanáruk tetszőleges sorrendet megenged az órakezdeti tornasornak. Hány lehetőségük van? A válaszra vezettük be az  $s_n$  jelölést.
- Mi történik, ha egy új osztálytárs jelenik meg?

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály. A liberális tornatanáruk tetszőleges sorrendet megenged az órakezdeti tornasornak. Hány lehetőségük van? A válaszra vezettük be az  $s_n$  jelölést.
- Mi történik, ha egy új osztálytárs jelenik meg? Nyilván a lehetőségek száma nő.

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály. A liberális tornatanáruk tetszőleges sorrendet megenged az órakezdeti tornasornak. Hány lehetőségük van? A válaszra vezettük be az  $s_n$  jelölést.
- Mi történik, ha egy új osztálytárs jelenik meg? Nyilván a lehetőségek száma nő. A korábbi sorok mind ott lesznek, de ezekbe be kell szúrunk az új gyereket.



## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály. A liberális tornatanáruk tetszőleges sorrendet megenged az órakezdeti tornasornak. Hány lehetőségük van? A válaszra vezettük be az  $s_n$  jelölést.
- Mi történik, ha egy új osztálytárs jelenik meg? Nyilván a lehetőségek száma nő. A korábbi sorok mind ott lesznek, de ezekbe be kell szúrunk az új gyereket.
- Egy régi sor hány új lehetőséget ad?

## II. Bizonyítás

- Jelölje  $s_n$  az  $n$  tárgy sorbaállításainak számát, azaz az alapkérdésre adandó választ.
- $s_0 = s_1 = 1$ -et tudjuk.
- Mi a kapcsolat  $s_{n+1}$  és  $s_n$  között? Gondoljuk el, hogy van egy  $n$  fős osztály. A liberális tornatanárunk tetszőleges sorrendet megenged az órakezdeti tornasornak. Hány lehetőségük van? A válaszra vezettük be az  $s_n$  jelölést.
- Mi történik, ha egy új osztálytárs jelenik meg? Nyilván a lehetőségek száma nő. A korábbi sorok mind ott lesznek, de ezekbe be kell szúrunk az új gyereket.
- Egy régi sor hány új lehetőséget ad? Hányféleképpen szúrhatunk be egy új elemet egy  $n$  hosszú sorba?

## II. Bizonyítás (folytatás)

## II. Bizonyítás (folytatás)

- A már sorbaálló gyerekek meghatároznak  $n - 1$  közt és ott van az első, illetve utolsó pozíció is mint lehetőség is.

## II. Bizonyítás (folytatás)

- A már sorbaálló gyerekek meghatároznak  $n - 1$  közt és ott van az első, illetve utolsó pozíció is mint lehetőség is. Másképpen a gyerek választhat egy jobb szomszédot ( $n$  lehetőség) és dönthet úgy, hogy a sor jobb oldalára áll.

## II. Bizonyítás (folytatás)

- A már sorbaálló gyerekek meghatároznak  $n - 1$  közt és ott van az első, illetve utolsó pozíció is mint lehetőség is. Másképpen a gyerek választhat egy jobb szomszédot ( $n$  lehetőség) és dönthet úgy, hogy a sor jobb oldalára áll. A beszúrára  $n + 1$  lehetőség van.

## II. Bizonyítás (folytatás)

- A már sorbaálló gyerekek meghatároznak  $n - 1$  közt és ott van az első, illetve utolsó pozíció is mint lehetőség is. Másképpen a gyerek választhat egy jobb szomszédot ( $n$  lehetőség) és dönthet úgy, hogy a sor jobb oldalára áll. A beszúráásra  $n + 1$  lehetőség van.
- Azaz az  $s_n$  mögött álló lista mindegyik eleme  $n + 1$ -szereződik az új listában.

## II. Bizonyítás (folytatás)

- A már sorbaálló gyerekek meghatároznak  $n - 1$  közt és ott van az első, illetve utolsó pozíció is mint lehetőség is. Másképpen a gyerek választhat egy jobb szomszédot ( $n$  lehetőség) és dönthet úgy, hogy a sor jobb oldalára áll. A beszúrára  $n + 1$  lehetőség van.
- Azaz az  $s_n$  mögött álló lista mindegyik eleme  $n + 1$ -szereződik az új listában. Ez azt jelenti az elemszám tekintetében, hogy

$$s_{n+1} = (n + 1)s_n.$$



## II. Bizonyítás (folytatás)

- A már sorbaálló gyerekek meghatároznak  $n - 1$  közt és ott van az első, illetve utolsó pozíció is mint lehetőség is. Másképpen a gyerek választhat egy jobb szomszédot ( $n$  lehetőség) és dönthet úgy, hogy a sor jobb oldalára áll. A beszúrára  $n + 1$  lehetőség van.
- Azaz az  $s_n$  mögött álló lista mindegyik eleme  $n + 1$ -szereződik az új listában. Ez azt jelenti az elemszám tekintetében, hogy

$$s_{n+1} = (n + 1)s_n.$$

- A bizonyítást egy „unalmas” teljes indukció zárhatja.

# Egy Általánosított feladat

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot.

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett.

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk:

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba?



# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba?

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba? És így tovább.

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba? És így tovább.
- Az első döntésre  $n$  kimenet lehet.

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba? És így tovább.
- Az első döntésre  $n$  kimenet lehet. Az  $i$ -edik döntésnél  $i - 1$  pozícióba már elhelyeztünk tárgyakat. Így  $n - i + 1$  lehetőség közül választhatunk.

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba? És így tovább.
- Az első döntésre  $n$  kimenet lehet. Az  $i$ -edik döntésnél  $i - 1$  pozícióba már elhelyeztünk tárgyakat. Így  $n - i + 1$  lehetőség közül választhatunk.
- A válasz egy  $k$  tényezős szorzat.

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba? És így tovább.
- Az első döntésre  $n$  kimenet lehet. Az  $i$ -edik döntésnél  $i - 1$  pozícióba már elhelyeztünk tárgyakat. Így  $n - i + 1$  lehetőség közül választhatunk.
- A válasz egy  $k$  tényezős szorzat. Az első tényező  $n$ ,

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba? És így tovább.
- Az első döntésre  $n$  kimenet lehet. Az  $i$ -edik döntésnél  $i - 1$  pozícióba már elhelyeztünk tárgyakat. Így  $n - i + 1$  lehetőség közül választhatunk.
- A válasz egy  $k$  tényezős szorzat. Az első tényező  $n$ , majd mindegyik tényező 1-gyel kevesebb.

# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba? És így tovább.
- Az első döntésre  $n$  kimenet lehet. Az  $i$ -edik döntésnél  $i - 1$  pozícióba már elhelyeztünk tárgyakat. Így  $n - i + 1$  lehetőség közül választhatunk.
- A válasz egy  $k$  tényezős szorzat. Az első tényező  $n$ , majd mindegyik tényező 1-gyel kevesebb. Formulával:



# Egy Általánosított feladat

## Feladat

Egy dobozban tartunk  $n$  különböző plüssállatot. Ágyunk felett egy polc van, amelyen  $k$  állat fér el egymás mellett. Hányféleképpen rakhatjuk tele a polcunkat plüssállatokkal?

- Reméljük a feladat a korábbiak alapján nem túl nehéz.
- $k$  döntést kell meghoznunk: Melyik állatot rakjuk az első pozícióba? Melyik állatot rakjuk a második pozícióba? És így tovább.
- Az első döntésre  $n$  kimenet lehet. Az  $i$ -edik döntésnél  $i - 1$  pozícióba már elhelyeztünk tárgyakat. Így  $n - i + 1$  lehetőség közül választhatunk.
- A válasz egy  $k$  tényezős szorzat. Az első tényező  $n$ , majd mindegyik tényező 1-gyel kevesebb. Formulával:

$$n(n - 1) \dots (n - k + 1).$$

# A „Kontorlált túlszámolás” elve

# A „Kontorlált túlszámolás” elve

- Listázzuk a megoldásokat kis  $n, k$  esetén.

# A „Kontorlált túlszámolás” elve

- Listázzuk a megoldásokat kis  $n, k$  esetén. Minden megoldásnál egy-egy  $k$ -elemű plusállat-halmazt is látunk (a sorrendet ezzel „elfelejtjük”).

# A „Kontorlált túlszámolás” elve

- Listázzuk a megoldásokat kis  $n, k$  esetén. Minden megoldásnál egy-egy  $k$ -elemű plüszállat-halmazt is látunk (a sorrendet ezzel „elfelejtjük”).
- A  $k$ -elemű részhalmazok számára  $n(n-1)\dots(n-k+1)$  egy rossz megoldás (feltesszük, hogy  $k > 1$ ).

# A „Kontorlált túlszámolás” elve

- Listázzuk a megoldásokat kis  $n, k$  esetén. Minden megoldásnál egy-egy  $k$ -elemű plusállat-halmazt is látunk (a sorrendet ezzel „elfelejtjük”).
- A  $k$ -elemű részhalmazok számára  $n(n-1)\dots(n-k+1)$  egy rossz megoldás (feltesszük, hogy  $k > 1$ ). Minden részhalmazt látunk, de többször is amennyiben végigpásztázunk a feladat lehetőségeit felsoroló listát.

# A „Kontorlált túlszámolás” elve

- Listázzuk a megoldásokat kis  $n, k$  esetén. Minden megoldásnál egy-egy  $k$ -elemű plüszállat-halmazt is látunk (a sorrendet ezzel „elfelejtjük”).
- A  $k$ -elemű részhalmazok számára  $n(n-1)\dots(n-k+1)$  egy rossz megoldás (feltesszük, hogy  $k > 1$ ). Minden részhalmazt látunk, de többször is amennyiben végigpásztázunk a feladat lehetőségeit felsoroló listát. A formula egy túlszámolás eredménye.

# A „Kontorlált túlszámolás” elve

- Listázzuk a megoldásokat kis  $n, k$  esetén. Minden megoldásnál egy-egy  $k$ -elemű plüszállat-halmazt is látunk (a sorrendet ezzel „elfelejtjük”).
- A  $k$ -elemű részhalmazok számára  $n(n-1)\dots(n-k+1)$  egy rossz megoldás (feltesszük, hogy  $k > 1$ ). Minden részhalmazt látunk, de többször is amennyiben végigpásztázunk a feladat lehetőségeit felsoroló listát. A formula egy túlszámolás eredménye.
- Azonban minden részhalmaz pontosan  $k!$  sokszor szerepel a listán.



# A „Kontorlált túlszámolás” elve

- Listázzuk a megoldásokat kis  $n, k$  esetén. Minden megoldásnál egy-egy  $k$ -elemű plüszállat-halmazt is látunk (a sorrendet ezzel „elfelejtjük”).
- A  $k$ -elemű részhalmazok számára  $n(n-1)\dots(n-k+1)$  egy rossz megoldás (feltesszük, hogy  $k > 1$ ). Minden részhalmazt látunk, de többször is amennyiben végigpásztázunk a feladat lehetőségeit felsoroló listát. A formula egy túlszámolás eredménye.
- Azonban minden részhalmaz pontosan  $k!$  sokszor szerepel a listán. Azaz túlszámolásunk „szabályos”.

# A „Kontorlált túlszámolás” elve

- Listázzuk a megoldásokat kis  $n$ ,  $k$  esetén. Minden megoldásnál egy-egy  $k$ -elemű plüszállat-halmazt is látunk (a sorrendet ezzel „elfelejtjük”).
- A  $k$ -elemű részhalmazok számára  $n(n-1)\dots(n-k+1)$  egy rossz megoldás (feltesszük, hogy  $k > 1$ ). Minden részhalmazt látunk, de többször is amennyiben végigpásztázunk a feladat lehetőségeit felsoroló listát. A formula egy túlszámolás eredménye.
- Azonban minden részhalmaz pontosan  $k!$  sokszor szerepel a listán. Azaz túlszámolásunk „szabályos”.

## Egyszerű alapelv

Ha egy  $\widehat{\mathcal{L}}$  listában egy  $\mathcal{L}$  elemei szerepelnek úgy  $\mathcal{L}$  minden eleme pontosan  $s$ -szer szerepel, akkor

$$|\mathcal{L}| = \frac{|\widehat{\mathcal{L}}|}{s}.$$

# Újra a binomiális együtthatók

# Újra a binomiális együtthatók

## Tétel

$$\binom{n}{k} =$$

# Újra a binomiális együtthatók

## Tétel

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+2)(n-k+1)}{k(k-1)\dots 2 \cdot 1} =$$

# Újra a binomiális együtthatók

## Tétel

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+2)(n-k+1)}{k(k-1)\dots 2 \cdot 1} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

## Szünet



# Bevezető feladat



# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvódás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvódás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”.

# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvodás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”. Lehetséges, hogy egy csoportba egy gyerek kerül. Ő is alkothat kört.

# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvodás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”. Lehetséges, hogy egy csoportba egy gyerek kerül. Ő is alkothat kört. Bal és jobb szomszédja is önmaga.

# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvodás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”. Lehetséges, hogy egy csoportba egy gyerek kerül. Ő is alkothat kört. Bal és jobb szomszédja is önmaga. Két gyerek is alkothat kört.

# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvodás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”. Lehetséges, hogy egy csoportba egy gyerek kerül. Ő is alkothat kört. Bal és jobb szomszédja is önmaga. Két gyerek is alkothat kört. Ekkor mindkettőnek ugyanaz lesz a bal, illetve jobb szomszédja: a másik gyerek.

# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvodás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”. Lehetséges, hogy egy csoportba egy gyerek kerül. Ő is alkothat kört. Bal és jobb szomszédja is önmaga. Két gyerek is alkothat kört. Ekkor mindkettőnek ugyanaz lesz a bal, illetve jobb szomszédja: a másik gyerek.
- A feladat tapasztalatom szerint nehéz, a legtöbb diák nem tud vele mit kezdeni.

# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvodás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”. Lehetséges, hogy egy csoportba egy gyerek kerül. Ő is alkothat kört. Bal és jobb szomszédja is önmaga. Két gyerek is alkothat kört. Ekkor mindkettőnek ugyanaz lesz a bal, illetve jobb szomszédja: a másik gyerek.
- A feladat tapasztalatom szerint nehéz, a legtöbb diák nem tud vele mit kezdeni. Középiskolában ilyenről nem hallottak (szemben a sorbaállítási feladattal, amely alapfeladat).



# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvodás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”. Lehetséges, hogy egy csoportba egy gyerek kerül. Ő is alkothat kört. Bal és jobb szomszédja is önmaga. Két gyerek is alkothat kört. Ekkor mindkettőnek ugyanaz lesz a bal, illetve jobb szomszédja: a másik gyerek.
- A feladat tapasztalatom szerint nehéz, a legtöbb diák nem tud vele mit kezdeni. Középiskolában ilyenről nem hallottak (szemben a sorbaállítási feladattal, amely alapfeladat).
- Az érdeklődő hallgató sorolja fel a lehetőségeket  $n = 3, 4$  esetén.

# Bevezető feladat

## Feladat

$n$  óvodás játszik az udvaron körjátékot. Csoportokba osztódnak és minden csoport egy-egy kört alkot. Egy körben mindenkinek lesz bal és jobb szomszédja. Hány lehetőségük van a játékra?

- Kiemelünk két speciális „kört”. Lehetséges, hogy egy csoportba egy gyerek kerül. Ő is alkothat kört. Bal és jobb szomszédja is önmaga. Két gyerek is alkothat kört. Ekkor mindkettőnek ugyanaz lesz a bal, illetve jobb szomszédja: a másik gyerek.
- A feladat tapasztalatom szerint nehéz, a legtöbb diák nem tud vele mit kezdeni. Középiskolában ilyenről nem hallottak (szemben a sorbaállítási feladattal, amely alapfeladat).
- Az érdeklődő hallgató sorolja fel a lehetőségeket  $n = 3, 4$  esetén.
- A feladatot egyelőre hagyjuk és továbbhaladunk.

# Átrendezések: Definíció

# Átrendezések: Definíció

## Definíció

Egy  $H$  halmaz átrendezésén egy

$$\pi : H \rightarrow H$$

bijekciót értünk.

# Átrendezések: Definíció

## Definíció

Egy  $H$  halmaz átrendezésén egy

$$\pi : H \rightarrow H$$

bijekciót értünk.

- Az átrendezést is interpretálhatjuk a sorbaállítás matematikai definíciójának logikájával.

# Átrendezések: Definíció

## Definíció

Egy  $H$  halmaz átrendezésén egy

$$\pi : H \rightarrow H$$

bijekciót értünk.

- Az átrendezést is interpretálhatjuk a sorbaállítás matematikai definíciójának logikájával. Adott  $n$  tárgy egy szobában.

# Átrendezések: Definíció

## Definíció

Egy  $H$  halmaz átrendezésén egy

$$\pi : H \rightarrow H$$

bijekciót értünk.

- Az átrendezést is interpretálhatjuk a sorbaállítás matematikai definíciójának logikájával. Adott  $n$  tárgy egy szobában. Mindegyiknek van egy pozíciója és mindegyik egy-egy tárgy is.

# Átrendezések: Definíció

## Definíció

Egy  $H$  halmaz átrendezésén egy

$$\pi : H \rightarrow H$$

bijekciót értünk.

- Az átrendezést is interpretálhatjuk a sorbaállítás matematikai definíciójának logikájával. Adott  $n$  tárgy egy szobában. Mindegyiknek van egy pozíciója és mindegyik egy-egy tárgy is.
- $H = \{E, K, Zs\}$  esetén ha  $E \in H$ , akkor olvasható úgy is, hogy  $E$  egy tárgy, az elefánt játék és úgy is, hogy „ $E$  helye”, egy pozíció.



# Átrendezések: Definíció

## Definíció

Egy  $H$  halmaz átrendezésén egy

$$\pi : H \rightarrow H$$

bijekciót értünk.

- Az átrendezést is interpretálhatjuk a sorbaállítás matematikai definíciójának logikájával. Adott  $n$  tárgy egy szobában. Mindegyiknek van egy pozíciója és mindegyik egy-egy tárgy is.
- $H = \{E, K, Zs\}$  esetén ha  $E \in H$ , akkor olvasható úgy is, hogy  $E$  egy tárgy, az elefánt játék és úgy is, hogy „ $E$  helye”, egy pozíció.
- az  $E \mapsto K$  olvasható úgy is, hogy a Kutya az Elefánt helyére kerül.

# Átrendezések: Definíció

## Definíció

Egy  $H$  halmaz átrendezésén egy

$$\pi : H \rightarrow H$$

bijekciót értünk.

- Az átrendezést is interpretálhatjuk a sorbaállítás matematikai definíciójának logikájával. Adott  $n$  tárgy egy szobában. Mindegyiknek van egy pozíciója és mindegyik egy-egy tárgy is.
- $H = \{E, K, Zs\}$  esetén ha  $E \in H$ , akkor olvasható úgy is, hogy  $E$  egy tárgy, az elefánt játék és úgy is, hogy „ $E$  helye”, egy pozíció.
- az  $E \mapsto K$  olvasható úgy is, hogy a Kutya az Elefánt helyére kerül. Ez megmagyarázza az elnevezést.

# Átrendezések: Az alapkérdés

# Átrendezések: Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $S(H)$  a  $H$  halmaz átrendezéseinek halmaza.

# Átrendezések: Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $S(H)$  a  $H$  halmaz átrendezéseinek halmaza.

- Az alapkérdés: Legyen  $H$  egy  $n$  elemű halmaz. Határozzuk meg  $|S(H)|$ -t.

# Átrendezések: Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $S(H)$  a  $H$  halmaz átrendezéseinek halmaza.

- Az alapkérdés: Legyen  $H$  egy  $n$  elemű halmaz. Határozzuk meg  $|S(H)|$ -t. Speciálisabban: Határozzuk meg  $|S([n])|$ -t.

# Átrendezések: Az alapkérdés

## Jelölés

Legyen  $S(H)$  a  $H$  halmaz átrendezéseinek halmaza.

- Az alapkérdés: Legyen  $H$  egy  $n$  elemű halmaz. Határozzuk meg  $|S(H)|$ -t. Speciálisabban: Határozzuk meg  $|S([n])|$ -t.
- $S([n])$ -re használatos az  $S_n$  jelölés is.()

# Átrendezések és sorbaállítások



# Átrendezések és sorbaállítások

- Persze ha van egy alapsorbaállítása a  $H$  halmaznak, akkor  $H$  minden sorbaállítás értelmezhető átrendezésnek is.

# Átrendezések és sorbaállítások

- Persze ha van egy alapsorbaállítása a  $H$  halmaznak, akkor  $H$  minden sorbaállítás értelmezhető átrendezésnek is.
- Ha  $H$  elhelyezkedése egy sorban történik, akkor az átrendezés egy sorbállításához vezet/azzal írható le.

# Átrendezések és sorbaállítások

- Persze ha van egy alapsorbaállítás a  $H$  halmaznak, akkor  $H$  minden sorbaállítás értelmezhető átrendezésnek is.
- Ha  $H$  elhelyezkedése egy sorban történik, akkor az átrendezés egy sorbállításához vezet/azzal írható le.

## Észrevétel

$$\sigma(H) \sim S(H).$$

# Átrendezések és sorbaállítások

- Persze ha van egy alapsorbaállítása a  $H$  halmaznak, akkor  $H$  minden sorbaállítás értelmezhető átrendezésnek is.
- Ha  $H$  elhelyezkedése egy sorban történik, akkor az átrendezés egy sorbállításhoz vezet/azzal írható le.

## Észrevétel

$$\sigma(H) \sim S(H).$$

## Megállapodás

Ha nem akarjuk lerögzíteni, hogy sorbaállításként vagy átrendezésként beszélünk egy  $S(H) \sim \sigma(H)$  elemről, akkor permutációt mondunk.

## Permutatio: 1845

*Permove*re, reábirni.

*Permutatio*, csere; *cambialis permutatio*, viszonylagos csere; *permutare*, cserélni.

*Pernicies*, veszedelem.

# Permutatio: internet

## Latin

**permutatio**

noun  
onis F

## Magyar

cseré

főnév

kicserélés

főnév

pénzforgalom

főnév

változás

főnév

változtatás

főnév

# Átrendezések: Miért?

# Átrendezések: Miért?

- Látni fogjuk, hogy átrendezések illetve sorbaállítások vizsgálata más nyelvezethez vezet.



# Átrendezések: Miért?

- Látni fogjuk, hogy átrendezések illetve sorbaállítások vizsgálata más nyelvezethez vezet.
- Másrészt van egy óriási előnye az átrendezéseknek:

# Átrendezések: Miért?

- Látni fogjuk, hogy átrendezések illetve sorbaállítások vizsgálata más nyelvezethez vezet.
- Másrészt van egy óriási előnye az átrendezéseknek: két átrendezés egymásután végrehajtható (a matematikusok — megfelelő analógiák miatt — azt mondják szorozhatók).

# Átrendezések: Miért?

- Látni fogjuk, hogy átrendezések illetve sorbaállítások vizsgálata más nyelvezethez vezet.
- Másrészt van egy óriási előnye az átrendezéseknek: két átrendezés egymásután végrehajtható (a matematikusok — megfelelő analógiák miatt — azt mondják szorozhatók).
- Tegyük fel, hogy egy  $\pi$  első átrendezésben  $E \mapsto K$  és egy  $\rho$  második átrendezésben  $K \mapsto Z$ s.

# Átrendezések: Miért?

- Látni fogjuk, hogy átrendezések illetve sorbaállítások vizsgálata más nyelvezethez vezet.
- Másrészt van egy óriási előnye az átrendezéseknek: két átrendezés egymásután végrehajtható (a matematikusok — megfelelő analógiák miatt — azt mondják szorozhatók).
- Tegyük fel, hogy egy  $\pi$  első átrendezésben  $E \mapsto K$  és egy  $\rho$  második átrendezésben  $K \mapsto Z$ s. Azaz először a Kutya az Elefánt helyére kerül, majd a Zsiráf a Kutya helyére kerül.

# Átrendezések: Miért?

- Látni fogjuk, hogy átrendezések illetve sorbaállítások vizsgálata más nyelvezethez vezet.
- Másrészt van egy óriási előnye az átrendezéseknek: két átrendezés egymásután végrehajtható (a matematikusok — megfelelő analógiák miatt — azt mondják szorozhatók).
- Tegyük fel, hogy egy  $\pi$  első átrendezésben  $E \mapsto K$  és egy  $\rho$  második átrendezésben  $K \mapsto Z$ s. Azaz először a Kutya az Elefánt helyére kerül, majd a Zsiráf a Kutya helyére kerül.
- Akkor azt egy  $E \mapsto Z$ s utasítással is kifejezhetjük.

# Átrendezések: Miért?

- Látni fogjuk, hogy átrendezések illetve sorbaállítások vizsgálata más nyelvezethez vezet.
- Másrészt van egy óriási előnye az átrendezéseknek: két átrendezés egymásután végrehajtható (a matematikusok — megfelelő analógiák miatt — azt mondják szorozhatók).
- Tegyük fel, hogy egy  $\pi$  első átrendezésben  $E \mapsto K$  és egy  $\rho$  második átrendezésben  $K \mapsto Z$ s. Azaz először a Kutya az Elefánt helyére kerül, majd a Zsiráf a Kutya helyére kerül.
- Akkor azt egy  $E \mapsto Z$ s utasítással is kifejezhetjük.
- Azaz két átrendezés szorzata a megfelelő, őket leíró matematikai függvények/leképezések/bijekciók kompozíciója.

# Átrendezések diagramja

# Átrendezések diagramja

## Definíció

Legyen  $\pi : H \rightarrow H$  egy átrendezés.  $\pi$  diagramja a következő ábra:  
 $H$  elemeit egy-egy karika jelképezi. Minden  $h \mapsto h'$  hozzárendeléshez tartozik egy „nyíl”, amely  $h$  karikájából  $h'$  karikájához vezet.




# Átrendezések láttatása

# Átrendezések láttatása

Példa

# Átrendezések láttatása


## Példa



Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Az összes átrendezésük diagramjaik lerajzolásával.

# Átrendezések láttatása

## Példa



Legyen  $H = \{E, K, Zs\}$ . Az összes átrendezésük diagramjaik lerajzolásával.

- Talán meglepetés, hogy a három tárgy körbeállításait látjuk magunk előtt. Ez nem véletlen.

# Egy átrendezés diagramjának tulajdonságai és egy Tétel

# Egy átrendezés diagramjának tulajdonságai és egy Tétel

- Ha  $H$  egy  $n$  elemű halmaz, akkor  $H$  egy tetszőleges átrendezését leíró diagram  $n$  karikát és  $n$  nyilat tartalmaz.

# Egy átrendezés diagramjának tulajdonságai és egy Tétel

- Ha  $H$  egy  $n$  elemű halmaz, akkor  $H$  egy tetszőleges átrendezését leíró diagram  $n$  karikát és  $n$  nyilat tartalmaz.
- Minden karikából egy nyíl halad ki.

# Egy átrendezés diagramjának tulajdonságai és egy Tétel

- Ha  $H$  egy  $n$  elemű halmaz, akkor  $H$  egy tetszőleges átrendezését leíró diagram  $n$  karikát és  $n$  nyilat tartalmaz.
- Minden karikából egy nyíl halad ki.
- Minden karikába egy nyíl fut be.



# Egy átrendezés diagramjának tulajdonságai és egy Tétel

- Ha  $H$  egy  $n$  elemű halmaz, akkor  $H$  egy tetszőleges átrendezését leíró diagram  $n$  karikát és  $n$  nyilat tartalmaz.
- Minden karikából egy nyíl halad ki.
- Minden karikába egy nyíl fut be.

## Tétel

Ha  $n$  karika és köztük haladó  $n$  nyíl diagramja olyan, hogy

- (1) minden karikából egy nyíl indul ki,
- (2) minden karikába egy nyíl fut be,

akkor a diagram karikái csoportosíthatók úgy, hogy minden nyíl egy csoporton belül haladjon és a csoporton belüli nyílak egy körbe rendezzék a csoport elemeit.

# A Tétel „magyarázata”

# A Tétel „magyarázata”

- A tételbeli csoportosítás egy csoportját és a köztük haladó nyilakat az átrendezés ciklusának nevezzük.

# A Tétel „magyarázata”

- A tételbeli csoportosítás egy csoportját és a köztük haladó nyilakat az átrendezés ciklusának nevezzük.
- Az ilyen átrendezéseket példaként fel is hozhattuk volna: Tárgyaink köralakú asztal mellett ülnek. „Mindenki a jobb szomszédja helyére kerül” egy átrendezés.

# A Tétel „magyarázata”

- A tételbeli csoportosítás egy csoportját és a köztük haladó nyilakat az átrendezés ciklusának nevezzük.
- Az ilyen átrendezéseket példaként fel is hozhattuk volna: Tárgyaink köralakú asztal mellett ülnek. „Mindenki a jobb szomszédja helyére kerül” egy átrendezés.
- A tétel szerint ennek a példának a „több asztalos változata” egy univerzális példa: minden átrendezés esetén felismerhetők/beleláthatók az asztaltársaságok és az asztalok melletti ülésrend.

# A Tétel bizonyítása: Egy ciklus felismerése

# A Tétel bizonyítása: Egy ciklus felismerése

- Nézzünk a diagramra mint egy térképre, ahol a karikák a csomópontok, a nyílak egyirányú utcák.

# A Tétel bizonyítása: Egy ciklus felismerése

- Nézzünk a diagramra mint egy térképre, ahol a karikák a csomópontok, a nyílak egyirányú utcák.
- Egy csomópontból kezdjük el utazni az egy irányú utcák szabályának betartásával.



# A Tétel bizonyítása: Egy ciklus felismerése

- Nézzünk a diagramra mint egy térképre, ahol a karikák a csomópontok, a nyílak egyirányú utcák.
- Egy csomópontból kezdjük el utazni az egy irányú utcák szabályának betartásával. Mindegyik csomópontból egyetlen utca indul ki.

# A Tétel bizonyítása: Egy ciklus felismerése

- Nézzünk a diagramra mint egy térképre, ahol a karikák a csomópontok, a nyílak egyirányú utcák.
- Egy csomópontból kezdjük el utazni az egy irányú utcák szabályának betartásával. Mindegyik csomópontból egyetlen utca indul ki. Utunk egyértelmű és sose akad el.

# A Tétel bizonyítása: Egy ciklus felismerése

- Nézzünk a diagramra mint egy térképre, ahol a karikák a csomópontok, a nyílak egyirányú utcák.
- Egy csomópontból kezdjük el utazni az egy irányú utcák szabályának betartásával. Mindegyik csomópontból egyetlen utca indul ki. Utunk egyértelmű és sose akad el.
- Valamikor csomópontot kell ismételnünk.

# A Tétel bizonyítása: Egy ciklus felismerése

- Nézzünk a diagramra mint egy térképre, ahol a karikák a csomópontok, a nyílak egyirányú utcák.
- Egy csomópontból kezdjük el utazni az egy irányú utcák szabályának betartásával. Mindegyik csomópontból egyetlen utca indul ki. Utunk egyértelmű és sose akad el.
- Valamikor csomópontot kell ismételnünk. Először ez szükségszerűen a kiinduló pont lesz. (Miért?)

# A Tétel bizonyítása: Egy ciklus felismerése

- Nézzünk a diagramra mint egy térképre, ahol a karikák a csomópontok, a nyílak egyirányú utcák.
- Egy csomópontból kezdjük el utazni az egy irányú utcák szabályának betartásával. Mindegyik csomópontból egyetlen utca indul ki. Utunk egyértelmű és sose akad el.
- Valamikor csomópontot kell ismételnünk. Először ez szükségszerűen a kiinduló pont lesz. (Miért?)
- Ezzel egy ciklust azonosítottunk.

# A Tétel bizonyítása: A befejezés

# A Tétel bizonyítása: A befejezés

- Ha ez a teljes diagram, akkor készen vagyunk.

# A Tétel bizonyítása: A befejezés

- Ha ez a teljes diagram, akkor készen vagyunk.
- Ha nem, akkor lesznek maradék karikák.



# A Tétel bizonyítása: A befejezés

- Ha ez a teljes diagram, akkor készen vagyunk.
- Ha nem, akkor lesznek maradék karikák. Ezek és a ciklusban lévő karikák között nincs nyíl:

# A Tétel bizonyítása: A befejezés

- Ha ez a teljes diagram, akkor készen vagyunk.
- Ha nem, akkor lesznek maradék karikák. Ezek és a ciklusban lévő karikák között nincs nyíl: A ciklus elszámolja a ciklus csúcspontjaiba befutó és onnan kifutó egyetlen nyílat.

# A Tétel bizonyítása: A befejezés

- Ha ez a teljes diagram, akkor készen vagyunk.
- Ha nem, akkor lesznek maradék karikák. Ezek és a ciklusban lévő karikák között nincs nyíl: A ciklus elszámolja a ciklus csúcspontjaiba befutó és onnan kifutó egyetlen nyílat.
- Így a maradék karikák függetlenül kezelhetők a megtalált ciklustól.

# A Tétel bizonyítása: A befejezés

- Ha ez a teljes diagram, akkor készen vagyunk.
- Ha nem, akkor lesznek maradék karikák. Ezek és a ciklusban lévő karikák között nincs nyíl: A ciklus elszámolja a ciklus csúcspontjaiba befutó és onnan kifutó egyetlen nyílat.
- Így a maradék karikák függetlenül kezelhetők a megtalált ciklustól.
- Ugyanezzel az eljárással újabb ciklust találhatunk meg, egészen addig míg ki nem merítjük az összes csomópontot.

# A Tétel bizonyítása: A befejezés

- Ha ez a teljes diagram, akkor készen vagyunk.
- Ha nem, akkor lesznek maradék karikák. Ezek és a ciklusban lévő karikák között nincs nyíl: A ciklus elszámolja a ciklus csúcspontjaiba befutó és onnan kifutó egyetlen nyílat.
- Így a maradék karikák függetlenül kezelhetők a megtalált ciklustól.
- Ugyanezzel az eljárással újabb ciklust találhatunk meg, egészen addig míg ki nem merítjük az összes csomópontot.
- Ekkor az összes karikát besoroltuk egy-egy ciklusba, amelyek csoportosítják pontjainkat.

# A tétel

# A tétel

## Tétel

Egy  $n$  elemű halmaznak  $n!$  átrendezése van.

# A tétel

## Tétel

Egy  $n$  elemű halmaznak  $n!$  átrendezése van. Azaz  $H$  véges halmazra

$$S(H) = |H|!.$$



# A tétel

## Tétel

Egy  $n$  elemű halmaznak  $n!$  átrendezése van. Azaz  $H$  véges halmazra

$$S(H) = |H|!.$$

- Ezzel az óvodásokra vonatkozó feladatot is megoldottuk.

# I. Bizonyítás (ismétlés)

# I. Bizonyítás (ismétlés)

- Rögzítsük le a  $H$  halmaz egy alapsorrendjét.

# I. Bizonyítás (ismétlés)

- Rögzítsük le a  $H$  halmaz egy alapsorrendjét.
- Ekkor minden sorbarendezeése  $H$ -nak egy átrendezése az alapsorrendnek.

# I. Bizonyítás (ismétlés)

- Rögzítsük le a  $H$  halmaz egy alapsorrendjét.
- Ekkor minden sorbarendeze  $H$ -nak egy átrendezése az alapsorrendnek.
- Ekkor az alapsorrend minden átrendezése egy sorbaállítás  $H$ -nak.

# I. Bizonyítás (ismétlés)

- Rögzítsük le a  $H$  halmaz egy alapsorrendjét.
- Ekkor minden sorbarendezeése  $H$ -nak egy átrendezése az alapsorrendnek.
- Ekkor az alapsorrend minden átrendezése egy sorbaállítása  $H$ -nak.
- Fent leírtunk egy bijekciót  $S(H)$  és  $\sigma(H)$  közt.

# I. Bizonyítás (ismétlés)

- Rögzítsük le a  $H$  halmaz egy alapsorrendjét.
- Ekkor minden sorbarendezeése  $H$ -nak egy átrendezése az alapsorrendnek.
- Ekkor az alapsorrend minden átrendezése egy sorbaállítása  $H$ -nak.
- Fent leírtunk egy bijekciót  $S(H)$  és  $\sigma(H)$  közt.
- Speciálisan  $|S(H)| = |\sigma(H)|$ .

# I. Bizonyítás (ismétlés)

- Rögzítsük le a  $H$  halmaz egy alapsorrendjét.
- Ekkor minden sorbarendezeése  $H$ -nak egy átrendezése az alapsorrendnek.
- Ekkor az alapsorrend minden átrendezése egy sorbaállítása  $H$ -nak.
- Fent leírtunk egy bijekciót  $S(H)$  és  $\sigma(H)$  közt.
- Speciálisan  $|S(H)| = |\sigma(H)|$ .
- Tudjuk, hogy  $|\sigma(H)| = n!$ .



## II. Bizonyítás (ismétlés)

## II. Bizonyítás (ismétlés)

- Megismételhetjük a sorbaállításoknál megismert gondolatmenetet:

## II. Bizonyítás (ismétlés)

- Megismételhetjük a sorbaállításoknál megismert gondolatmenetet:
- Legyen  $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ .

## II. Bizonyítás (ismétlés)

- Megismételhetjük a sorbaállításoknál megismert gondolatmenetet:
- Legyen  $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ . Egy átrendezés leírását  $n$  döntés meghozatalaként fogjuk fel:

## II. Bizonyítás (ismétlés)

- Megismételhetjük a sorbaállításoknál megismert gondolatmenetet:
- Legyen  $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ . Egy átrendezés leírását  $n$  döntés meghozatalaként fogjuk fel:
- Mi legyen a képe  $h_1$ -nek?

## II. Bizonyítás (ismétlés)

- Megismételhetjük a sorbaállításoknál megismert gondolatmenetet:
- Legyen  $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ . Egy átrendezés leírását  $n$  döntés meghozatalaként fogjuk fel:
- Mi legyen a képe  $h_1$ -nek? Mi legyen a képe  $h_1$ -nek?

## II. Bizonyítás (ismétlés)

- Megismételhetjük a sorbaállításoknál megismert gondolatmenetet:
- Legyen  $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ . Egy átrendezés leírását  $n$  döntés meghozatalaként fogjuk fel:
- Mi legyen a képe  $h_1$ -nek? Mi legyen a képe  $h_1$ -nek? És így tovább.

## II. Bizonyítás (ismétlés)

- Megismételhetjük a sorbaállításoknál megismert gondolatmenetet:
- Legyen  $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ . Egy átrendezés leírását  $n$  döntés meghozatalaként fogjuk fel:
- Mi legyen a képe  $h_1$ -nek? Mi legyen a képe  $h_1$ -nek? És így tovább.
- A gondolatmenet további leírása jó gyakorlás az érdeklődő hallgatónak.



# III. Bizonyítás

### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.)

### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.) A lehetőségek számát jelölje  $a_n$ .

### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.) A lehetőségek számát jelölje  $a_n$ .
- Hogyan változik ez, ha egy új gyerek csatlakozik hozzájuk?

### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.) A lehetőségek számát jelölje  $a_n$ .
- Hogyan változik ez, ha egy új gyerek csatlakozik hozzájuk?
- Az új lehetőségek mind felfoghatók úgy, mint egy régi körjáték, amelybe az új gyerek „beszúrja magát”.

### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.) A lehetőségek számát jelölje  $a_n$ .
- Hogyan változik ez, ha egy új gyerek csatlakozik hozzájuk?
- Az új lehetőségek mind felfoghatók úgy, mint egy régi körjáték, amelybe az új gyerek „beszúrja magát”. Hányféleképpen teheti ezt meg?

### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.) A lehetőségek számát jelölje  $a_n$ .
- Hogyan változik ez, ha egy új gyerek csatlakozik hozzájuk?
- Az új lehetőségek mind felfoghatók úgy, mint egy régi körjáték, amelybe az új gyerek „beszúrja magát”. Hányféleképpen teheti ezt meg?
- Választhat egy jobb szomszédot a régiek közül ( $n$  lehetőség),

### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.) A lehetőségek számát jelölje  $a_n$ .
- Hogyan változik ez, ha egy új gyerek csatlakozik hozzájuk?
- Az új lehetőségek mind felfoghatók úgy, mint egy régi körjáték, amelybe az új gyerek „beszúrja magát”. Hányféleképpen teheti ezt meg?
- Választhat egy jobb szomszédot a régiek közül ( $n$  lehetőség), vagy alkothat külön kört (ekkor jobb szomszédja önmaga lesz).



### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.) A lehetőségek számát jelölje  $a_n$ .
- Hogyan változik ez, ha egy új gyerek csatlakozik hozzájuk?
- Az új lehetőségek mind felfoghatók úgy, mint egy régi körjáték, amelybe az új gyerek „beszúrja magát”. Hányféleképpen teheti ezt meg?
- Választhat egy jobb szomszédot a régiek közül ( $n$  lehetőség), vagy alkothat külön kört (ekkor jobb szomszédja önmaga lesz).
- Végeredményben a bővített  $n + 1$  óvodás halmazából kell egy gyereket választani:  $n + 1$  lehetőség. Azaz  $a_{n+1} = (n + 1)a_n$ .

### III. Bizonyítás

- $n$  óvodás körjátékot játszik. (Lásd bevezető feladat.) A lehetőségek számát jelölje  $a_n$ .
- Hogyan változik ez, ha egy új gyerek csatlakozik hozzájuk?
- Az új lehetőségek mind felfoghatók úgy, mint egy régi körjáték, amelybe az új gyerek „beszúrja magát”. Hányféleképpen teheti ezt meg?
- Választhat egy jobb szomszédot a régiek közül ( $n$  lehetőség), vagy alkothat külön kört (ekkor jobb szomszédja önmaga lesz).
- Végeredményben a bővített  $n + 1$  óvodás halmazából kell egy gyereket választani:  $n + 1$  lehetőség. Azaz  $a_{n+1} = (n + 1)a_n$ .
- Az „unalmas” indukció zárja a bizonyítást.

# Új? kérdések

# Új? kérdések

## Feladat

Hányféleképpen ültethető le 25 gyerek egy nézőtéren, ahol 5 sor mindegyikében 5 szék van?

# Új? kérdések

## Feladat

Hányféleképpen ültethető le 25 gyerek egy nézőtéren, ahol 5 sor mindegyikében 5 szék van?

- Először talán zavaró lehet, hogy egy 2-dimenziós pozíció halmaz és a gyerekek közt kell egy bijekciót találni.

# Új? kérdések

## Feladat

Hányféleképpen ültethető le 25 gyerek egy nézőtéren, ahol 5 sor mindegyikében 5 szék van?

- Először talán zavaró lehet, hogy egy 2-dimenziós pozíció halmaz és a gyerekek közt kell egy bijekciót találni.

# Új? kérdések

## Feladat

Hányféleképpen ültethető le 25 gyerek egy nézőtéren, ahol 5 sor mindegyikében 5 szék van?

- Először talán zavaró lehet, hogy egy 2-dimenziós pozíció halmaz és a gyerekek közt kell egy bijekciót találni.
- Utána remélhetőleg világos lesz, hogy ugyanaz a helyzet mint a sorbaállításnál (ahol 1-25 pozíciók és a gyerekek közt kerestünk bijekciót).

# Új? kérdések

## Feladat

Hányféleképpen ültethető le 25 gyerek egy nézőtéren, ahol 5 sor mindegyikében 5 szék van?

- Először talán zavaró lehet, hogy egy 2-dimenziós pozíció halmaz és a gyerekek közt kell egy bijekciót találni.
- Utána remélhetőleg világos lesz, hogy ugyanaz a helyzet mint a sorbaállításnál (ahol 1-25 pozíciók és a gyerekek közt kerestünk bijekciót).
- Az is világos, hogy ugyanaz a helyzet mint az átrendezésnél (ahol a gyerekek és szintén a gyerekek közt kerestünk bijekciót).



# Új? kérdések

## Feladat

Hányféleképpen ültethető le 25 gyerek egy nézőtéren, ahol 5 sor mindegyikében 5 szék van?

- Először talán zavaró lehet, hogy egy 2-dimenziós pozíció halmaz és a gyerekek közt kell egy bijekciót találni.
- Utána remélhetőleg világos lesz, hogy ugyanaz a helyzet mint a sorbaállításnál (ahol 1-25 pozíciók és a gyerekek közt kerestünk bijekciót).
- Az is világos, hogy ugyanaz a helyzet mint az átrendezésnél (ahol a gyerekek és szintén a gyerekek közt kerestünk bijekciót).
- A válasz:  $25!$ .

# Új? kérdések (folytatás)

# Új? kérdések (folytatás)

## Feladat

Hányféleképpen helyezhető el 8 bástya a sakktáblán úgy, hogy ne páromként üssék egymást?

# Új? kérdések (folytatás)

## Feladat

Hányféleképpen helyezhető el 8 bástya a sakktáblán úgy, hogy ne páromként üssék egymást?

- Egy ötlet kel csak:

# Új? kérdések (folytatás)

## Feladat

Hányféleképpen helyezhető el 8 bástya a sakktáblán úgy, hogy ne páromként üssék egymást?

- Egy ötlet kel csak: Egy jó elhelyezéshez az  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$  oszlopokba kell egy-egy bástyát rakni úgy, hogy különböző sorokba ( $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ) essenek.

# Új? kérdések (folytatás)

## Feladat

Hányféleképpen helyezhető el 8 bástya a sakktáblán úgy, hogy ne páromként üssék egymást?

- Egy ötlet kel csak: Egy jó elhelyezéshez az  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$  oszlopokba kell egy-egy bástyát rakni úgy, hogy különböző sorokba ( $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ) essenek.
- Azaz egy  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$  bijekciót keresünk.

# Új? kérdések (folytatás)

## Feladat

Hányféleképpen helyezhető el 8 bástya a sakktáblán úgy, hogy ne páromként üssék egymást?

- Egy ötlet kel csak: Egy jó elhelyezéshez az  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$  oszlopokba kell egy-egy bástyát rakni úgy, hogy különböző sorokba ( $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ) essenek.
- Azaz egy  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$  bijekciót keresünk. Hány bijekció lehetséges?

# Új? kérdések (folytatás)

## Feladat

Hányféleképpen helyezhető el 8 bástya a sakktáblán úgy, hogy ne páromként üssék egymást?

- Egy ötlet kel csak: Egy jó elhelyezéshez az  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$  oszlopokba kell egy-egy bástyát rakni úgy, hogy különböző sorokba ( $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ) essenek.
- Azaz egy  $\{a, b, c, d, e, f, g, h\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$  bijekciót keresünk. Hány bijekció lehetséges?
- A válasz  $8!$ .



# A Tétel

# A Tétel

## Tétel

Legyen  $H, H'$  két  $n$ -elemű halmaz. Ekkor

$$|\{\varphi : H \rightarrow H' \mid \varphi \text{ bijekció}\}| = n!.$$

# Vége van!

Köszönöm a figyelmet!