

**FELADATOK AZ „ABSZTRAKT ALGEBRAI KONSTRUKCIÓK”
TÉMAKÖRHÖZ**

Ebben a feladatsorban \mathbb{R}^+ , illetve \mathbb{Q}^+ a pozitív valós, illetve racionális számok halmazát jelöli.

7.1. Feladat. Homomorfizmusok, beágyazások, izomorfizmusok, endomorfizmusok, automorfizmusok-e az alábbi leképezések?

- (a) $(\mathbb{R}; A_n) \rightarrow (\mathbb{R}^+; G_n), x \mapsto 3^x$, ahol $A_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ és $G_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$;
- (b) $(\mathbb{R}; \oplus, \odot) \rightarrow (\mathbb{R}; +, \cdot), x \mapsto x + 1$, ahol $x \oplus y = x + y + 1$ és $x \odot y = xy + x + y$;
- (c) $(\mathbb{R}^+; \oplus, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^+; +, \cdot), x \mapsto 1/x$, ahol $x \oplus y = \frac{xy}{x+y}$;
- (d) $(\mathbb{R}^+; +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^+; +, \cdot), x \mapsto 1/x$;
- (e) $(\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}; *) \rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot), x \mapsto \log x$, ahol $x * y = x^{\log y}$;
- (f) $(\mathbb{C}; +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}; +, \cdot), x \mapsto \operatorname{Im} x$;
- (g) $(S_n; \cdot, {}^{-1}, \operatorname{id}) \rightarrow (S_n; \cdot, {}^{-1}, \operatorname{id}), \pi \mapsto (12)\pi(12) \quad (n \geq 2)$;
- (h) $(S_n; \cdot, {}^{-1}, \operatorname{id}) \rightarrow (S_n; \cdot, {}^{-1}, \operatorname{id}), \pi \mapsto (123)\pi(123) \quad (n \geq 3)$;
- (i) $(S_n; \cdot, {}^{-1}, \operatorname{id}) \rightarrow (S_n; \cdot, {}^{-1}, \operatorname{id}), \pi \mapsto (123)\pi(132) \quad (n \geq 3)$;
- (j) $(\mathbb{Z}_2; +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_2; +, \cdot), x \mapsto x^2$;
- (k) $(\mathbb{Z}_3; +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_3; +, \cdot), x \mapsto x^2$;
- (l) $(P(A); \cap, \cup, \bar{}) \rightarrow (P(A); \cup, \cap, \bar{}), H \mapsto \overline{H}$, ahol A nemüres halmaz;
- (m) $(P(A); \Delta) \rightarrow (P(A); \Delta), H \mapsto \overline{H}$, ahol A nemüres halmaz;
- (n) $(P(\mathbb{N}); \cup, \cap) \rightarrow (P(\mathbb{N}); \cup, \cap), H \mapsto \{1, 2, 3\} \cup H$;
- (o) $(P(\mathbb{N}); \cup, \cap, \bar{}) \rightarrow (P(\mathbb{N}); \cup, \cap, \bar{}), H \mapsto \{1, 2, 3\} \cup H$;
- (p) $(\mathbb{R}; +, f) \rightarrow (\mathbb{C}; +, \bar{}), x \mapsto ix$, ahol $f(x) = -x$;
- (q) $(\{p \in \mathbb{R}[x] : p^* \leq 2\}; +) \rightarrow (\mathbb{R}^3; +), p \mapsto (p(1), p(2), p(3))$;
- (r) $(\mathbb{R}[x]; \cdot) \rightarrow (\mathbb{N}_0; +), p \mapsto p^*$;
- (s) $(K; +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}; +, \cdot), \{a_n\} \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, ahol K a konvergens valós számsorozatok halmaza.

7.2. Feladat. Adja meg $(\mathbb{Z}_4; +)$ egy beágyazását a következő grupoidokba:

- (a) $(S_7; \cdot)$,
- (b) $(\mathbb{C}; \cdot)$,
- (c) $(\mathbb{Z}_{12}; +)$,
- (d) $(\mathbb{Z}_5; \cdot)$,
- (e) $C_{2,8}$,
- (f) $C_{3,4}$,
- (g) $(\mathbb{R}[x] / (x^4 - 1); \cdot)$.

7.3. Feladat. Melyek izomorfak egymással az alábbi $\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_3$ grupoidok közül? (A \mathbb{G}_3 grupoid művelettáblázatát lásd a feladat végén.)

- (a) $\mathbb{G}_1 = (\mathbb{Z}_4; +)$, $\mathbb{G}_2 = (\{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}; \cdot)$, $\mathbb{G}_3 = (\{a, b, c, d\}; *)$;
 (b) $\mathbb{G}_1 = (\{\pm 1, \pm i\}; \cdot)$, $\mathbb{G}_2 = (\{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}; \cup)$, $\mathbb{G}_3 = (\{a, b, c, d\}; \bullet)$;
 (c) $\mathbb{G}_1 = (\{2, 6, 15, 30\}; \text{l.k.k.t.})$, $\mathbb{G}_2 = (\{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}; \cup)$, $\mathbb{G}_3 = (\{a, b, c, d\}; \otimes)$;
 (d) $\mathbb{G}_1 = (\{1, 2, 3, 6\}; \text{l.n.k.o.})$, $\mathbb{G}_2 = (\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}; \cap)$, $\mathbb{G}_3 = (\{a, b, c, d\}; \circ)$;
 (e) $\mathbb{G}_1 = (\{0, 1, 2, 3\}; \max)$, $\mathbb{G}_2 = (\{1, 2, 4, 8\}; \text{l.k.k.t.})$, $\mathbb{G}_3 = (\{a, b, c, d\}; \odot)$.

*	a	b	c	d	•	a	b	c	d	⊗	a	b	c	d	∘	a	b	c	d	⊙	a	b	c	d
a	a	b	c	d	a	a	b	c	d	a	a	a	a	a	a	a	b	c	d	a	a	b	d	d
b	b	a	d	c	b	b	c	d	a	b	a	b	d	b	b	b	b	c	d	b	b	b	d	d
c	c	d	a	b	c	c	d	a	b	c	a	d	c	c	c	c	c	c	d	c	d	d	c	d
d	d	c	b	a	d	d	a	b	c	d	a	b	c	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d

7.4. Feladat. Határozza meg az előző feladatban szereplő grupoidok automorfizmusait.

7.5. Feladat. Bizonyítsa be, hogy az alábbi T grupoidtulajdonság algebrai tulajdonság, azaz ha T teljesül $(G; *)$ -ra, és $(H; *) \cong (G; *)$, akkor T teljesül $(H; *)$ -ra is. Ennek segítségével mutassa meg, hogy a megadott két grupoid nem izomorf egymással.

- (a) T : az $x * x = a$ egyenlet minden a -ra megoldható, $(\mathbb{Q}; +) \not\cong (\mathbb{Q}^+; \cdot)$;
 (b) T : az $x * x = a$ egyenletnek minden a -ra legfeljebb egy megoldása van, $(\mathbb{R}^+; \cdot) \not\cong (\mathbb{C} \setminus \{0\}; \cdot)$;
 (c) T : $a * a = a$ teljesül minden a -ra, $(P(\mathbb{Z}); \cup) \not\cong (P(\mathbb{Z}); \Delta)$;
 (d) T : létezik egyelemű generátorrendszer, $(\mathbb{Q}; +) \not\cong (\mathbb{Z}; +)$.

7.6. Feladat. Lehet-e az \mathbb{A} algebrában a H halmaz valamely részalgebra alaphalmaza?

- (a) $\mathbb{A} = T(\mathbb{N})$, H a véges sok elemet mozgató $T(\mathbb{N})$ -beli transzformációk halmaza;
 (b) $\mathbb{A} = T(\mathbb{N})$, H a véges sok elemet nem mozgató $T(\mathbb{N})$ -beli transzformációk halmaza;
 (c) $\mathbb{A} = (P(\{1, 2, \dots, 8\}); \Delta, \bar{})$, H az $\{1, 2, \dots, 8\}$ halmaz páros elemszámú részalmazainak halmaza;
 (d) $\mathbb{A} = (P(\{1, 2, \dots, 8\}); \cup, \bar{})$, H az $\{1, 2, \dots, 8\}$ halmaz páros elemszámú részalmazainak halmaza;
 (e) $\mathbb{A} = (\mathbb{R}[x]; +, \cdot)$, $H = \{p \in \mathbb{R}[x] : p(2) = 0\}$;
 (f) $\mathbb{A} = (\mathbb{R}[x]; \cdot)$, $H = \{p \in \mathbb{R}[x] : p(2) \neq 0\}$;
 (g) $\mathbb{A} = (\mathbb{R}[x]; +, \cdot)$, $H = \{p \in \mathbb{R}[x] : p(2) \neq 0\}$;
 (h) $\mathbb{A} = (\{1, 2, \dots, 6\}; m)$, ahol $m(a, b, c) = \begin{cases} v, & \text{ha } \{a, b, c\} = \{u, v, w\} \text{ és } u < v < w, \\ \text{a legalább kétszer fellépő elem egyébként,} \end{cases}$
 $H = \{2, 4, 5, 6\}$.

7.7. Feladat. Határozza meg a H halmaz által generált részalgebrát az $\mathbb{A}_1, \mathbb{A}_2, \mathbb{A}_3$ algebrákban.

- (a) H a prímszámok halmaza, $\mathbb{A}_1 = (\mathbb{Q}^+; \cdot)$, $\mathbb{A}_2 = (\mathbb{Q}^+; \cdot, {}^{-1})$, $\mathbb{A}_3 = (\mathbb{Q}^+; +)$;
 (b) $H = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$, $\mathbb{A}_1 = (\mathbb{C}; \cdot)$, $\mathbb{A}_2 = (\mathbb{C}; +)$, $\mathbb{A}_3 = (\mathbb{C}; +, \cdot)$;
 (c) $H = \{0, 1\}$, $\mathbb{A}_1 = (\mathbb{R}; A_3)$, $\mathbb{A}_2 = (\mathbb{R}; A_2, A_3)$, $\mathbb{A}_3 = (\mathbb{R}; A_2, A_3, \dots)$,
 ahol $n = 2, 3, \dots$ esetén $A_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$;
 (d) $H = \{3, x^2\}$, $\mathbb{A}_1 = (\mathbb{R}[x]; +, -)$, $\mathbb{A}_2 = (\mathbb{R}[x]; \cdot)$, $\mathbb{A}_3 = (\mathbb{R}[x]; +, -, \cdot)$;
 (e) H az \mathbb{N} halmaz kételemű részalmazainak halmaza, $\mathbb{A}_1 = (P(\mathbb{N}); \cup)$, $\mathbb{A}_2 = (P(\mathbb{N}); \cap)$, $\mathbb{A}_3 = (P(\mathbb{N}); \cup, \cap)$.

7.8. Feladat. Mutassa meg, hogy nincs valódi részalgebrája a $(\mathbb{Z}; f, g)$ algebrának, ahol $f(x) = x + 1$ és $g(x) = -x$.

7.9. Feladat. Adja meg a következő algebrák összes egy- és kételemű generátorrendszerét.

- (a) $(\mathbb{N}; +)$,
 (b) $(\mathbb{Z}; +)$,
 (c) $(\mathbb{Z}_6; +)$,
 (d) $(\{a, b, c, d\}; *)$ (lásd a műveletábrázolatot a feladat végén),
 (e) $(\{a, b, c, d\}; \bullet)$ (lásd a műveletábrázolatot a feladat végén).

$*$	a	b	c	d	\bullet	a	b	c	d
a	b	c	c	c	a	b	a	c	d
b	b	b	b	b	b	b	a	d	b
c	c	b	c	c	c	a	c	d	c
d	d	c	b	d	d	c	b	c	c

7.10. Feladat. Kompatibilis osztályozása-e \mathcal{C} az \mathbb{A} algebrának? Ha igen, akkor írja le (minél egyszerűbben) a megfelelő faktoralgebrát és adja meg a természetes homomorfizmust.

- (a) $\mathbb{A} = (\{a, b, c, d, e, f\}; g)$, ahol g a következő unér művelet: $\begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ b & c & d & b & f & e \end{pmatrix}$,
 $\mathcal{C} = \{\{a\}, \{b, c, d\}, \{e, f\}\}$;
 (b) $\mathbb{A} = (\{a, b, c, d, e, f\}; g)$, ahol g a következő unér művelet: $\begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ b & c & d & b & f & e \end{pmatrix}$,
 $\mathcal{C} = \{\{a, c, e\}, \{b, d, f\}\}$;
 (c) $\mathbb{A} = (\{1, 2, \dots, 6\}; m)$, ahol m a 6.(h) feladatban definiált háromváltozós művelet,
 $\mathcal{C} = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6\}\}$;
 (d) $\mathbb{A} = (\{1, 2, \dots, 6\}; m)$, ahol m a 6.(h) feladatban definiált háromváltozós művelet,
 $\mathcal{C} = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}, \{5, 6\}\}$;
 (e) $\mathbb{A} = (P(\mathbb{Z}); \cup)$, $\mathcal{C} = \{C_1, C_2\}$, ahol C_1 a \mathbb{Z} halmaz véges részhalmazainak halmaza,
 C_2 pedig a \mathbb{Z} halmaz végtelen részhalmazainak halmaza;
 (f) $\mathbb{A} = (P(\mathbb{Z}); \cup)$, $\mathcal{C} = \{C_1, C_2\}$, ahol C_1 a \mathbb{Z} halmaz \mathbb{N} -et tartalmazó részhalmazainak halmaza,
 C_2 pedig a \mathbb{Z} halmaz \mathbb{N} -et nem tartalmazó részhalmazainak halmaza;
 (g) $\mathbb{A} = (\mathbb{Z}_6; +)$, $\mathcal{C} = \{\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}, \{\bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}\}$;
 (h) $\mathbb{A} = (\mathbb{Z}_6; +)$, $\mathcal{C} = \{\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}, \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}\}\}$;
 (i) $\mathbb{A} = (\{a, b, c, d\}; *)$, $\mathcal{C} = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$ (lásd a műveletábrázolatot a feladat végén);
 (j) $\mathbb{A} = (\{a, b, c, d\}; *)$, $\mathcal{C} = \{\{a\}, \{b, c, d\}\}$ (lásd a műveletábrázolatot a feladat végén).

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	c
b	a	b	c	c
c	d	d	b	b
d	c	d	b	a

7.11. Feladat. Bizonyítsa be, hogy a \mathcal{C} osztályozáshoz tartozó α ekvivalenciareláció az \mathbb{A} algebrának kongruenciája, és adjon meg izomorfizmust \mathbb{A}/α -ról \mathbb{B} -re.

- (a) $\mathcal{C} = \{\{a, d\}, \{b\}, \{c\}, \{e\}, \{f\}\}$, $\mathbb{A} = (\{a, b, c, d, e, f\}; g)$, ahol g a következő unér művelet: $\begin{pmatrix} a & b & c & d & e & f \\ b & c & d & b & f & e \end{pmatrix}$, $\mathbb{B} = (\{1, 2, 3, 4, 5\}; \pi)$, ahol $\pi = (123)(45)$;
 (b) $\mathcal{C} = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5, 6\}\}$, $\mathbb{A} = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}; m)$, ahol m a 6.(h) feladatban definiált háromváltozós művelet, $\mathbb{B} = (\{1, 2, 3\}; g)$, ahol $g(a, b, c) = \begin{cases} 2, & \text{ha } a, b, c \text{ különbözőek,} \\ \text{a legalább kétszer fellépő elem egyébként;} \end{cases}$
 (c) $\mathcal{C} = \{\{\emptyset\}, P(\mathbb{Z}) \setminus \{\emptyset\}\}$, $\mathbb{A} = (P(\mathbb{Z}); \cup)$, $\mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; \cdot)$;
 (d) $\mathcal{C} = \{\{\bar{0}, \bar{3}\}, \{\bar{1}, \bar{4}\}, \{\bar{2}, \bar{5}\}\}$, $\mathbb{A} = (\mathbb{Z}_6; +)$, $\mathbb{B} = (\mathbb{Z}_3; +)$;
 (e) $\mathcal{C} = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d, e\}\}$, $\mathbb{A} = (\{a, b, c, d, e\}; *)$ (lásd a műveletábrázolatot), $\mathbb{B} = (\{0, 1, 2\}; \max)$.

$*$	a	b	c	d	e
a	a	a	c	d	d
b	b	b	c	e	d
c	c	c	c	e	e
d	d	d	e	e	d
e	d	d	d	d	e

7.12. Feladat. Ellenőrizze, hogy a megadott $\varphi : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ leképezés homomorfizmus, és határozza meg φ magját és értékészletét. Végül adjon meg izomorfizmust $\mathbb{A}/\ker \varphi$ -ről $\mathbb{A}\varphi$ -re.

- (a) $\varphi : (P(A); \cup, \cap) \rightarrow (P(A); \cup, \cap), H \mapsto H \cap B$, ahol $B \subseteq A$ adott halmazok;
- (b) $\varphi : (\mathbb{C}; \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}; \cdot), z \mapsto |z|$;
- (c) $\varphi : (S_n; \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}; \cdot), \pi \mapsto \operatorname{sgn}(\pi)$;
- (d) $\varphi : (\mathbb{R}[x]; +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}; +, \cdot), f \mapsto f(2)$;
- (e) $\varphi : (\mathbb{R}[x]; +) \rightarrow (\mathbb{R}[x]; +), f \mapsto f'$;
- (f) $\varphi : (\mathbb{C}; +) \rightarrow (\mathbb{R}; +), z \mapsto \operatorname{Re} z$;
- (g) $\varphi : (\mathbb{Z}; +) \rightarrow (S_5, \cdot), k \mapsto (12345)^k$;
- (h) $\varphi : (\mathbb{Z}; +) \rightarrow (\mathbb{C}; \cdot), k \mapsto \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^k$;
- (i) $\varphi : (\mathbb{Z}[x]; +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_5[x]; +, \cdot), \sum_{i=1}^n a_i x^i \mapsto \sum_{i=1}^n \bar{a}_i x^i$.

7.13. Feladat. Bizonyítsa be, hogy a következő algebraiknak nincs az egyenlőségtől és a teljes relációtól különböző kongruenciája.

- (a) $(\mathbb{Z}_7; +)$,
- (b) $(A; f)$, ahol A egy nemüres halmaz, és $f(a, b, c) = \begin{cases} c, & \text{ha } a \neq b \\ a, & \text{ha } a = b \end{cases}$,
- (c) $(\mathbb{R}; +, \cdot)$,
- (d) $(\{a, b, c, d\}; *)$, ahol $*$ művelet táblázata a következő (a kipontozott helyek tetszőlegesen kitölthetők):

$*$	a	b	c	d
a	a	c	d	b
b	a	\cdot	\cdot	\cdot
c	b	\cdot	\cdot	\cdot
d	\cdot	\cdot	\cdot	\cdot

7.14. Feladat. Döntse el, hogy izomorf-e az \mathbb{A} és a \mathbb{B} algebra. Ha igen, adjon meg egy izomorfizmust \mathbb{A} -ról \mathbb{B} -re.

- (a) $\mathbb{A} = (\mathbb{C}; +), \mathbb{B} = (\mathbb{R}; +) \times (\mathbb{R}; +)$;
- (b) $\mathbb{A} = (\mathbb{C}; \cdot), \mathbb{B} = (\mathbb{R}; \cdot) \times (\mathbb{R}; \cdot)$;
- (c) $\mathbb{A} = (\mathbb{Z}_6; +), \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; +) \times (\mathbb{Z}_3; +)$;
- (d) $\mathbb{A} = (S_6; \cdot), \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; +) \times (\mathbb{Z}_3; +)$;
- (e) $\mathbb{A} = (\mathbb{Z}_4; +), \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; +) \times (\mathbb{Z}_2; +)$;
- (f) $\mathbb{A} = (\{\operatorname{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}; \cdot), \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; +) \times (\mathbb{Z}_2; +)$;
- (g) $\mathbb{A} = (P(\{1, 2, 3\}); \Delta, \cap), \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; +, \cdot) \times (\mathbb{Z}_2; +, \cdot) \times (\mathbb{Z}_2; +, \cdot)$.