

## 8. feladatsor – Mátrix rangja, Homogén lineáris egyenletrendszer

**8.1. Feladat.** Határozzuk meg a következő mátrixok rangját, valamint adjunk meg a mátrixokban maximális méretű nemeltűnő aldeteminánst.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 4 & 8 \\ 9 & 3 & 1 \\ 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 6 & -9 \\ 2 & -4 & 6 \\ -4 & 8 & -12 \end{pmatrix}$$

**8.2. Feladat.** Kronecker-Capelli tétel felhasználásával döntsük el, hogy az alábbi egyenletrendszer a  $\lambda$  valós paraméter mely értékeire oldható meg.

$$\begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ \text{a) } -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0 ; \\ x_1 + 5x_2 = \lambda - 4 \\ \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ \text{b) } 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 . \\ 3x_1 + 4x_3 = \lambda \end{array}$$

**8.3. Feladat.** Határozzuk meg hány dimenziós a következő homogén lineáris egyenletrendszerek megoldástere, valamint adjunk meg a megoldástér egy bázisát (azaz adjunk meg egy fundamentális rendszerét).

$$\begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ \text{a) } x_1 - x_2 - x_3 = 0 ; \\ 2x_1 - 3x_3 = 0 \\ \\ x_1 + x_4 = 0 \\ \text{b) } x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 ; \\ 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 0 \\ \text{c) } -x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 0 . \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_4 - x_5 = 0 \end{array}$$

### Szorgalmi feladatok

**8.4. Feladat.** A  $p$  valós paraméter értékétől függően határozzuk meg a következő mátrix rangját.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ p & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \\ 4 & 2 & 0 & p \end{pmatrix}$$

**8.5. Feladat.** Határozzuk meg a következő mátrixok rangját a  $\lambda$  paraméter függvényében:

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

**8.6. Feladat.** Egy  $n \times m$ -típusú ( $n \geq 2, m \geq 2$ ) mátrix első sorának és első oszlopának minden eleme 0-tól különböző valós szám, de minden más eleme 0. Mennyi a mátrix rangja?

**8.7. Feladat.** Egy  $n \times n$ -típusú mátrix első sorának és főátlójának minden eleme 0-tól különböző valós szám, a mátrix többi eleme 0. Mennyi a mátrix rangja?

**8.8. Feladat.** Egy  $n$  ismeretlenes egyenletrendszer bővített mátrixának van determinánsa, és ez a determináns nem 0. Mit mondhatunk az egyenletrendszer megoldhatóságáról?

**8.9. Feladat.** Melyek igazak a következő állítások közül tetszőleges  $m$  egyenletből álló  $n$  ismeretlenes lineáris egyenletrendszerre? Ha nem teljesül az állítás, adjunk ellenpéldát.

- a) Ha  $n > m$ , akkor végtelen sok megoldás van.
- b) Ha  $n = m$ , akkor pontosan egy megoldás van.
- c) Ha pontosan egy megoldás van, akkor  $n = m$ .
- d) Ha  $n < m$ , akkor nincs megoldás.
- e) Ha  $m < n$ , akkor nem lehet pontosan egy megoldás.
- f) Ha  $n = m$  és végtelen sok megoldás van, akkor az együtthatókból álló determináns 0.
- g) Ha  $n = m$  és az együtthatókból álló determináns 0, akkor végtelen sok megoldás van.

**8.10. Feladat.** Adjuk meg az alábbi homogén lineáris egyenletrendszerben az  $a$  paraméter értékét úgy, hogy a megoldástér dimenziója 3 legyen, valamint ekkor adjunk is meg bázist a megoldástérben.

$$\begin{aligned} x_2 + x_3 - ax_5 &= 0 \\ -x_1 + x_2 + ax_3 - 3x_4 &= 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 + 3x_4 - 2x_5 &= 0 \end{aligned}$$

**8.11. Feladat.** Tekintsük a következő homogén lineáris egyenletrendszert.

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 + x_5 &= 0 \\ x_2 + x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Adottak a következő vektorok  $\mathbb{R}^5$ -ben  $u = (1, 1, 1, 1, 1)$ ,  $v = (1, 0, -2, 0, 1)$ ,  $w = (0, -1, 0, 1, 0)$ ,  $x = (1, -2, -2, 2, 1)$   $y = (1, 0, -1, 0, 0)$ . Döntsük el, hogy az alábbi vektorrendszerek bázist alkotnak-e a fenti egyenletrendszer megoldásainak alterében?

- a)  $u, v, w$ ;
- b)  $v, w, x$ ;
- c)  $w, x, y$ .