

**A Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny
feladatai (1995. október 20-30)**

1. Igazoljuk, hogy a síkon nem azonosan zéró harmonikus függvény nem tűnhet el kétdimenziós pozitív mértékű halmazon.
2. Az $f, g \in L^1[0, 1]$ függvényekről tudjuk, hogy

$$\int_0^1 f = \int_0^1 g = 1.$$

Igazoljuk, hogy van olyan I intervallum, amelyre

$$\int_I f = \int_I g = 1/2.$$

3. Jelölje $\langle x \rangle$ az x valós szám távolságát a legközelebbi egész számtól. Legyen f szakzonként lineáris, 1 szerint periodikus, folytonos valós függvény. Bizonyítsuk be, hogy pontosan akkor vannak alkalmas n -nel olyan $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_n$ valós számok, hogy

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \langle a_i x + b_i \rangle$$

minden x -re, ha van olyan k , hogy

$$\sum_{j=1}^{2^k} f\left(x + \frac{j}{2^k}\right)$$

konstans.

4. Az a_1, \dots, a_k páratlan és b_1, \dots, b_k páros számokra tudjuk, hogy

$$\sum_{j=1}^k a_j^n = \sum_{j=1}^k b_j^n$$

teljesül $n = 1, 2, \dots, N$ -re. Igazoljuk, hogy ekkor $k \geq 2^N$, és hogy $k = 2^N$ esetén mindig létezik fenti tulajdonságú rendszer.

5. Legyen A az $\{1, 2, \dots, n\}$ halmaz legalább $100\sqrt{n}$ elemű részhalmaza. Bizonyítsuk be, hogy van olyan négytagú számtani sorozat, amelynek mindegyik eleme előáll az A halmaz két-két különböző elemének összegeként.
6. Bizonyítsuk be, hogy minden véges háromszögmentes gráf beágyazható feszített részgráfként egy véges háromszögmentes 2 átmérőjű gráfba.

7. Legyen R olyan asszociatív gyűrű, amelyben egyetlen nem 0 elem négyzete sem 0. Bizonyítsuk be, hogy ha $x_1, x_2, \dots, x_n \in R$ és $x_1 x_2 \cdots x_n = 0$, akkor ugyanezen elemek bármely más sorrendben vett szorzata is 0.
8. Legyen P véges részbenrendezett halmaz, melyben van legnagyobb elem és ez a minimális elemek halmazának egyetlen felső korlátja. Igazoljuk, hogy bármely $f : P^n \rightarrow P$ monoton függvény megkapható $g(x_1, x_2, \dots, x_n, c_1, \dots, c_m)$ alakban, ahol $c_i \in P$ és g monoton idempotens függvény P -n (g idempotens, ha $g(x, x, \dots, x) = x$ minden $x \in P$ -re).
9. Egy síkbeli P_1, \dots, P_m nem feltétlenül különböző pontokból álló pontsorozatot kígyózónak nevezünk, ha P_i és P_{i+1} távolsága legalább 1, és a $P_i P_{i+1}$ szakaszok felváltva vízszintesek ill. függőlegesek. Konstruáljunk olyan kompakt halmazt, amelyben van akármilyen hosszú kígyózó sorozat, de nincs ilyen záródó sorozat (amelyre tehát $P_m = P_i$ valamely $i < m$ -re).
10. Legyen $X = \{X_1, X_2, \dots\}$ megszámlálható halmaz a térben. Mutassuk meg, hogy van olyan $\{a_k\}$ pozitív sorozat, hogy a tér bármely $Z \notin X$ pontjára igaz az, hogy a Z pontnak az $\{X_1, X_2, \dots, X_k\}$ halmaztól vett távolsága legalább a_k végtelen sok k -ra.
11. Egy kör kerületén vegyünk fel $2n$ diszjunkt ívet és állítsuk párba azokat. Az egyes párokat egy téglalap alakú szalag odaragasztásával összekötjük. A ragasztás történhet úgy, hogy a kör és a téglalap együtt körgyűrűvel homeomorf alakzatot ad, és úgy is, hogy Möbiusz-szalaggal homeomorf alakzatot ad. Az utóbbit csavart, az előbbit nem-csavart ragasztásnak mondjuk. Definiáljunk egy $n \times n$ -es (A_{ij}) mátrixot a következő módon: legyen $A_{ii} = 1$, ha az i -edik téglalap odaragasztása csavart, és legyen $A_{ii} = 0$, ha az nem-csavart. Legyen $A_{ij} = 0$, ha a körvonalnak van olyan íve, mely az i -edik téglalap mindkét odaragasztott oldalát tartalmazza, ám a j -edik téglalap odaragasztott oldalaival nincs közös pontja; ellenkező esetben legyen $A_{ij} = 1$. Legyen r az (A_{ij}) mátrix rangja a kételemű test felett, és k az n darab téglalap körlaphoz ragasztásával nyert felület peremköreinek a száma. Igazoljuk, hogy $n = k + r - 1$.
12. $F(x)$ legyen ismert eloszlásfüggvény, az η_1, η_2, \dots valószínűségi változók legyenek függetlenek a közös $F(x - \vartheta)$ eloszlásfüggvénnyel, ahol ϑ az ismeretlen, úgynevezett eltolási paraméter. Nevezzük az eltolási paramétert „jól becsülhetőnek”, ha létezik c pozitív konstans úgy, hogy bármely $\varepsilon > 0$ -hoz megadható a számegyenesen olyan ε Lebesgue-mértékű E Borel-halmaz („konfidencia halmaz”) és olyan $t_n(x_1, \dots, x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$) Borel-mérhető függvény, amelyekkel bármilyen ϑ esetén

$$P(\vartheta - t_n(\eta_1, \dots, \eta_n) \in E) > 1 - e^{-cn} \quad (n > n_0(\varepsilon, F)).$$

Igazoljuk, hogy

- ha F nem abszolút folytonos, akkor az eltolási paraméter „jól becsülhető”,
- ha F abszolút folytonos és F' folytonos, akkor nem „jól becsülhető”.