

2. feladatsor – Predikátumkalkulus elemei

2.1. Feladat. Jelölje $M(x)$ az „ x négyzetszám”, $P(x)$ az „ x páros szám”, $O(x, y)$ az „ x osztója y -nak”, $N(x)$ az „ x negatív szám” predikátumokat, individuumtartomány az egész számok halmaza. Fordítsuk köznapi nyelvre az alábbi formulákat.

- (a) $P(7)$
- (b) $M(4) \wedge \neg N(9 + 3)$
- (c) $(\forall x)(O(2, 4 \cdot x))$
- (d) $(\exists x)(P(x) \wedge O(x, 6))$
- (e) $(\forall x)(O(4, x) \rightarrow P(x))$
- (f) $(\forall x)(M(x) \rightarrow (\exists y)(P(y) \wedge O(x, y)))$
- (g) $(\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)((P(y) \wedge N(y)) \rightarrow (\neg O(y, x))))$

2.2. Feladat. Legyen Q egyváltozós predikátum, P kétváltozós predikátum, f kétváltozós függvényjel és a individuumkonstans. Adjuk meg a következő formula rész kifejezéseit és részformuláit. Melyek a szabad, illetve a kötött változók?

$$(\forall x)P(f(x, a), x) \rightarrow (\exists y)(P(f(y, x), y) \wedge Q(x)).$$

2.3. Feladat. Formalizáljuk predikátumkalkulusban az alábbi ítéleteket. Individuumtartomány az emberek halmaza, a predikátumok, függvényjelek és individuumkonstansok a következők:

$$\begin{array}{ll} H(x): \text{„}x \text{ hallgató”}, & V(x): \text{„}x \text{ felkészült a vizsgára”}, \\ B(x, y): \text{„}x \text{ az } y \text{ barátja”}, & C(x, y): \text{„}x \text{ csoporttársa } y\text{-nak”}, \\ T(x, y): \text{„}x \text{ házatársa } y\text{-nak”}, & F(x): \text{„}x \text{ férfi”}, \\ A(x): \text{„}x \text{ anya”}, & p: \text{„Péter”}, \\ a(x): \text{„}x \text{ anyja”}, & S(x): \text{„}x \text{ szeret főzni”}. \end{array}$$

- (a) Néhány hallgató nem készült fel a vizsgára.
- (b) Minden hallgató felkészült a vizsgára.
- (c) Néhány hallgatónak nincs barátja.
- (d) Bizonyos hallgatók csak a csoporttársaikkal házasodnak össze.
- (e) Vannak nőtlen férfiak.
- (f) Minden anya nő, de van olyan nő, aki nem anya.
- (g) Péter összes barátja hallgató.
- (h) Néhány hallgató anyja nem szeret főzni.
- (i) Péter anyja szeret főzni.

2.4. Feladat. Megfelelően választott predikátum- és függvényjelek segítségével formalizáljuk az alábbi mondatokat elsőrendű nyelven. Adjuk meg a kapott formula tagadását úgy, hogy negáció csak predikátumjelre vonatkozzon. Az individuumtartomány legyen az egész számok halmaza.

- (a) Minden egész számnak osztója az 1 és önmaga.
- (b) Minden egész számnál létezik kisebb.
- (c) Minden 10-zel osztható szám 0-ra végződik.

- (d) Van olyan negatív szám, amely négyzete pozitív.
- (e) Minden szám pozitív vagy negatív.

2.5. Feladat. Formalizáljuk predikátumkalkulusban a következő ítéleteket. Adjuk meg a formulák tagadását is úgy, hogy kvantort nem tagadunk, és fogalmazzuk meg a megfelelő ítéletet köznapi nyelven. (Individuumtartomány az emberek halmaza.)

- (a) Minden informatikus éhes.
- (b) Ha egy szakács éhes, főz magának.
- (c) Az éhes informatikusok kedvelik a szakácsokat.
- (d) Van olyan szakács, aki csak informatikusnak főz.
- (e) Minden informatikus kedveli a neki főző szakácsokat.
- (f) Mézga Géza szerencsétlen, de gyermekei szerencsések.
- (g) Ha Mézga Géza szakács, és senki sem éhes, akkor mindenki szerencsés.

2.6. Feladat. Döntsük el, hogy teljesülnek-e az alábbi formulák az $(A; N, K, P)$ interpretációnál, ahol $A = \mathbb{Z}$, N a négyzetszámok, K a köbszámok, P pedig a prímszámok halmaza.

- (a) $((\exists x)N(x) \wedge (\exists x)K(x)) \rightarrow (\exists x)(N(x) \wedge K(x))$
- (b) $(\exists x)(N(x) \vee P(x)) \rightarrow ((\exists x)N(x) \vee (\exists x)P(x))$

2.7. Feladat. Döntsük el, hogy tautológiák-e a következő formulák.

- (a) $(\forall x)(\forall y)A(x, y) \rightarrow (\forall x)A(x, x)$
- (b) $((\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)) \rightarrow (\exists x)(A(x) \wedge B(x))$
- (c) $((\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)) \rightarrow (\exists x)(A(x) \vee B(x))$
- (d) $\neg(\exists x)(\forall y)((\neg A(x)) \vee (\neg B(y))) \leftrightarrow (\forall x)(\exists y)(A(x) \wedge B(y))$