

# Izomorfia

Waldhauser Tamás  
2020 őszi félév

# Izomiaúrfizmus

$\leftrightarrow$	igaz	hamis
igaz	igaz	hamis
hamis	hamis	igaz

$\cdot$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

izomorf csoportok

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

$\otimes$		
		
		

Az  $\mathbb{A} = (\{ \text{🐈}, \text{🐈} \}; \otimes)$  és a  $\mathbb{B} = (\{ \bar{0}, \bar{1} \}; +)$  csoportok szerkezete ugyanaz: ha  $\mathbb{A}$  műveletábrázatában

minden 🐈-t átnevezünk  $\bar{0}$ -ra, és minden 🐈-t átnevezünk  $\bar{1}$ -re, akkor éppen  $\mathbb{B}$  műveletábrázatát kapjuk:

$\otimes$		
		
		

átnevezés  
 $\xrightarrow{\hspace{1cm}}$

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

Ezt az „átnevezést” a

$$\varphi: \{ \text{🐈}, \text{🐈} \} \rightarrow \{ \bar{0}, \bar{1} \}, \quad \text{🐈} \mapsto \bar{0}, \quad \text{🐈} \mapsto \bar{1}$$

leképezéssel írhatjuk le. Az átnevezés „jogossága” pedig a következőképpen fogalmazható meg:

$$\forall a_1, a_2 \in \{ \text{🐈}, \text{🐈} \}: \quad (a_1 \otimes a_2) \varphi = (a_1 \varphi) + (a_2 \varphi).$$

## Definíció

Legyen  $\mathbb{A} = (A; *)$  és  $\mathbb{B} = (B; \oplus)$  két grupoid. Azt mondjuk, hogy a  $\varphi: A \rightarrow B$  leképezés **izomorfizmus**  $\mathbb{A}$ -ból  $\mathbb{B}$ -be, ha

- ▶  $\varphi$  bijektív leképezés, és
- ▶  $\varphi$  felcserélhető a műveletekkel, azaz

$$\forall a_1, a_2 \in A: (a_1 * a_2) \varphi = a_1 \varphi \oplus a_2 \varphi.$$

Ha létezik  $\varphi: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$  izomorfizmus, akkor azt mondjuk, hogy  $\mathbb{A}$  és  $\mathbb{B}$  **izomorf** (jelölés:  $\mathbb{A} \cong \mathbb{B}$ ).

## Állítás

Izomorfizmusok szorzata izomorfizmus, izomorfizmus inverze izomorfizmus.  
Következésképp az izomorfia ekvivalenciareláció (grupoidok bármely halmazán).

## Példa

Adjunk meg izomorfizmust az  $\mathbb{A}$  és  $\mathbb{B}$  grupoidok között.

$$\mathbb{A} = (\{\text{igaz}, \text{hamis}\}; \leftrightarrow), \quad \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; +)$$

## Megoldás

$$\text{igaz} \mapsto \bar{0}, \quad \text{hamis} \mapsto \bar{1}$$

## Példa

Adjunk meg izomorfizmust az  $\mathbb{A}$  és  $\mathbb{B}$  grupoidok között.

$$\mathbb{A} = (\{\text{igaz}, \text{hamis}\}; \wedge), \quad \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; \cdot)$$

## Megoldás

$$\text{igaz} \mapsto \bar{1}, \quad \text{hamis} \mapsto \bar{0}$$

## Példa

Adjunk meg izomorfizmust az  $\mathbb{A}$  és  $\mathbb{B}$  grupoidok között.

$$\mathbb{A} = (\{1, -1, i, -i\}; \cdot), \quad \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_4; +)$$

## Megoldás

$$\begin{aligned} 1 &\mapsto \bar{0}, & -1 &\mapsto \bar{2}, & i &\mapsto \bar{1}, & -i &\mapsto \bar{3} \\ i &\mapsto \bar{1}, & -1 &\mapsto \bar{2}, & -i &\mapsto \bar{3}, & 1 &\mapsto \bar{0} \end{aligned}$$

Tömörebben:  $\varphi: \{1, -1, i, -i\} \rightarrow \mathbb{Z}_4, i^k \mapsto \bar{k}$ .

Ez a leképezés azért bijektív, mert  $\forall k, \ell \in \mathbb{Z}: i^k = i^\ell \iff k \equiv \ell \pmod{4}$ .

A műveletekkel való felcserélhetőség pedig a hatványozás egyik azonosságán múlik:

$$(i^k \cdot i^\ell)\varphi = i^{k+\ell}\varphi = \overline{k+\ell} = \bar{k} + \bar{\ell} = i^k\varphi + i^\ell\varphi.$$

## Példa

Adjunk meg izomorfizmust az  $\mathbb{A}$  és  $\mathbb{B}$  grupoidok között.

$$\mathbb{A} = (\{-1, 1\}; \cdot), \quad \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_2; +)$$

## Példa

Adjunk meg izomorfizmust az  $\mathbb{A}$  és  $\mathbb{B}$  grupoidok között.

$$\mathbb{A} = (\{a, b, c, d\}; *), \quad \mathbb{B} = (\mathbb{Z}_4; \cdot)$$

*	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>c</i>

## Példa

Izomorf-e az  $\mathbb{A}$  grupoid  $\mathbb{B}$  és  $\mathbb{C}$  közül valamelyikkel? Ha igen, akkor adjunk meg egy izomorfizmust; ha nem, akkor indokoljuk meg, hogy miért nem.

$$\mathbb{A} = (\{\text{igaz}, \text{hamis}\}; \rightarrow), \quad \mathbb{B} = (\{0, 1\}; \circ), \quad \mathbb{C} = (\{0, 1\}; *)$$

$\circ$	0	1	$*$	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1

## Megoldás

$\mathbb{A} \cong \mathbb{B}$  a következő izomorfizmus mellett: igaz  $\mapsto 1$ , hamis  $\mapsto 0$ .

$\mathbb{A} \not\cong \mathbb{C}$ , mert  $\mathbb{C}$  kommutatív, de  $\mathbb{A}$  nem.



## Példa

Izomorf-e az  $\mathbb{A}$  grupoid  $\mathbb{B}$  és  $\mathbb{C}$  közül valamelyikkel? Ha igen, akkor adjunk meg egy izomorfizmust; ha nem, akkor indokoljuk meg, hogy miért nem.

$$\mathbb{A} = (\{1, 2, 3\}; \min), \quad \mathbb{B} = (\{0, 1, 2\}; \oplus), \quad \mathbb{C} = (\{0, 1, 2\}; *)$$

$\oplus$		0	1	2		$*$		0	1	2
0		0	1	2		0		0	0	0
1		1	1	1		1		0	1	2
2		2	1	2		2		0	2	0

## Megoldás

$\mathbb{A} \cong \mathbb{B}$  a következő izomorfizmus mellett:  $1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 0$ .

$\mathbb{A} \not\cong \mathbb{C}$ , mert  $\mathbb{A}$ -ban minden elem „négyzete” saját maga:  $\min(a, a) = a$  minden  $a$ -ra, de  $\mathbb{C}$ -ben ez nem igaz, pl.  $2 * 2 = 0$ .

## Példa

Izomorf-e az  $\mathbb{A}$  grupoid  $\mathbb{B}$  és  $\mathbb{C}$  közül valamelyikkel? Ha igen, akkor adjunk meg egy izomorfizmust; ha nem, akkor indokoljuk meg, hogy miért nem.

$$\mathbb{A} = (\mathcal{P}(\{1, 2\}); \cup), \quad \mathbb{B} = (\{0, 1, 2, 3\}; \oplus), \quad \mathbb{C} = (\{0, 1, 2, 3\}; *)$$

$\oplus$		0	1	2	3		$*$		0	1	2	3
0		0	1	3	1		0		0	1	0	1
1		1	1	1	1		1		1	1	1	1
2		3	1	2	0		2		0	1	2	3
3		1	1	0	3		3		1	1	3	3

## Megoldás

$\mathbb{A} \not\cong \mathbb{B}$ , mert  $\mathbb{A}$ -ban van egységelem ( $\emptyset$ ), de  $\mathbb{B}$ -ben nincs.

$\mathbb{A} \cong \mathbb{C}$ , a következő izomorfizmus mellett:

$\emptyset \mapsto 2$ ,  $\{1\} \mapsto 0$ ,  $\{2\} \mapsto 3$ ,  $\{1, 2\} \mapsto 1$ .

## Példák

Izomorfizmusok-e az alábbi leképezések?

1.  $\varphi: (\mathbb{R}; +) \mapsto (\mathbb{R}; +), x \mapsto 2x$  igen
2.  $\varphi: (\mathbb{R}; \cdot) \mapsto (\mathbb{R}; \cdot), x \mapsto 2x$  nem (nem művelettartó)
3.  $\varphi: (\mathbb{Z}; +) \mapsto (\mathbb{Z}; +), x \mapsto 2x$  nem (nem szürjektív)
4.  $\varphi: (\mathbb{Z}; +) \mapsto (\mathbb{Z}; +), x \mapsto -x$  igen
5.  $\varphi: (\mathbb{C}; +, \cdot) \mapsto (\mathbb{C}; +, \cdot), x \mapsto \bar{x}$  igen
6.  $\varphi: (\mathbb{R}^+; \cdot) \mapsto (\mathbb{R}; +), x \mapsto \log x$  igen virtuális logarléc