

A valós számokon túl

Tartalom

1. Arkhimédési testek
2. Teljesség
3. Tizedes törtek
4. Hipervalós számok

Tartalom

1. Arkhimédeszi testek
2. Teljesség
3. Tizedes törtek
4. Hipervalós számok

Korlátok

Tetszőleges T rendezett testben definiálhatunk **intervallumokat**:

- ▶ $(a, b) := \{x \in T : a < x < b\}$;
- ▶ $[a, b] := \{x \in T : a \leq x \leq b\}$;
- ▶ $[a, b) := \{x \in T : a \leq x < b\}$;
- ▶ $(a, \infty) := \{x \in T : a < x\}$.

A $H \subseteq T$ halmaz **alulról korlátos**, ha létezik olyan $a \in T$ elem (alsó korlát), amelyre minden $h \in H$ esetén $a \leq h$ teljesül. Ha az alsó korlátok között van legnagyobb, akkor azt H **infimumának** nevezzük:

$$\inf H = \max \{a \in T : \forall h \in H : a \leq h\}.$$

Hasonlóan értelmezhető egy **felülről korlátos** $H \subseteq T$ halmaz **szuprémuma**, vagyis legkisebb felső korlátja:

$$\sup H = \min \{a \in T : \forall h \in H : a \geq h\}.$$

A racionális számtest beágyazása

Legyen T egy rendezett test, e multiplikatív egységelemmel, P pozitivitási tartománnyal, és legyen

$$T^+ = \{a \in T : a > 0\} = P \setminus \{0\}, \quad T^- = \{a \in T : a < 0\}.$$

Emlékeztető:

- ▶ $\forall a_1, \dots, a_n \in T : a_1^2 + \dots + a_n^2 \in P;$
- ▶ $\forall a_1, \dots, a_n \in T : a_1^2 + \dots + a_n^2 = 0 \iff a_1 = \dots = a_n = 0.$

Ebből következik, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

- ▶ $n \cdot e = \underbrace{e + \dots + e}_n = \underbrace{e^2 + \dots + e^2}_n \in T^+;$
- ▶ $(-n) \cdot e = -(n \cdot e) \in T^-.$

Ezek alapján könnyen látható, hogy a $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow T, n \mapsto n \cdot e$ leképezés beágyazza az egész számok gyűrűjét T -be, sőt, ezt kiterjesztve a

$$\varphi: \mathbb{Q} \rightarrow T, \frac{a}{b} \mapsto ae \cdot (be)^{-1}$$

leképezéssel beágyazhatjuk a racionális számok testét is T -be ($\text{char } T = 0$).

Nagyságrendi viszonyok

Azonosítsuk az $ae \cdot (be)^{-1} \in T$ elemet az $\frac{a}{b}$ racionális számmal (pl. $e = 1$).

Így ezentúl mindig feltehetjük, hogy \mathbb{Q} részteste T -nek.

A φ leképezés nem csak a műveletekkel cserélhető fel, de monoton is, azaz T rendezett résztestként tartalmazza \mathbb{Q} -t (vagyis \mathbb{Q} szokásos rendezése egybeesik T rendezésének \mathbb{Q} -ra való megszorításával).

Definíció.

Értelmezzük a T^+ halmazon a „végtelenül kisebb” relációt a következőképpen:

$$\begin{aligned} a \ll b &\iff \forall n \in \mathbb{N} : na < b \\ &\iff \forall n \in \mathbb{N} : n < \frac{b}{a} \\ &\iff \forall n \in \mathbb{N} : \frac{a}{b} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

A fentiekből világos, hogy

$$a \ll b \iff 1 \ll \frac{b}{a} \iff \frac{a}{b} \ll 1.$$

Végtelenül kicsi és végtelenül nagy elemek

Definíció.

A T^+ halmaz elemeit három csoportba sorolhatjuk az 1-hez való viszonyuk szerint:

▶ $I^+ := \{a \in T^+ : a \ll 1\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, \frac{1}{n}\right)$ (infinitezimális elemek)

▶ $V^+ := \{a \in T^+ : a \gg 1\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} (m, \infty)$ (végtelen elemek)

▶ $F^+ := T^+ \setminus (I^+ \cup V^+) = \bigcup_{n,m=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, m\right]$ (véges elemek)

Az összeg és szorzat nagyságrendje így alakul (HF):

$+$	I^+	F^+	V^+
I^+	I^+	F^+	V^+
F^+	F^+	F^+	V^+
V^+	V^+	V^+	V^+

\cdot	I^+	F^+	V^+
I^+	I^+	I^+	?
F^+	I^+	F^+	V^+
V^+	?	V^+	V^+

Az arkhimédészi axióma

Definíció.

A T rendezett test **arkhimédészi test**, ha teljesülnek rá az alábbi ekvivalens feltételek:

- ▶ $\forall a \in T \exists n \in \mathbb{N} : n > a$;
- ▶ $V^+ = \emptyset$;
- ▶ $I^+ = \emptyset$;
- ▶ $\ll = \emptyset$.

Tétel.

Minden rendezett T testre ekvivalensek a következők:

1. T arkhimédészi test;
2. \mathbb{Q} sűrű részhalmaz T -ben: $\forall a, b \in T : a < b \implies \exists r \in \mathbb{Q} : a < r < b$;
3. $\forall a \in T : a = \inf \{r \in \mathbb{Q} : r > a\}$;
4. $\forall a \in T : a = \sup \{r \in \mathbb{Q} : r < a\}$.

Példa nem arkhimédieszi testre

Bővítjük a valós számok testét egy ε infinitezimális elemmel. Az $\mathbb{R} \cup \{\varepsilon\}$ halmaz persze nem lesz test; hozzá kell vennünk minden olyan kifejezést, amit a négy alpművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) véges számú alkalmazásával fel tudunk építeni ε -ból és valós számokból. Ezek mind így festenek:

$$\frac{a_n \varepsilon^n + \cdots + a_1 \varepsilon + a_0}{b_m \varepsilon^m + \cdots + b_1 \varepsilon + b_0} \quad (n, m \in \mathbb{N}_0, a_i, b_j \in \mathbb{R}, b_m \neq 0).$$

Az ilyen alakú elemek már testet alkotnak; jelöljük ezt $\mathbb{R}(\varepsilon)$ -nal.

Az a tény, hogy $0 < \varepsilon < \frac{1}{n}$ minden $n \in \mathbb{N}$ -re, egyértelműen meghatározza a rendezést az $\mathbb{R}(\varepsilon)$ testen. Például (HF):

$$5 + 100\varepsilon^2 < 6 - 37\varepsilon \ll \frac{1 + \varepsilon}{\varepsilon^2 + 2\varepsilon} \ll \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Node létezik-e egyáltalán ε ?

Nem kell hinni epszilonban

Tekintsük az \mathbb{R} feletti racionális törtek testét (ez nem más, mint az $\mathbb{R}[x]$ gyűrű hányadosteste):

$$\mathbb{R}(x) = \left\{ \frac{f}{g} : f, g \in \mathbb{R}[x], g \neq 0 \right\}.$$

Legyen P azon $t = \frac{f}{g}$ racionális törtek halmaza, amelyeknél f és g legkisebb fokú tagja azonos előjelű (vagy pedig $f = 0$). Másképpen:

$$t \in P \iff \exists \delta \in \mathbb{R}^+ \forall a \in (0, \delta) : t(x) \geq 0.$$

Könnyen meggondolható (HF), hogy P teljesíti a pozitivitási tartományok tulajdonságait, tehát $\mathbb{R}(x)$ lineárisan rendezett test: $t_1 \geq t_2 \iff t_1 - t_2 \in P$.

Az $x \in \mathbb{R}(x)$ elem infinitezimális:

$$0 < x < \frac{1}{n} \iff x - 0 = \frac{x}{1} \in P \text{ és } \frac{1}{n} - x = \frac{1 - nx}{n} \in P. \checkmark$$

Tehát csak át kell nevezni x -et ε -ra, és máris megkapjuk az előző példában szereplő testet.

Tartalom

1. Arkhimédeszi testek
2. Teljesség
3. Tizedes törtek
4. Hipervalós számok

Dedekind-teljesség

Definíció.

A T rendezett test **Dedekind-teljes**, ha teljesülnek rá az alábbi ekvivalens feltételek:

- ▶ minden nem üres alulról korlátos $H \subseteq T$ halmaznak van infimuma;
- ▶ minden nem üres felülről korlátos $H \subseteq T$ halmaznak van szuprimuma;
- ▶ ha $T = A \dot{\cup} F$ úgy, hogy A minden eleme kisebb F minden eleménél, akkor vagy A -nak van legnagyobb eleme vagy F -nek van legkisebb eleme.

Tétel.

Minden Dedekind-teljes rendezett test arkhimédészi.

Bizonyítás.

Ha T nem arkhimédészi, akkor $\mathbb{N} \subseteq T$ felülről korlátos. Ha T Dedekind-teljes, akkor létezik $\sup \mathbb{N} =: a$. Node

$$\forall n \in \mathbb{N}: a \geq n \implies \forall n \in \mathbb{N}: a \geq n + 1 \implies \forall n \in \mathbb{N}: a - 1 \geq n.$$

Ez azt jelenti, hogy $a - 1$ is felső korlátja \mathbb{N} -nek, ami ellentmondás (miért?).



A valós számok teljessége

Tétel.

A valós számok teste Dedekind-teljes.

Bizonyítás.

A valós számok Dedekind-féle konstrukcióját használjuk. Legyen $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{R}$ nem üres alulról korlátos halmaz; be kell látnunk, hogy létezik \mathcal{H} -nak infimuma. Mivel a valós számok rendezése éppen a Dedekind szeletek *fordított irányú* tartalmazása, ha az $(\mathcal{R}; \leq)$ rendezett halmazról áttérünk a $(\mathcal{R}; \supseteq)$ rendezett halmazra, akkor minden a feje tetejére áll: \mathcal{H} felülről korlátos, és a szuprémumát keressük.

Legyen $X \subseteq \mathbb{Q}$ az összes \mathcal{H} -beli elem uniója. Ekkor X vagy szelet vagy $X = \mathbb{Q}$. Node az utóbbi lehetetlen, hiszen \mathcal{H} -nak van felső korlátja \mathcal{R} -ben, és az valódi részhalmaza \mathbb{Q} -nak. Ezzel beláttuk, hogy $X \in \mathcal{R}$.

Világos, hogy X a legszűkebb olyan halmaz, ami tartalmazza \mathcal{H} minden elemét, tehát X lesz \mathcal{H} szuprémuma a \supseteq rendezésre nézve, és így X lesz \mathcal{H} infimuma a \leq rendezésre nézve. □

Következmény.

A valós számok teste arkhimédészi.

Csak egy maradhat

Tétel.

Ha T Dedekind-teljes rendezett test, akkor $T \cong \mathcal{R}$.

Bizonyítás.

Legyen T Dedekind-teljes (és így arkhimédeszi) rendezett test; a szokott módon feltehetjük, hogy $\mathbb{Q} \subseteq T$. Tetszőleges $a \in T$ esetén legyen \ddot{U}_a az a -nál nagyobb racionális számok halmaza:

$$\ddot{U}_a = \{r \in \mathbb{Q} : r > a\}.$$

Mivel T arkhimédeszi, \ddot{U}_a Dedekind-szelet:

$$\begin{aligned} \text{(NVRH): } a \notin V^+ &\implies \ddot{U}_a \neq \emptyset; \\ a \notin V^- &\implies \ddot{U}_a \neq \mathbb{Q}; \end{aligned}$$

(FSZ): triviális;

(NLK): $a = \inf \ddot{U}_a$ miatt a legkisebb elem csak a lehetne, de $a \notin \ddot{U}_a$.

Csak egy maradhat

Bizonyítás. (folyt.)

Tehát kaptunk egy $\ddot{U}: T \rightarrow \mathcal{R}$, $a \mapsto \ddot{U}_a$ leképezést. Ez a leképezés injektív:

$$\begin{aligned} a < b &\implies \exists r \in \mathbb{Q} : a < r < b \\ &\implies \exists r \in \mathbb{Q} : r \in \ddot{U}_a \setminus \ddot{U}_b \implies \ddot{U}_a \neq \ddot{U}_b \quad (\text{sőt } \ddot{U}_a \supset \ddot{U}_b). \end{aligned}$$

Meg lehet mutatni, hogy \ddot{U} felcserélhető az összeadással és a szorzással:

$$\ddot{U}_{a+b} = \ddot{U}_a + \ddot{U}_b \quad \text{és} \quad \ddot{U}_{a \cdot b} = \ddot{U}_a \cdot \ddot{U}_b \quad \text{minden } a, b \in T \text{ esetén.}$$

Ezzel beláttuk, hogy \ddot{U} (monoton) beágyazás.

Be kell még látni, hogy \ddot{U} szürjektív. Tetszőleges $X \in \mathcal{R}$ Dedekind-szeletet tekinthetünk T részhalmazának (hiszen $X \subseteq \mathbb{Q} \subseteq T$). Mivel T Dedekind-teljes, létezik $a := \inf X \in T$. Világos, hogy ekkor $\ddot{U}_a = X$. □

Következmény.

Ha T arkhimédeszi rendezett test, akkor T izomorf a valós számok egy résztestével. Fordítva, \mathbb{R} minden részteste arkhimédeszi.

Cauchy-teljesség

Definíció.

Az $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq T$ sorozat **konvergens**, ha

$$\exists a \in T \forall \delta \in T^+ \exists \nu \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : n \geq \nu \implies |a_n - a| < \delta.$$

Definíció.

Az $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq T$ sorozat **Cauchy-sorozat**, ha

$$\forall \delta \in T^+ \exists \nu \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} : n, m \geq \nu \implies |a_n - a_m| < \delta.$$

Könnyen látható, hogy minden Cauchy-sorozat konvergens, de fordítva ez nem mindig igaz.

Definíció.

A T rendezett test **Cauchy-teljes**, ha minden $\{a_n\} \subseteq T$ Cauchy-sorozat konvergens.

Teljességi axiómák (nem) teljes listája

Tétel.

Tetszőleges T arkhimédészi rendezett test esetén ekvivalensek az alábbiak:

(1) T Dedekind-teljes;

(2) T -ben minden monoton korlátos sorozat konvergens;

(3) $T \supseteq [a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \dots \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset$;

(4) T -ben minden korlátos sorozatnak van torlódási pontja;

(5) T Cauchy-teljes.

Megjegyzés.

A tétel egy része igaz marad akkor is, ha nem tesszük fel, hogy T arkhimédészi. Például (1) \implies (5) igaz marad, mert (1)-ből úgymint következik az arkhimédészi tulajdonság. De például (5) \implies (1) általában nem igaz (majd később látunk ellenpéldát).

Tartalom

1. Arkhimédészi testek
2. Teljesség
3. Tizedes törtek
4. Hipervalós számok

Tizedes tört

Tizedes törtön egy

$$\begin{aligned} \overline{c_{-n} \cdots c_{-1} c_0, c_1 c_2 \cdots} &= c_{-n} \cdot 10^n + \cdots + c_{-1} \cdot 10 + c_0 + c_1 \cdot \frac{1}{10} + c_2 \cdot \frac{1}{10^2} + \cdots \\ &= \sum_{k=-n}^{\infty} c_k \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^k \end{aligned}$$

alakú összeget értünk, ahol $c_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ minden $k \geq -n$ esetén.

Jelölje s_N az N -edik részletösszeget:

$$s_N = \sum_{k=-n}^N c_k \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^k.$$

A tizedes tört értékét a részletösszegek sorozatának $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N$ határértékeként értelmezzük.

Ha a c_k számjegyek valahonnan kezdve végig nullák, akkor a tizedes tört véges, egyébként pedig végtelen.

Ha van olyan p , hogy $d_{k+p} = d_k$ minden elég nagy k -ra, akkor azt mondjuk, hogy a tizedes tört periodikus (szakaszos).

Minden tizedes tört valós szám

Tétel.

A részletösszegek sorozata konvergens minden tizedes törtnél.

Bizonyítás.

AÁMNTFH $c_{-n} = \dots = c_{-1} = c_0 = 0$. Világos, hogy s_N monoton növekvő sorozat, ezért elég belátni, hogy felülről korlátos (hiszen \mathbb{R} teljes):

$$s_N \leq \sum_{k=1}^N 9 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^k = \frac{9}{10} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{10}\right)^N}{1 - \frac{1}{10}} = 1 - \left(\frac{1}{10}\right)^N \leq 1.$$



Megjegyzés.

A valós számok testében $\frac{1}{10^N} \rightarrow 0$, és így $0,999\dots = 1$. Egy nem arkhimédeszi testben viszont ez nincs így! Tehát nem teljesen ördögtől való az a „megérzés”, hogy $0,999\dots < 1$ (csak épp a valós számtestben nem igaz).

Minden valós szám tizedes tört

Tétel.

Minden z valós számhoz vannak olyan c_k számjegyek, hogy az azokból felépített tizedes törtre $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N = z$.

Bizonyítás.

AÁMNTFH $0 \leq z < 1$. Van (egyetlen) olyan $c_1 \in \{0, 1, \dots, 9\}$ számjegy, amelyre $z \in [\frac{c_1}{10}, \frac{c_1}{10} + \frac{1}{10})$. Hasonló módon folytatva a „tizedelést”, kapjuk számjegyeknek egy c_1, c_2, \dots sorozatát, és z -t tartalmazó egymásba skatulyázott intervallumoknak egy $[a_1, b_1) \supseteq [a_2, b_2) \supseteq \dots$ sorozatát, ahol

$$a_n = \overline{0, c_1 c_2 \cdots c_n} \quad \text{és} \quad b_n = a_n + \frac{1}{10^n}.$$

Az a_n sorozat éppen a $\overline{0, c_1 c_2 \cdots}$ tizedes tört részletösszegeinek sorozata, ezért $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{0, c_1 c_2 \cdots}$. Másrészt

$$a_n \leq z < a_n + \frac{1}{10^n}$$

miatt $z = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{0, c_1 c_2 \cdots}$.



Minden periodikus tizedes tört racionális szám

Példa.

$$\left. \begin{aligned} z &= 12,3456767 \dots \\ 1000z &= 12\,345,6767 \dots \\ 100\,000z &= 1\,234\,567,67 \dots \\ 99\,000z &= 1\,234\,567 - 12\,345 = 1\,222\,222 \end{aligned} \right\} \implies z = \frac{1\,222\,222}{99\,000} = \frac{611\,111}{49\,500}$$

Tétel.

Minden periodikus tizedes tört racionális szám.

Bizonyítás.

$$z = \overline{0, a_1 \dots a_m c_1 c_2 \dots c_p c_1 c_2 \dots c_p c_1 c_2 \dots c_p \dots}$$

$$10^m \cdot z = \overline{a_1 \dots a_m, c_1 c_2 \dots c_p c_1 c_2 \dots c_p c_1 c_2 \dots c_p \dots}$$

$$10^{m+p} \cdot z = \overline{a_1 \dots a_m c_1 c_2 \dots c_p, c_1 c_2 \dots c_p c_1 c_2 \dots c_p \dots}$$

$$(10^{m+p} - 10^m) \cdot z = \overline{a_1 \dots a_m c_1 c_2 \dots c_p} - \overline{a_1 \dots a_m} \in \mathbb{Z} \quad \square$$

Minden racionális szám periodikus tizedes tört

Tétel.

Minden racionális szám periodikus tizedes tört.

Bizonyítás.

Az állítás bizonyítható az „írásbeli” osztás algoritmusának elemzésével (előbb-utóbb lesz ismétlődő maradék). Íme egy másik bizonyítás:

Minden z racionális számot a tört bővítésével $z = \frac{a}{10^m b}$ alakra lehet hozni, ahol

$\text{Inko}(b, 10) = 1$. Az Euler–Fermat-tétel szerint ekkor $10^{\varphi(b)} \equiv 1 \pmod{b}$, azaz $b \mid 10^{\varphi(b)} - 1$. Ebből következik, hogy

$$z = \frac{a}{10^m b} \cdot \frac{10^{\varphi(b)} - 1}{10^{\varphi(b)} - 1} = \frac{1}{10^m (10^{\varphi(b)} - 1)} \cdot \underbrace{a \cdot \frac{10^{\varphi(b)} - 1}{b}}_{\in \mathbb{Z}}.$$

Tehát $(10^{m+\varphi(b)} - 10^m) \cdot z \in \mathbb{Z}$, ami azt jelenti, hogy z tizedes tört alakja periodikus.



Periódushossz

Megjegyzés.

A bizonyításból kiderült, hogy $\text{Ink}(b, 10) = 1$ esetén az $\frac{1}{b}$ tört tizedes tört alakja $\varphi(b)$ -periodikus. De nem mindig ez a legkisebb periódus. Például

$$\frac{1}{41} = 0,02439\ 02439\ 02439 \dots$$

legkisebb periódusa 5, míg $\varphi(41) = 40$. A bizonyítás gondolatmenetének kis módosításával belátható, hogy a legkisebb periódus nem más, mint a legkisebb olyan ℓ pozitív egész kitevő, amelyre $10^\ell \equiv 1 \pmod{b}$. Ezt az ℓ kitevőt nevezzük 10 modulo b **rendjének**.

Megjegyzés.

Mindezek 10-es helyett tetszőleges számrendszerben is meggondolhatók. Például $\frac{1}{b}$ legkisebb periódusa a számrendszer alapszámának modulo b rendje lesz. A számrendszer alapjának függvényében azt is meg lehet állapítani, hogy mely racionális számok kifejtése lesz tiszta, illetve vegyes szakaszos (HF).

$$\frac{1}{1} = 1, 00000000000000000000000000000000 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{2} = 0, 5 00000000000000000000000000000000 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{3} = 0, 33333333333333333333333333333333 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{4} = 0, 25 00000000000000000000000000000000 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{5} = 0, 2 00000000000000000000000000000000 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{6} = 0, 1 66666666666666666666666666666666 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{7} = 0, 142857 142857 142857 142857 142857 14 \dots \rightarrow 6$$

$$\frac{1}{8} = 0, 125 00000000000000000000000000000000 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{9} = 0, 11111111111111111111111111111111 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{10} = 0, 1 00000000000000000000000000000000 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{11} = 0, 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 0 \dots \rightarrow 2$$

$$\frac{1}{12} = 0, 08 33333333333333333333333333333333 \dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{13} = 0, 076923 076923 076923 076923 076923 076 \dots \rightarrow 6$$

$$\frac{1}{14} = 0, 0 714285 714285 714285 714285 714285 7 \dots \rightarrow 6$$

$$\frac{1}{29} = 0,0344827586206896551724137931\ 03448275\dots \rightarrow 28$$

$$\frac{1}{30} = 0,0\ 33333333333333333333333333333333\dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{31} = 0,032258064516129\ 032258064516129\ 03225\dots \rightarrow 15$$

$$\frac{1}{32} = 0,03125\ 00000000000000000000000000000000\dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{33} = 0,03\ 03\ 03\ 03\ 03\ 03\ 03\ 03\ 03\ 03\ 03\ 03\ 03\dots \rightarrow 2$$

$$\frac{1}{34} = 0,0\ 2941176470588235\ 2941176470588235\ 29\dots \rightarrow 16$$

$$\frac{1}{35} = 0,0\ 285714\ 285714\ 285714\ 285714\ 285714\ 28\dots \rightarrow 6$$

$$\frac{1}{36} = 0,02\ 77777777777777777777777777777777\dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{37} = 0,027\ 027\ 027\ 027\ 027\ 027\ 027\ 027\ 027\ 027\ 0\dots \rightarrow 3$$

$$\frac{1}{38} = 0,0\ 263157894736842105\ 26315789473684210\dots \rightarrow 18$$

$$\frac{1}{39} = 0,025641\ 025641\ 025641\ 025641\ 025641\ 0255\dots \rightarrow 6$$

$$\frac{1}{40} = 0,025\ 00000000000000000000000000000000\dots \rightarrow 1$$

$$\frac{1}{41} = 0,02439\ 02439\ 02439\ 02439\ 02439\ 02439\ 024\dots \rightarrow 5$$

$$\frac{1}{42} = 0,0\ 238095\ 238095\ 238095\ 238095\ 238095\ 23\dots \rightarrow 6$$

Tartalom

1. Arkhimédeszi testek
2. Teljesség
3. Tizedes törtek
4. Hipervalós számok

Laurent-sorok

Az $\mathbb{R}(\varepsilon)$ test (racionális törtek megfelelő rendezéssel) nem Cauchy-teljes. Hogy teljessé tegyük, polinomok (véges összegek) helyett Laurent-sorokat (végtelen összegeket) kell tekintenünk.

Definíció.

A valós számtest feletti **formális Laurent-soron** olyan $\sum a_k x^k$ ($a_k \in \mathbb{R}$) alakú formális kifejezést értünk, amelyben az a_k együttható csak véges sok negatív k index esetén nem nulla (pozitív indexű együtthatóból lehet végtelen sok nem nulla):

$$\ell = \sum_{k=-n}^{\infty} a_k \cdot x^k.$$

A formális Laurent-sorok halmazát $\mathbb{R}((x))$ jelöli.

Tétel.

A formális Laurent-sorok testet alkotnak.

Példa.

$$(1 - x)^{-1} = 1 + x + x^2 + \dots$$

A Laurent-sorok rendezése

Azt szeretnénk, hogy x infinitezimálisan kicsi legyen, ezért ezentúl ε -t írunk helyette:

$$l = a_{-n} \cdot \frac{1}{\varepsilon^n} + \cdots + a_{-1} \cdot \frac{1}{\varepsilon} + a_0 + a_1 \cdot \varepsilon + a_2 \cdot \varepsilon^2 + \cdots .$$

Legyen P azon Laurent-sorok halmaza, amelyekben a legkisebb fokszámú tag együtthatója nemnegatív, és definiáljuk a rendezést szokásos módon:

$$l_1 \geq l_2 \iff l_1 - l_2 \in P.$$

Tétel.

A fent definiált rendezéssel $\mathbb{R}((\varepsilon))$ Cauchy-teljes rendezett test, amelyben ε infinitezimális elem.

Megjegyzés.

Mivel $\mathbb{R}((\varepsilon))$ tartalmaz infinitezimális elemet, nem arkhimédeszi, így nem lehet Dedekind-teljes sem. Ez a példa mutatja, hogy a Cauchy-teljességből nem következik a Dedekind-teljeség (csak akkor, ha feltesszük még az arkhimédeszi tulajdonságot is).

A Laurent-sorok kevesen vannak

A Laurent-sorok testében a következő „nagyságrendek” fordulnak elő:

$$\dots \gg \frac{1}{\varepsilon^2} \gg \frac{1}{\varepsilon} \gg 1 \gg \varepsilon \gg \varepsilon^2 \gg \dots .$$

Hiányolhatjuk $\sqrt{\varepsilon}$ -t (és még sok minden mást); nem is csak mint nagyságrendet, hanem konkrétan, mint az ε elem négyzetgyökét: az $\mathbb{R}((\varepsilon))$ testben nincs minden pozitív elemnek négyzetgyöke. Ezen lehet segíteni újabb (nagyon sok) elem hozzávételével...

Ultraszűrők

Definíció.

Legyen $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$, azaz \mathcal{U} természetes számokból álló halmazok egy családja. Azt mondjuk, hogy \mathcal{U} **ultraszűrő**, ha rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{U}$ és $\mathbb{N} \in \mathcal{U}$;
- ▶ $\forall U \in \mathcal{U} \forall I \subseteq \mathbb{N}: I \supseteq U \implies I \in \mathcal{U}$;
- ▶ $\forall U_1, U_2 \in \mathcal{U}: U_1 \cap U_2 \in \mathcal{U}$;
- ▶ $\forall I \subseteq \mathbb{N}: I \in \mathcal{U}$ vagy $\mathbb{N} \setminus I \in \mathcal{U}$.

Állítás.

Ha \mathcal{U} ultraszűrő, $I, J \subseteq \mathbb{N}$ és $I \cup J \in \mathcal{U}$, akkor I és J közül az egyik \mathcal{U} -ban van.

Példa.

Tetszőleges rögzített $n \in \mathbb{N}$ esetén az n -et tartalmazó halmazok halmaza ultraszűrő. Az ilyen szűrőt **triviálisnak** nevezzük.

Állítás.

Ha \mathcal{U} nemtriviális ultraszűrő, akkor \mathcal{U} -ban csak végtelen halmazok vannak.

Ultrahatvány

Definíció.

Bevezetünk egy ekvivalenciarelációt a valós számsorozatok $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ halmazán:

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \sim \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \iff \{n \in \mathbb{N} : a_n = b_n\} \in \mathcal{U}.$$

Tétel.

Ha \mathcal{U} nemtriviális ultraszűrő, akkor \sim ekvivalenciareláció, sőt kongruenciája az $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}; +, \cdot)$ gyűrűnek, és a megfelelő faktorgyűrű rendezett test a következő rendezéssel:

$$\overline{\{a_n\}_{n=1}^{\infty}} \leq \overline{\{b_n\}_{n=1}^{\infty}} \iff \{n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n\} \in \mathcal{U}.$$

Az $a \mapsto \overline{\{a\}_{n=1}^{\infty}}$ leképezés beágyazza \mathbb{R} -et ebbe a testbe.

Megjegyzés.

Ha igaz a kontinuumhipotézis, akkor a kapott faktortest (izomorfia erejéig) független az ultraszűrő megválasztásától.

Hipervalós számok

Az előző konstrukció által szolgáltatott testet (vagy azok bármelyikét) ${}^*\mathbb{R}$ -rel jelöljük; ez a **hipervalós számok** teste. Ezen a testen pontosan ugyanazok az *elsőrendű* kijelentések igazak, mint a valós számok testén; például

$$\forall x: x \geq 0 \implies \exists y: y^2 = x.$$

Nem csak \sqrt{x} , hanem minden valós függvény egyértelműen kiterjed ${}^*\mathbb{R}$ -ra.

Minden h véges hipervalós számhoz ($|h| \ll 1$) létezik egy egyértelműen meghatározott $\text{st}(h)$ valós szám, amely infinitezimálisan közel van h -hoz:

$$\text{st}(h) = \inf \{a \in \mathbb{R} : a > h\}.$$

Az $\text{st}(h)$ valós számot a h hipervalós szám **standard részének** nevezzük.

A hipervalósakra épülő *nemstandard analízisben* például így fest a derivált fogalma: Az f függvény deriváltja az a pontban b , ha

$$b = \text{st} \left(\frac{f(a + \varepsilon) - f(a)}{\varepsilon} \right)$$

teljesül minden nullától különböző infinitezimális ε -ra.