
ALGERBA ÉS SZÁMELMÉLET

MBNK13G

2. FELADATSOR

POLINOMOK

2.1. Feladat. Határozzuk meg a f és a g polinomok legnagyobb közös osztóját euklideszi algoritmus segítségével a megadott polinomgyűrűkben.

- (a) $f = 2x^4 - 3x^3 - 2x^2 + 2x - 1$, $g = 2x^3 - x^2 - 4x - 1$, $\mathbb{Q}[x]$;
- (b) $f = x^5 + x^4 + x^3 + \bar{1}$, $g = x^4 + \bar{1}$, $\mathbb{Z}_2[x]$;
- (c) $f = x^3 - x^2 - 5x - 3$, $g = x^4 + 3x^3 + x^2 - 3x - 2$, $\mathbb{Q}[x]$;
- (d) $f = -x^4 - 4x^3 + 34x^2 + 76x - 105$, $g = x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 6x - 7$, $\mathbb{Q}[x]$;
- (e) $f = x^5 + x + \bar{2}$, $g = x^4 + \bar{2}x^2 + \bar{2}x + \bar{1}$, $\mathbb{Z}_3[x]$;
- (f) $f = \bar{4}x^4 + \bar{2}x^3 + x^2 + x + \bar{2}$, $g = \bar{2}x^4 + \bar{3}x^2 + \bar{1}$, $\mathbb{Z}_5[x]$.

MEGOLDÁS.

- (a) $x + 1$;
- (b) $x^2 + \bar{1}$
- (c) $x^2 + 2x + 1$;
- (d) $x^2 + 6x - 7$;
- (e) $x^3 + x^2 + \bar{2}$
- (f) $\bar{2}x^2 + \bar{1}$.

2.2. Feladat. Oldjuk meg az u, v ismeretlen polinomokra az alábbi egyenleteket a megadott polinomgyűrűben.

- (a) $(x^2 - 2x - 3)u + (x^2 + 2x - 15)v = x^2 - 3x$, $\mathbb{R}[x]$;
- (b) $(x^5 + x^4 + x^3 + \bar{1})u + (x^4 + \bar{1})v = x^2 + \bar{1}$, $\mathbb{Z}_2[x]$;
- (c) $(x^4 + x^3 + x + \bar{1})u + (x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{2}x + \bar{1})v = x^2 + x$, $\mathbb{Z}_5[x]$;
- (d) $(x^5 + x + \bar{2})u + (x^4 + \bar{2}x^2 + \bar{2}x + \bar{1})v = x^3 + x^2 + \bar{2}$, $\mathbb{Z}_3[x]$.

MEGOLDÁS.

- (a) Egy megoldás: $u_0 = -\frac{1}{4}x$, $v_0 = \frac{1}{4}x$,
általános: $u = -\frac{1}{4}x + (x + 5)t$, $v = \frac{1}{4}x - (x + 1)t$, $t \in \mathbb{R}[x]$;
- (b) Egy megoldás: $u_0 = x$, $v_0 = x^2 + x + 1$,
általános: $u = x + (x^2 + 1)t$, $v = x^2 + x + 1 + (x^3 + x^2 + 1)t$, $t \in \mathbb{Z}_2[x]$;
- (c) Egy megoldás: $u_0 = 3x$, $v_0 = 2x^2 + 3x$,
általános: $u = 3x + (3x^2 + 3x + 3)t$, $v = 2x^2 + 3x + (2x^3 + 2)t$, $t \in \mathbb{Z}_5[x]$;
- (d) Egy megoldás: $u_0 = 1$, $v_0 = 2x$,
általános: $u = 1 + (x + 2)t$, $v = 2x + (2x^2 + x + 2)t$, $t \in \mathbb{Z}_3[x]$.

2.3. Feladat. Oldjuk meg az $fu \equiv g \pmod{m}$ kongruenciát, majd fogalmazzuk át a feladatot és a kapott eredményt a maradékosztály-gyűrűk nyelvére.

- (a) $f = x - 1, g = x^2, m = x^3 + 1 \in \mathbb{Q}[x];$
- (b) $f = x^2 + 2, g = x, m = x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{R}[x];$
- (c) $f = x^2 + 1, g = 1, m = x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbb{R}[x];$
- (d) $f = x^2 + \bar{1}, g = \bar{1}, m = x^3 + x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_2[x];$
- (e) $f = x^2 + \bar{3}x + \bar{1}, g = \bar{1}, m = x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{4}x + \bar{2} \in \mathbb{Z}_5[x];$
- (f) $f = \bar{3}x^2 + \bar{2}, g = \bar{0}, m = x^3 + x + \bar{1} \in \mathbb{Z}_5[x];$
- (g) $f = \bar{3}x^2 + \bar{2}, g = \bar{1}, m = x^3 + x + \bar{1} \in \mathbb{Z}_5[x].$

MEGOLDÁS.

- (a) $u \equiv -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2};$
- (b) $u \equiv \frac{1}{3}x^2 + x + \frac{1}{3};$
- (c) nem létezik;
- (d) $u \equiv x^2 + x + \bar{1};$
- (e) $u \equiv x^2 + \bar{4}x + \bar{1};$
- (f) $u \equiv \bar{0};$
- (g) $u \equiv \bar{2}x^2 + \bar{4}x + \bar{4}.$

2.4. Feladat. Végezzük el a következő műveleteket a K maradékosztály-gyűrűben.

- (a) $K = \mathbb{Z}_{17}; \quad \bar{16} \cdot \bar{10}, \quad \bar{3}^{-1};$
- (b) $K = \mathbb{Z}_3[x]/\langle x^3 + x^2 + \bar{2} \rangle; \quad \overline{x + \bar{2} + x^2 + \bar{2}x + \bar{1}}, \quad \overline{x^2 + \bar{2}x + \bar{1} \cdot x + \bar{2}};$
- (c) $K = \mathbb{Z}_2[x]/\langle x^4 + x^3 + \bar{1} \rangle; \quad \overline{x^3 + x + \bar{1} \cdot x^2 + \bar{1}}, \quad \overline{x^3 + x^2}^{-1};$
- (d) $K = \mathbb{Z}_3[x]/\langle x^3 + \bar{2}x^2 + x + \bar{1} \rangle; \quad \overline{x^2 + \bar{2}x + \bar{1} \cdot x^2 + \bar{2}}, \quad \overline{x^2 + \bar{2}x + \bar{1}}^{-1}.$

MEGOLDÁS.

- (a) szorzat: $\bar{7}$, inverz: $\bar{6}$;
- (b) összeg: $\overline{x^2}$, szorzat: $\overline{\bar{2}x}$;
- (c) szorzat: $\overline{x^3 + x^2}$, inverz: $\bar{x}$;
- (d) szorzat: $\overline{\bar{2}x^2 + \bar{2}}$, inverz: $\overline{\bar{2}x}.$

2.5. Feladat. Határozzuk meg az $a, b \in \mathbb{R}$ együtthatók értékét úgy, hogy teljesüljön az oszthatóság $\mathbb{R}[x]$ -ben.

- (a) $(x - 1)(x + 2) \mid ax^3 + x^2 + bx + 3;$
- (b) $(x - 2)(x + 1) \mid ax^3 - x^2 + bx + 4;$
- (c) $(x - 2)(x - 3) \mid ax^3 + bx^2 + x - 4;$
- (d) $(x + 1)(x + 2) \mid x^3 + ax^2 + bx - 1.$

MEGOLDÁS.

- (a) $\alpha = \frac{5}{2}, \beta = -\frac{13}{2};$
- (b) $\alpha = -1, \beta = 4;$
- (c) $\alpha = -\frac{7}{18}, \beta = \frac{23}{18};$
- (d) $\alpha = \frac{5}{2}, \beta = \frac{1}{2}.$

2.6. Feladat. Határozzuk meg, hogy hány-szoros gyöke az f polinomnak a c szám a megadott polinomgyűrűben, majd ennek segítségével alakítsuk szorzattá az f polinomot.

- (a) $f = x^5 - 6x^4 + 11x^3 - 11x^2 + 12x + 9, \quad c = 3, \quad \mathbb{Q}[x];$
- (b) $f = x^5 - 8x^4 + 16x^3 + 18x^2 - 81x + 54, \quad c = 3, \quad \mathbb{R}[x];$
- (c) $f = x^5 - 3ix^4 - 5x^3 + 7ix^2 + 6x - 2i, \quad c = i, \quad \mathbb{C}[x];$
- (d) $f = x^4 + \bar{2}x^3 + x + \bar{2}, \quad c = \bar{2}, \quad \mathbb{Z}_3[x].$

MEGOLDÁS.

- (a) kétszeres; $(x - 3)^2(x^3 + 2x + 1);$
- (b) háromszoros; $(x - 3)^3(x^2 + x - 2);$
- (c) háromszoros; $(x - i)^3(x^2 - 2);$
- (d) háromszoros; $(x - \bar{2})^3(x + \bar{2}).$

2.7. Feladat. Lagrange-interpolációval adjunk meg egy polinomot, mely illeszkedik a következő pontokra:

- (a) $A(-1, 1), B(2, 4), C(3, 9);$
- (b) $A(1, 3), B(2, 8), C(4, 12);$
- (c) $A(-2, -6), B(1, 0), C(3, 14);$
- (d) $A(-1, 2), B(0, 0), C(1, 4), D(4, 0).$

MEGOLDÁS.

- (a) $x^2;$
- (b) $-x^2 + 8x - 4;$
- (c) $x^2 + 3x - 4;$
- (d) $-\frac{13}{15}x^3 + 3x^2 + \frac{28}{15}x.$

2.8. Feladat. Adjuk meg a következő polinomok irreducibilis felbontását a megadott polinomgyűrűben.

- (a) $x^6 + \bar{3}x^4 - x^3 + \bar{2}x^2 + x - \bar{1} \in \mathbb{Z}_5[x]$
- (b) $x^5 + x^4 + \bar{2}x^3 + x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_3[x]$
- (c) $x^5 + x^4 + \bar{2}x^3 + \bar{2}x + \bar{1} \in \mathbb{Z}_3[x]$
- (d) $x^5 + x^4 + \bar{2}x^3 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_5[x]$
- (e) $x^5 + x^3 + \bar{4}x^2 + \bar{4} \in \mathbb{Z}_5[x]$

MEGOLDÁS.

- (a) $(x - \bar{1})^2(x - \bar{3})(x - \bar{4})(x^2 + \bar{4}x + \bar{2})$
- (b) $(x - \bar{1})(x - \bar{2})(x^3 + x^2 + \bar{2})$

- (c) $(x - \bar{2})^2(x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{1})$
 (d) $(x - \bar{2})(x - \bar{1})^2(x^2 + \bar{2})$
 (e) $(x - \bar{1})(x - \bar{2})(x - \bar{3})(x^2 + x + \bar{1})$

2.9. Feladat. Adjuk meg a következő polinomok irreducibilis felbontását a $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ és $\mathbb{C}$ testek felett.

- (a) $x^5 + x^3 - 6x$;
 (b) $x^3 - 8$;
 (c) $x^5 + 8x^2$;
 (d) $x^4 - 25$;
 (e) $x^6 - 27$;
 (f) $x^6 - 2x^4 - 8x^2$.

MEGOLDÁS.

- (a) $x(x^2 + 3)(x^2 - 2)$ ($\mathbb{Q}$ felett), $x(x^2 + 3)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ ($\mathbb{R}$ felett),
 $x(x - i\sqrt{3})(x + i\sqrt{3})(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$ ($\mathbb{C}$ felett);
 (b) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ ($\mathbb{Q}$ és $\mathbb{R}$ felett), $(x - 2)(x + 1 - i\sqrt{3})(x + 1 + i\sqrt{3})$ ($\mathbb{C}$ felett);
 (c) $x^2(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ ($\mathbb{Q}$ és $\mathbb{R}$ felett), $x^2(x + 2)(x - 1 + i\sqrt{3})(x - 1 - i\sqrt{3})$ ($\mathbb{C}$ felett);
 (d) $(x^2 + 5)(x^2 - 5)$ ($\mathbb{Q}$ felett), $(x^2 + 5)(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})$ ($\mathbb{R}$ felett),
 $(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})(x - i\sqrt{5})(x + i\sqrt{5})$ ($\mathbb{C}$ felett);
 (e) $(x^2 - 3)(x^4 + 3x^2 + 9)$ ($\mathbb{Q}$ felett),
 $(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})(x^2 - \sqrt{3}x + 3)(x^2 + \sqrt{3}x + 3)$ ($\mathbb{R}$ felett),
 $(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})(x - \frac{\sqrt{3}-3i}{2})(x - \frac{\sqrt{3}+3i}{2})(x + \frac{\sqrt{3}-3i}{2})(x + \frac{\sqrt{3}+3i}{2})$ ($\mathbb{C}$ felett);
 (f) $x^2(x + 2)(x - 2)(x^2 + 2)$ ($\mathbb{Q}$ és $\mathbb{R}$ felett), $x^2(x + 2)(x - 2)(x - i\sqrt{2})(x + i\sqrt{2})$ ($\mathbb{C}$ felett).

2.10. Feladat. Határozzuk meg az $f \in \mathbb{C}[x]$ polinom gyökeinek összegét és szorzatát. (Minden gyököt a multiplicitásának megfelelő számban vegyünk figyelembe.)

- (a) $f = x^5 - 3x^4 + 2x^2 + x + 4$;
 (b) $f = x^4 + 2x^2 - 3x + 2$;
 (c) $f = x^{17} + 2x^{16} + 3x^5 - 4x^2 + 15x$;
 (d) $f = x^{2021} + x^4 + 3x^2 - x + 5$;
 (e) $f = 3x^5 - 4x^4 + 2x^2 + 6x + 2$;
 (f) $f = 8x^7 + 6x^6 - 2x^3 + 7x - 2$.

MEGOLDÁS. Az $f \in \mathbb{C}[x]$ polinom gyökeinek összege (o) és szorzata (sz).

- (a) $o = 3$, $sz = -4$;
 (b) $o = 0$, $sz = 2$;
 (c) $o = -2$, $sz = 0$;
 (d) $o = 0$, $sz = -5$;
 (e) $o = \frac{4}{3}$, $sz = -\frac{2}{3}$;
 (f) $o = -\frac{3}{4}$, $sz = \frac{1}{4}$.

2.11. Feladat. Adjunk meg minimális fokszámú $f \in \mathbb{R}[x]$ polinomot, amelynek

- (a) a 2 kétszeres, a -1 és a $2 + i$ egyszeres gyöke;
- (b) az i háromszoros, a $3 + i$ egyszeres gyöke;
- (d) az $1 + i$ háromszoros, a -2 kétszeres, az i egyszeres gyöke.

MEGOLDÁS.

- (a) $(x - 2)^2(x + 1)(x - (2 + i))(x - (2 - i)) = (x - 2)^2(x + 1)(x^2 - 4x + 5);$
- (b) $(x - i)^3(x + i)^3(x - (3 + i))(x - (3 - i)) = (x^2 + 1)^3(x^2 - 6x + 10);$
- (c) $(x - (1 + i))^3(x - (1 - i))^3(x + 2)^2(x - i)(x + i) = (x^2 - 2x + 2)^3(x + 2)^2(x^2 + 1).$

2.12. Feladat. Határozzuk meg az alábbi $f \in \mathbb{Q}[x]$ polinomok racionális gyökeit és irreducibilis felbontásukat $\mathbb{Q}[x]$ -ben.

- (a) $f = x^3 - x^2 - x - 2;$
- (b) $f = 2x^5 - x^4 - 2x^3 + x^2 - 4x + 2;$
- (c) $f = 4x^4 + 6x^3 + 2x^2 - 8x - 4.$

MEGOLDÁS.

- (a) Rac. gyök: 2, $(x - 2)(x^2 + x + 1);$
- (b) Rac. gyök: $1/2$, $(x^2 + 1)(x^2 - 2)(2x - 1);$
- (c) Rac. gyök: 1, $-1/2$, $2(x - 1)(2x + 1)(x^2 + 2x + 2).$

2.13. Feladat. Igazoljuk, hogy az alábbi $f \in \mathbb{Q}[x]$ polinomok irreducibilisek.

- (a) $f = 2x^{100} - 3x^{73} + 69x - 12;$
- (b) $f = 41x^{41} - 30x^{30} + 20x^{20} - 10;$
- (c) $f = 5x^4 + 22x - 11.$

MEGOLDÁS.

- (a) Schönemann-Eisenstein tétel, $p = 3;$
- (b) Schönemann-Eisenstein tétel, $p = 2$ vagy $p = 5;$
- (c) Schönemann-Eisenstein tétel, $p = 11.$

2.14. Feladat. Döntsük el, hogy a megadott T test, és ezen test feletti m polinom esetén $T[x]/\langle m \rangle$ testet alkot-e. Mennyi az elemszáma/számossága?

- (a) $T = \mathbb{Z}_2$, $m = x^2 + x + \bar{1};$
- (b) $T = \mathbb{Z}_2$, $m = x^2 + \bar{1};$
- (c) $T = \mathbb{Z}_3$, $m = x^2 + \bar{1};$
- (d) $T = \mathbb{Z}_3$, $m = x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{2};$
- (e) $T = \mathbb{Z}_3$, $m = x^3 + \bar{2}x + \bar{1};$
- (f) $T = \mathbb{Z}_2$, $m = x^4 + x^3 + \bar{1};$
- (g) $T = \mathbb{Z}_2$, $m = x^4 + x^2 + \bar{1};$
- (h) $T = \mathbb{R}$, $m = x^{2023} + 2024x^{456} + x + 3;$

- (i) $T = \mathbb{R}$, $m = x^3 + x^2 + x + 21$;
- (j) $T = \mathbb{R}$, $m = x^2 + x + 2$.

MEGOLDÁS.

- (a) igen, 4-elemű test;
- (b) nem ($\bar{1}$ gyöke m -nek), 4-elemű gyűrű;
- (c) igen, 9-elemű test;
- (d) nem ($\bar{2}$ gyöke m -nek), 27-elemű gyűrű;
- (e) igen, 27-elemű test;
- (f) igen, 16-elemű test;
- (g) nem ($x^2 + x + \bar{1}$ négyzete m);
- (i) nem ($\mathbb{R}$ felett az irreducibilis polinomok legfeljebb másodfokúak), kontinuum számosságú;
- (j) nem ($\mathbb{R}$ felett az irreducibilis polinomok legfeljebb másodfokúak), kontinuum számosságú;
- (k) igen, kontinuum számosságú.

2.15. Feladat. Határozzuk meg az $a, b \in \mathbb{R}$ együtthatók értékét úgy, hogy teljesüljön az oszthatóság $\mathbb{R}[x]$ -ben.

- (a) $(x - 1)^2 \mid x^4 + ax^3 + bx^2 - 4x + 2$;
- (b) $(x + 1)^2 \mid x^4 + ax^3 + bx^2 + 6x + 3$;
- (c) $(x + 2)^2 \mid x^4 + ax^3 + bx^2 + 4$.

MEGOLDÁS.

- (a) $a = -2$, $b = 3$;
- (b) $a = 2$, $b = 4$;
- (c) $a = 3$, $b = 1$.

2.16. Feladat. Keressük meg a következő polinomok többszörös gyökeit.

- (a) $x^6 - 6x^4 - 4x^3 + 9x^2 + 12x + 4$;
- (b) $x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$.

MEGOLDÁS.

- (a) $2, -1$;
- (b) -1 .

2.17. Feladat. Döntsük el, hogy igazak-e az alábbi állítások. A választ minden esetben indokolni kell!

- (a) Bármely $a, b, c \in \mathbb{R}$ számokra létezik olyan $f \in \mathbb{R}[x]$ másodfokú polinom, melyre $f(0) = a$, $f(1) = b$ és $f(2) = c$.
- (b) Tetszőleges $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ leképezéshez létezik olyan $\mathbb{R}[x]$ -beli polinom, amelynek éppen f a polinomfüggvénye.
- (c) Tetszőleges $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ leképezéshez legfeljebb egy olyan $\mathbb{R}[x]$ -beli polinom létezik, amelynek éppen f a polinomfüggvénye.

- (d) Tetszőleges p prímszám esetén minden $f: \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$ leképezéshez létezik olyan $\mathbb{Z}_p[x]$ -beli polinom, amelynek éppen f a polinomfüggvénye.
- (e) Ha egy legalább elsőfokú polinom irreducibilis $T[x]$ -ben, akkor nincsen gyöke T -ben (T tetszőleges test).
- (f) Ha egy $\mathbb{C}$ feletti polinom irreducibilis, akkor van gyöke.
- (g) Van olyan egész együtthatós főpolinom, amelynek nem minden racionális gyöke egész.
- (h) Nincs 2020-adfokú irreducibilis polinom a racionális együtthatós polinomok körében.
- (i) Ha egy polinom relatív prím a deriváltjához, akkor nincsen többszörös gyöke.

MEGOLDÁS.

(a) nem; (b) nem; (c) igen; (d) igen; (e) nem; (f) igen; (g) nem; (h) nem; (i) igen.

SZORGALMI FELADATOK

2.18. Feladat. Adjuk meg azokat az $f, g \in \mathbb{Z}_2[x]$ polinomokat, amelyeknek legnagyobb közös osztója $x + \bar{1}$, a legnagyobb közös osztó keresésekor az euklideszi algoritmus során 3 maradékos osztást végeztünk, és minden hányados x volt.

2.19. Feladat. Adjunk példát olyan $f, g \in \mathbb{R}[x]$ polinomokra, amelyre $\text{lko}(f, g) = x^2 + 1$, és a legnagyobb közös osztó keresésekor az euklideszi algoritmus során 4 maradékos osztást végeztünk, azaz a 3. osztásnál kaptuk a legutolsó nemnulla maradékot. Igazoljuk is!

2.20. Feladat. Adjuk meg az $a \in \mathbb{C}$ értékét úgy, hogy az $x^3 - (a + 1)x + 2$ és az $x^2 - ax + 1$ komplex együtthatós polinomoknak legyen közös gyöke.

2.21. Feladat. Határozzuk meg az $x^n - 1$ és az $x^m - 1$ komplex együtthatós polinomok legnagyobb közös osztóját tetszőleges $n, m \in \mathbb{N}$ esetén.

2.22. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + x + 1 \mid x^{3k} + x^{3m+1} + x^{3n+2}$ teljesül $\mathbb{C}[x]$ -ben tetszőleges $k, m, n \in \mathbb{N}$ esetén.

2.23. Feladat. Bézout tételének segítségével vizsgáljuk meg, hogy teljesül-e a $g \mid f$ oszthatóság a $g = x^2 - 1$ és $f = x^{17} - x^{16} + x^{15} - x^{14} + x^7 - x^3 + x - 1$ polinomokra a $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}_3$, illetve $\mathbb{Z}_7$ testek fölött.

2.24. Feladat. Határozzuk meg az $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{C}[x]$ n -ed fokú nem konstans polinom gyökeinek négyzetösszegét a polinom együtthatóinak segítségével.

2.25. Feladat. Adjuk meg az a, b együtthatókat úgy, hogy $(x - 1)^2 \mid ax^{n+1} + bx^n + 1$ teljesüljön.

2.26. Feladat. Adjuk meg az összes olyan $a \in \mathbb{C}$ együtthatót, amely esetén az $x^4 - 4x + a \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak van többszörös gyöke.

2.27. Feladat. Hány másodfokú irreducibilis főpolinom van $\mathbb{Z}_p[x]$ -ben?

2.28. Feladat. Számítsuk ki az $(x - \bar{1})(x - \bar{2}) \cdots (x - \overline{p-1}) \in \mathbb{Z}_p[x]$ polinomban x^{p-1} , x^{p-2} , x^{p-3} és x^0 együtthatóját, ahol $p \geq 5$ prímszám.

2.29. Feladat. Oldjuk meg az $(x^3 + x^2)u + (x^3 + x^2 + x)v + (x^3 + \bar{1})w = \bar{1}$ egyenletet a $\mathbb{Z}_2[x]$ polinomgyűrűben.

2.30. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges T test és tetszőleges $a_0, \dots, a_n \in T$, $a_0, a_n \neq 0$ elemek esetén az $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in T[x]$ polinom akkor és csak akkor irreducibilis, ha $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$ is az.

2.31. Feladat. Adjuk meg az $x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ polinom irreducibilis felbontását tetszőleges p prímszám esetén.

2.32. Feladat. Adjuk meg az $x^5 + x^3 + ax^2 + a \in T[x]$ polinom irreducibilis felbontását, ahol $T = \{0, 1, a, b\}$ a négyelemű test.

2.33. Feladat. Határozzuk meg az összes olyan p prímszámot, amelyre $x^2 + \bar{1} \mid x^{2008} - \bar{23}x^{1922} + \bar{13}x^{600} + \bar{8}$ teljesül a $\mathbb{Z}_p[x]$ polinomgyűrűben. (Útmutatás: használjuk Bézout tételét vagy magában a $\mathbb{Z}_p$ testben, vagy annak egy alkalmas bővítésében.)

- 2.34. Feladat.** Mely p prímszámok esetén van racionális gyöke az $x^4 + 2x^3 - 16x^2 + 2x + p$ polinomnak?
- 2.35. Feladat.** Adja meg az $x^p - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ polinom irreducibilis felbontását, ahol p tetszőleges prímszám. (Útmutatás: térjünk át az $y = x - 1$ határozatlanra.)
- 2.36. Feladat.** Mely komplex együtthatós polinomok oszthatók a saját deriváltjukkal?
- 2.37. Feladat.** Határozza meg az a, b paraméterek mindazon értékeit, amelyekre van háromszoros gyöke a $3x^5 - 10x^3 + ax + b \in \mathbb{C}[x]$ polinomnak.
- 2.38. Feladat.** Mely n pozitív egészekre osztható az $x^{2n} + x^n + 1$ polinom az $x^2 + x + 1$ polinommal?
- 2.39. Feladat.** Legyen f a $(k, (-1)^k)$, $k = 0, \dots, 9$ pontokra illesztett interpolációs polinom. Mennyi $f(10)$ értéke?
- 2.40. Feladat.** Legyenek $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$ az n -edik egységgyökök, és legyen $f \in \mathbb{C}[x]$ az $(\varepsilon_0, y_0), (\varepsilon_1, y_1), \dots, (\varepsilon_{n-1}, y_{n-1})$ pontokra illesztett Lagrange-féle interpolációs polinom. Igazoljuk, hogy $f(0)$ éppen az $y_0, \dots, y_{n-1}$ számok átlaga.
- 2.41. Feladat.** Bizonyítsuk be, hogy a $(0, a_0), (1, a_1), \dots, (n+1, a_{n+1})$ pontok akkor és csak akkor illeszkednek egy legfeljebb n -edfokú polinomfüggvény grafikonjára, ha
- $$\binom{n+1}{0}a_0 - \binom{n+1}{1}a_1 + \binom{n+1}{2}a_2 - \dots + (-1)^k \binom{n+1}{k}a_k + \dots + (-1)^{n+1} \binom{n+1}{n+1}a_{n+1} = 0.$$
- 2.42. Feladat.** Mutassa meg, hogy egy $f \in \mathbb{R}[x]$ polinom akkor és csak akkor vesz fel egész értéket minden egész helyen, ha előáll $\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\dots(x-(k-1))}{k!}$ alakú polinomok egész együtthatós lineáris kombinációjaként.
- 2.43. Feladat.** Határozzuk meg az egységkörbe írt szabályos n -szög egy csúcsából kiinduló átlói hosszának szorzatát. (Itt most átlónak tekintjük az oldalakat is, tehát egy csúcsból $n-1$ átló indul ki.)
- 2.44. Feladat.** Legyen $f \in \mathbb{Z}[x]$ olyan 101-edfokú polinom, amely legalább 101 egész számra ± 1 értéket vesz fel. Bizonyítsuk be, hogy f irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett.
- 2.45. Feladat.** Bizonyítsuk be, hogy az $f = x^n + ax + p$ polinom irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett bármely $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{Z}$ és p prímszám esetén, ha $p > |a| + 1$. (Útmutatás: Először mutassa meg, hogy f minden α gyökére $|\alpha| > 1$.)
- 2.46. Feladat.** Legyen $f \in \mathbb{Z}[x]$ olyan főpolinom, melynek konstans tagja nem nulla (azaz $f(0) \neq 0$). Tegyük fel, hogy f -nek egyetlen komplex gyöke van az egységkörön kívül, az összes többi gyöke az egységkör belsejében helyezkedik el (a körvonalon nincs egy gyök se). Bizonyítsuk be, hogy f irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett.
- 2.47. Feladat.** Legyenek az $f \in \mathbb{C}[x]$ polinom gyökei olyan páronként különböző komplex számok, amelyek konvex n -szöget alkotnak a komplex számsíkon. Bizonyítsuk be, hogy f' gyökei csak ennek a sokszögnek a belsejében vagy határán helyezkedhetnek el.
- 2.48. Feladat.** Mennyi lehet egy véges test összes elemének összege?
- 2.49. Feladat.** (Catan telepesei alternatív dobókockákkal.) Gyártsunk le két (szabályos, 6 oldalú) dobókockát, úgy hogy

- mindkét dobókocka minden oldalán pozitív egész számú pötty található,
- a dobókockák különböznek a hagyományos dobókockáktól, és
- ha a két kockával együtt dobunk, akkor a dobások együttes értéke éppen olyan eloszlású mintha két hagyományos dobókockával dobnánk.