

## A sztochasztika alapjai fizikusoknak

### 2. feladatsor: valószínűségek kombinatorikus kiszámítása, geometriai valószínűség

1. Az iskolai karácsonyi vásárra készülődve Blanka, Csenge és Dóri feladata az volt, hogy különböző figurákat hajtogassanak színes papírból. Összesen 70 figurát hajtogattak. A figurák kétheted részét Dóri készítette, a maradékot pedig fele-fele arányban Blanka és Csenge. Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a 70 figura közül véletlenszerűen kiválasztott két figurát ugyanaz a lány készített!

2. Egy embernek  $n$  egyforma kinézetű kulcsa van, melyek közül pontosan egy nyitja az ajtót. Emberünk véletlenül választva sorra próbálja a kulcsokat addig, amíg a jó kulcs elő nem kerül. Mennyi a valószínűsége, hogy a  $k$ -edik próbálkozása sikeres, ha

- (a) a kipróbált rossz kulcsokat mindig félreteszi?
- (b) a kipróbált rossz kulcsokat sose teszi félre?

3. Egy sakktáblán találomra elhelyezünk 8 bástyát. Mi a valószínűsége, hogy egyik sem üti a másikat?

4. Egy kertész három juhar-, négy tölgy- és öt nyírfát ültetett egy sorba véletlen sorrendben, mindegyik fát egyenlő valószínűséggel választva. Mennyi annak a valószínűsége, hogy nem kerül egymás mellé két nyír?

5. A Bajnokok Ligájában 2017-ben három spanyol csapat jutott a 8 közé: az Atlético Madrid, a Barcelona és a Real Madrid. Sorsolással határozták meg a negyeddöntők párosítását (itt már nincs kiemelés, és azonos nemzet csapatai is összekerülhetnek). Mennyi volt a sorsolás előtt a valószínűsége annak, hogy a negyeddöntőben

- (a) Barcelona – Real Madrid párharc lesz?
- (b) lesz spanyol párharc?

6. Egyes vidékeken elterjedt a következő babona: egy lány 6 fűszálat fog a markába úgy, hogy azok a kezéből mindkét irányban kiállnak. Egy másik lány mindkét oldalon páronként összecsomózza a fűszálakat. Ha így egy zárt lánc keletkezik, akkor arra következtetnek, hogy a lány a következő évben férjhez megy. Ha a csomózás teljesen véletlenszerűen történik, mennyi a valószínűsége, hogy zárt láncot kapunk. Mi a helyzet  $2n$  fűszál esetén?

7. Egy unatkozó gyakorlatvezető dolgozatíratás során arra lett figyelmes, hogy a csoportjában az összes lány egy sorban ül. A csoportban 10 hallgató van, közülük 3 lány. A teremben 4 sor van és minden sorban 4 hely, és feltesszük, hogy mindenki véletlenszerűen választ helyet, azaz minden leülési konfiguráció egyforma valószínűségű. Mennyi a kérdéses esemény valószínűsége?

8. Egy  $n \times n$ -es négyzetrács bal alsó és jobb felső sarkába letesszünk egy-egy pókot. A pókok  $2n$  lépésben helyet cserélnek úgy, hogy egymástól függetlenül minden útvonalat

ugyanakkora valószínűséggel választanak. A pókok egyszerre indulnak, és minden másodpercben egy lépést tesznek. Mi a valószínűsége, hogy a két pók találkozik?

**9.** A Boltzmann–Maxwell-statisztikánál  $r$  golyót úgy helyezünk el  $n$  dobozba, hogy mind az  $n^r$  elhelyezés egyformán valószínű. Határozzuk meg annak a  $p_k$  valószínűségét, hogy pontosan  $k$  golyó kerül az első dobozba! Számítsuk ki ezt a határértéket, ha  $n \rightarrow \infty$  úgy, hogy  $r/n \rightarrow \lambda$ !

**10.** A Bose–Einstein-statisztika esetén a feltétel az, hogy a lehetséges  $\binom{n+r-1}{r-1}$  számú elhelyezés egyformán valószínű. (Ez a modell jól használható a nukleonok és páros számú elemi részecskét tartalmazó atomok esetében.) Határozzuk meg annak a  $q_k$  valószínűségét, hogy pontosan  $k$  golyó kerül az első dobozba! Számítsuk ki ezt a határértéket, ha  $n \rightarrow \infty$  úgy, hogy  $r/n \rightarrow \lambda$ !

**11.** A  $[0, 1]$  intervallumot felosztjuk két véletlenül rádobott ponttal három részre. Mennyi annak a valószínűsége, hogy

- (a) mindhárom szakasz hossza nagyobb, mint  $1/4$ ?
- (b) mindhárom szakasz hossza kisebb mint  $1/2$ ?
- (c) a szakaszokból háromszög szerkeszthető?
- (d) a szakaszokból hegyesszögű háromszög szerkeszthető?

**12.** Választunk egy véletlen számot  $0$  és  $2$  között, és egy másikat ettől függetlenül  $1$  és  $2$  között. Mennyi a valószínűsége, hogy az összegük kisebb, mint  $2$ ?

**13.** Válasszuk az  $X, Y$  pontokat egymástól függetlenül a  $(0, 1)$  intervallumban egyenletes eloszlás szerint. Mennyi a valószínűsége, hogy az  $x^2 + Xx + Y = 0$  egyenletnek valós gyökei lesznek?

**14.** András és Betti munkaideje egymástól függetlenül egy-egy  $du$ .  $4$  és  $6$  közötti egyenletes eloszlású időpontban ér véget. Munkaidejük végeztével mindketten elmennek egy, munkahelyüktől azonos távolságra levő kávézóba, ahol elfogyasztanak egy csésze kávé. András esetében ez  $10$  perc, Betti esetében  $20$ . Mi a valószínűsége, hogy találkoznak?

**15.** Egy kör kerületén egymástól függetlenül, egyenletesen választunk  $4$  pontot:  $A, B, C, D$ . Mennyi a valószínűsége, hogy az  $AB$  és  $CD$  húrok metszik egymást?

**16.** Tekintsünk egy egységnyi kerületű kört, és ennek egy rögzített pontját. Válasszuk további két pontot a körvonalon egymástól függetlenül egyenletes eloszlás szerint. Mennyi a valószínűsége, hogy a három pont által meghatározott háromszög fedi a kör középpontját?

**17.** Egy kör kerületén válasszunk  $n$  pontot egymástól függetlenül, egyenletes eloszlás szerint. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a pontok konvex burka tartalmazza a kör középpontját?

**18.** Egy egységnégyzet két szemközti oldalán véletlenül választunk egy-egy pontot. Mi a valószínűsége, hogy távolságuk négyzete kisebb, mint  $3/2$ ?