


# Páros gráfok, kromatikus szám

## Kombinatorika


10. előadás

SZTE Bolyai Intézet  
Szeged, 2022. április 24.

**Definíció.** A  $G$  gráfban az  $F \subseteq V(G)$  ponthalmaz **független ponthalmaz**, ha  $F$  semelyik két pontja között nem halad él  $G$ -ben (és hurokél sem illeszkedik  $F$ -beli pontra).




**Definíció.** A  $G$  gráfban az  $F \subseteq V(G)$  ponthalmaz **független ponthalmaz**, ha  $F$  semelyik két pontja között nem halad él  $G$ -ben (és hurokél sem illeszkedik  $F$ -beli pontra).




**Definíció.** A  $G$  gráfban található legnagyobb független ponthalmaz méretét  $\alpha(G)$ -vel jelöljük:

$$\alpha(G) = \max\{|F| : F \text{ független ponthalmaz } G\text{-ben}\}.$$

**Definíció.** A  $G$  gráfban a  $K \subseteq V(G)$  ponthalmaz **klikk**, ha  $K$  bármely két pontja között halad él  $G$ -ben.




**Definíció.** A  $G$  gráfban a  $K \subseteq V(G)$  ponthalmaz **klikk**, ha  $K$  bármely két pontja között halad él  $G$ -ben.



**Definíció.** A  $G$  gráfban található legnagyobb klikk pontszámát  $\omega(G)$ -vel jelöljük:

$$\omega(G) = \max\{|K| : K \text{ klikk } G\text{-ben}\}.$$

**Definíció.** A  $G$  gráfban a  $K \subseteq V(G)$  ponthalmaz **klikk**, ha  $K$  bármely két pontja között halad él  $G$ -ben.




**Definíció.** A  $G$  gráfban található legnagyobb klikk pontszámát  $\omega(G)$ -vel jelöljük:

$$\omega(G) = \max\{|K| : K \text{ klikk } G\text{-ben}\}.$$


**Megjegyzés.** Sem az  $\alpha(G)$ , sem az  $\omega(G)$  paraméter kiszámítására nem ismert „gyors” algoritmus (és a sejtés szerint nincs is).

## Páros gráfok.



Egy gráf **páros**, ha csúcsai két osztályba sorolhatók úgy, hogy a gráf minden éle e két osztály között halad (azaz minden él végpontja az egyik osztályba, a másik végpontja a másik osztályba esik).

## Páros gráfok.




Egy gráf **páros**, ha csúcsai két osztályba sorolhatók úgy, hogy a gráf minden éle e két osztály között halad (azaz minden él végpontja az egyik osztályba, a másik végpontja a másik osztályba esik).

**Észrevétel.** Ha  $G$  egy tetszőleges páros gráf  $A$  és  $F$  osztályokkal, akkor az  $A$ -beli csúcsok fokszámainak összege megegyezik az  $F$ -beli csúcsok fokszámaibanak összegével. És mindkét fokszámösszeg a gráf éleinek számával egyenlő.




**Emlékeztető.** Egy gráf **páros**, ha csúcsai két osztályba sorolhatók úgy, hogy a gráf minden éle e két osztály között halad.

**Példa.** A 3-dimenziós kockagráf páros gráf. A csúcsok egy jó osztályozása látható az ábrán: A piros csúcsok alkotják az egyik osztályt, a kékek a másikat. (Azt kell ellenőrizni, hogy minden él két végpontja különböző színű.)



**Emlékeztető.** Egy gráf **páros**, ha csúcsai két osztályba sorolhatók úgy, hogy a gráf minden éle e két osztály között halad.

**Példa.** A 3-dimenziós kockagráf páros gráf. A csúcsok egy jó osztályozása látható az ábrán: A piros csúcsok alkotják az egyik osztályt, a kékek a másikat. (Azt kell ellenőrizni, hogy minden él két végpontja különböző színű.)



**T.** Egy gráf akkor és csak akkor páros, ha nincs benne páratlan hosszú kör.

**Bizonyítás.** Lásd gyakorlat.




A  $G$  gráf (csúcs)színezésén egy  $V(G) \rightarrow \mathcal{P}$  függvényt értünk, ahol  $\mathcal{P}$  egy véges halmaz, a „paletta”. (Informálisan, minden csúcst kiszínezünk egy  $\mathcal{P}$ -beli színnel.)

A  $G$  gráf (csúcs)színezésén egy  $V(G) \rightarrow \mathcal{P}$  függvényt értünk, ahol  $\mathcal{P}$  egy véges halmaz, a „paletta”. (Informálisan, minden csúcsot kiszínezünk egy  $\mathcal{P}$ -beli színnel.)

Most általánosítjuk az előző dián látott színezés-tulajdonságot több színre:

**Definíció.** A  $G$  gráf **jó színezésén** a csúcsoknak egy olyan színezését értjük, amelyben  $G$  minden élének két végpontja különböző színt kapott.



A  $G$  gráf (csúcs)színezésén egy  $V(G) \rightarrow \mathcal{P}$  függvényt értünk, ahol  $\mathcal{P}$  egy véges halmaz, a „paletta”. (Informálisan, minden csúcst kiszínezünk egy  $\mathcal{P}$ -beli színnel.)

Most általánosítjuk az előző dián látott színezés-tulajdonságot több színre:

**Definíció.** A  $G$  gráf **jó színezésén** a csúcsoknak egy olyan színezését értjük, amelyben  $G$  minden élének két végpontja különböző színt kapott.

**Megj.** Ebben a témakörben csak egyszerű gráfokkal foglalkozunk a továbbiakban! (Hurokél léte esetén nincs jó színezése a gráfnak, a párhuzamos élek pedig jó színezés szempontjából helyettesíthetők egyszeres élekkel.)

A  $G$  gráf (csúcs)színezésén egy  $V(G) \rightarrow \mathcal{P}$  függvényt értünk, ahol  $\mathcal{P}$  egy véges halmaz, a „paletta”. (Informálisan, minden csúcsot kiszínezünk egy  $\mathcal{P}$ -beli színnel.)

Most általánosítjuk az előző dián látott színezés-tulajdonságot több színre:

**Definíció.** A  $G$  gráf **jó színezésén** a csúcsoknak egy olyan színezését értjük, amelyben  $G$  minden élének két végpontja különböző színt kapott.

**Megj.** Ebben a témakörben csak egyszerű gráfokkal foglalkozunk a továbbiakban! (Hurokél léte esetén nincs jó színezése a gráfnak, a párhuzamos élek pedig jó színezés szempontjából helyettesíthetők egyszeres élekkel.)

**Megj.** Egyszerű gráfoknak mindig van jó színezése, például színezhetjük az összes csúcsot különböző színűre. Fontos optimalizálási probléma a felhasznált színek számának minimalizálása.

**Definíció.** A  $G$  egyszerű gráf  $\chi(G)$ -vel jelölt **kromatikus száma** az a legkisebb színszám, ahány szín felhasználásával jól színezhető  $G$ .

**Definíció.** A  $G$  egyszerű gráf  $\chi(G)$ -vel jelölt **kromatikus száma** az a legkisebb színszám, ahány szín felhasználásával jól színezhető  $G$ .

Tehát „ $\chi(G) = k$ ” KÉT dolgot jelent:  $G$ -nek létezik jó színezése  $k$  színnel, ÉS kevesebb színnel nem színezhető jól  $G$ !



**Definíció.** A  $G$  egyszerű gráf  $\chi(G)$ -vel jelölt **kromatikus száma** az a legkisebb színszám, ahány szín felhasználásával jól színezhető  $G$ .

Tehát „ $\chi(G) = k$ ” KÉT dolgot jelent:  $G$ -nek létezik jó színezése  $k$  színnel, ÉS kevesebb színnel nem színezhető jól  $G$ !

**Konvenció.** A  $k$  színnel jól színezhető gráfokat röviden  $k$ -színezhető gráfoknak nevezzünk.

**Megjegyzés.** A páros gráfok pontosan a 2-színezhető gráfok. (Ez egy ekvivalens definíció.)

**Definíció.** A  $G$  egyszerű gráf  $\chi(G)$ -vel jelölt **kromatikus száma** az a legkisebb színszám, ahány szín felhasználásával jól színezhető  $G$ .

Tehát „ $\chi(G) = k$ ” KÉT dolgot jelent:  $G$ -nek létezik jó színezése  $k$  színnel, ÉS kevesebb színnel nem színezhető jól  $G$ !

**Konvenció.** A  $k$  színnel jól színezhető gráfokat röviden  $k$ -színezhető gráfoknak nevezzünk.

**Megjegyzés.** A páros gráfok pontosan a 2-színezhető gráfok. (Ez egy ekvivalens definíció.)

**Megjegyzés.** A kromatikus szám meghatározására nem ismert „hatékony” algoritmus, és a sejtés szerint nincs is. (Sőt, már annak eldöntésére sem, egy gráf 3-színezhető-e.)

**Állítás.**  $\chi(G) \geq \omega(G)$ .

**Bizonyítás.** Tekintsünk egy legnagyobb, azaz  $\omega(G)$  pontú  $K$  klikket  $G$ -ben. Világos, hogy  $G$  jó színezésekor  $K$  pontjait mind különböző színűre kell színezni. Tehát legalább  $|K| = \omega(G)$  szín szükséges  $G$  jó színezéséhez.  $\square$

**Megjegyzés.**  $\chi(G) > \omega(G)$  előfordulhat. Sőt, bármilyen nagy  $l \geq 2$  számhoz létezik olyan  $G$  gráf, amelynek a kromatikus száma  $l$ , de  $G$ -ben nincs háromszög, azaz  $\omega(G) = 2$ . (Ilyen  $G$  konstruálása elolvasható a honlapon.)

**Állítás.**  $\chi(G) \geq \frac{|V(G)|}{\alpha(G)}$ .

**Bizonyítás.** Először is vegyük észre, hogy  $G$  jó színezése nem más, mint független ponthalmazokra történő partícionálásra a csúcshalmaznak, hiszen az egy színű csúcsok között nem halad(hat)nak élek. (Vö. páros gráfok osztályozásos és színezéses definícióinak ekvivalenciája.)

Színezzük  $G$ -t optimálisan, azaz  $\chi(G)$  színnel. Ezzel  $G$  csúcshalmazát  $\chi(G)$  darab független ponthalmazra osztályoztuk, és mindegyik osztály legfeljebb  $\alpha(G)$  méretű (hiszen  $\alpha(G)$  a legnagyobb „független ponthalmaz”-méret).

Az osztályméretekre vonatkozó felső becsléseket összevetve kapjuk, hogy

$$|V(G)| \leq \chi(G) \cdot \alpha(G),$$

ami rendezés után épp a bizonyítandó. □

**Jelölés.** A  $G$  gráfban előforduló legnagyobb (csúcs)fokszámot  $\Delta(G)$ -vel jelöljük.

**Tétel.**  $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ .

**Bizonyítás (vázlat).** Színezzük jól mohó módon a csúcsoakat. Könnyű látni, hogy ekkor legfeljebb  $\Delta(G) + 1$  színt használtunk. A részleteket lásd a CS-re feltöltött YouTube-videón.  $\square$

**Brooks-tétel.** Ha  $G$  egy olyan összefüggő gráf, amely nem teljes gráf és nem páratlan kör, akkor

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

Nem bizonyítjuk.