


2. BINOMIÁLIS EGYÜTTHATÓK, POLINOMOK

- 1.⁻ Egy n fős osztályból szeretnénk kiállítani egy r tagú sportcsapatot, amelyben két résztvevő tartalék. Hányféle módon tehetjük ezt meg (a tartalékok kijelölését is figyelembe véve)?
- 2.⁻ Hány olyan hétjegyű telefonszám van, amely 4-essel kezdődik, pontosan 3 db 2-es van benne, és nincs benne 0?
- 3.⁻ A 32 lapos magyar kártyából egyszerre kihúzzunk 6 lapot. Hányféleképpen tehetjük ezt meg úgy, hogy a kihúzott lapok között pontosan két piros lap és pontosan két ász legyen? (A kihúzott lapok sorrendje nem számít.)
- 4.⁻ Hány téglalapot határoznak meg az alábbi rács vonalai? [3.4]



5. Az alábbi egyenletnek hány megoldása van a pozitív egészek körében?

$$a + b + c + d = 2016.$$

6. Hány olyan háromszög van, amelynek csúcsai egy adott szabályos 23-szög csúcsai közül valók, és amely tartalmazza a sokszög középpontját? [3.3]
7. Mi a valószínűsége annak, hogy egy lottóhúzás öt száma között van legalább két szomszédos (azaz két olyan szám, amelynek különbsége 1)? [3.6]
- 8.⁺ Az 1987. évi 34. heti lottóhúzáskor két pár egymás utáni számot is kihúztak: a (31, 32)-t és az (50, 51)-et. Mi annak a valószínűsége, hogy a jövő heti húzás eredménye hasonlóan alakul, azaz kihúznak két szomszédos számból álló párt, de nem húznak ki három egymás utáni számot? [3.7]
9. Bizonyítsuk be, hogy bármely $n \geq 2$ természetes számra

$$\frac{2^n}{n} \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \leq \frac{2^n}{\sqrt{n}}.$$

10. Bizonyítsuk be, hogy $n \geq k \geq 1$ esetén

$$\left(\frac{n}{k}\right)^k \leq \binom{n}{k} \leq \left(\frac{ne}{k}\right)^k.$$

11. $\binom{90}{5}$ páros vagy páratlan? (A kérdést próbáljuk a $\binom{90}{5}$ binomiális együttható pontos értékének kiszámítása nélkül megválaszolni.)

12. Igazoljuk a következő kongruenciákat (mod 2):

$$\binom{2n}{2k+1} \equiv 0, \quad \binom{2n}{2k} \equiv \binom{n}{k}, \quad \binom{2n+1}{2k} \equiv \binom{n}{k}, \quad \binom{2n+1}{2k+1} \equiv \binom{n}{k}.$$

13. Bizonyítsuk be a következő azonosságokat: [3.17]

$$\text{a) } \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

- b) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$.
- c) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$, ha $n \geq 1$.
- d) $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$.
- e) $\binom{n}{k} \binom{k}{l} = \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l}$.
- f) $0 \binom{n}{0} + 1 \binom{n}{1} + 2 \binom{n}{2} + \dots + n \binom{n}{n} = n2^{n-1}$.
- g) $\binom{n}{k} + \binom{n-1}{k} + \dots + \binom{k}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.
- h) $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}$.

14.⁻ Hozzuk zárt alakra a következő kifejezést:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 4^k (-1)^{n-k}.$$

15. a) A binomiális tételre való hivatkozás nélkül, kettős leszámolásal bizonyítsuk, hogy minden n és m pozitív egészre teljesül, hogy

$$(m+1)^n = 1 + \binom{n}{1}m + \binom{n}{2}m^2 + \binom{n}{3}m^3 + \dots + \binom{n}{n}m^n.$$

b) Miért következik az előző pontból a binomiális tétel?

16.⁺ Bizonyítsuk be, hogy ha n természetes szám, akkor

$$(5 + \sqrt{26})^n$$

tizedestört-alakjában a tizedesvesszőt követő első n jegy egyenlő. [3.21]

17. Írjuk fel egyszerűbb alakban az $(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})(1+x^{32})$ polinomot!

18. Indokoljuk meg, hogy a következő két feladatnak mi köze van egymáshoz, és a b) feladatot az a) feladat felhasználásával oldjuk meg:

- a) Határozzuk meg az $(1+x^5+x^{10}+x^{15}+x^{20})(1+x^{10})(1+x^{20}+x^{40})$ polinomszorzás eredményét. Ehhez használhatunk számológépet. (A honlapomon bemutatom egy példával, hogy hogyan lehet polinomokat szorozni az ingyenes Wolfram Alphával.)
- b) Pénztárcánkban négy 5-forintos, egy 10-forintos, és két 20-forintos van. Milyen összegeket tudunk pontosan kifizetni (tehát úgy, hogy a pénztárosnak ne kelljen visszaadni)? Az egyes kifizetéseknél hány lehetőségünk van?

19.⁺ Lehetséges-e két dobókockát úgy „cinkelni” (tehát az egyes számok dobásának valószínűségét úgy megváltoztatni), hogy a feldobások után a kapott számokat összeadva 2-től 12-ig minden lehetséges összeg bekövetkezésének valószínűsége azonos legyen? [3.39]

20.⁺ Azt szeretnénk megtippelni, hogy a kihúzott lottószámok összege páros vagy páratlan lesz-e. Melyik lehetőségnek nagyobb a valószínűsége

- a) ötöslottó esetén (90 számból 5-öt húznak ki),
 b) hatoslottó esetén (45 számból 6-ot húznak ki),
 c) skandináv lottó esetén (35 számból 7-et húznak ki)?

Olyan megoldást adjunk, amely nagy számok esetén is működik (pl. ha 2018 számból húzunk 100-at).