


2. BINOMIÁLIS EGYÜTTHATÓK, POLINOMOK

1. Egy n fős osztályból szeretnénk kiállítani egy r tagú sportcsapatot, amelyben két résztvevő tartalék. Hányféle módon tehetjük ezt meg (a tartalékok kijelölését is figyelembe véve)?
2. Hány olyan hétjegyű telefonszám van, amely 4-essel kezdődik, pontosan 3 db 2-es van benne, és nincs benne 0?
3. A Bolyai Közlekedési Vállalat (BKV) jegyein az alábbi 5×5 -ös számtáblázat szerepel:

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Az előírás szerint a buszon található lyukasztónak tíz számot kell kilyukasztania úgy, hogy minden sorban pontosan kettő legyen kilyukasztva. (Az oszlopokra nincs megkötés.) Hány ilyen lyukasztási mód van?

4. Egy raktárban 20 öltöny van, amelyek közt 9 szövési hibákat tartalmaz, a többi hibátlan. Egy kereskedő kiválaszt 15 öltönyt. Hány olyan választási lehetősége van, hogy legfeljebb 5 legyen hibás?
5. A 32 lapos magyar kártyából egyszerre kihúzzunk 6 lapot. Hányféleképpen tehetjük ezt meg úgy, hogy a kihúzott lapok között pontosan két piros lap és pontosan két ász legyen? (A kihúzott lapok sorrendje nem számít.)
6. Hány téglalapot határoznak meg az alábbi rács vonalai? [3.4]



7. Az alábbi egyenletnek hány megoldása van a pozitív egészek körében?

$$a + b + c + d = 2016.$$

8. Hány olyan háromszög van, amelynek csúcsai egy adott szabályos 23-szög csúcsai közül valók, és amely tartalmazza a sokszög középpontját? [3.3]
9. Mi a valószínűsége annak, hogy egy lottóhúzás öt száma között van legalább két szomszédos (azaz két olyan szám, amelynek különbsége 1)? [3.6]
- 10.⁺ Az 1987. évi 34. heti lottóhúzáskor két pár egymás utáni számot is kihúztak: a (31, 32)-t és az (50, 51)-et. Mi annak a valószínűsége, hogy a jövő heti húzás eredménye hasonlóan alakul, azaz kihúznak két szomszédos számból álló párt, de nem húznak ki három egymás utáni számot? [3.7]

11. Bizonyítsuk be, hogy bármely $n \geq 2$ természetes számra

$$\frac{2^n}{n} \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \leq \frac{2^n}{\sqrt{n}}.$$

12. Bizonyítsuk be, hogy $n \geq k \geq 1$ esetén

$$\left(\frac{n}{k}\right)^k \leq \binom{n}{k} \leq \left(\frac{ne}{k}\right)^k.$$

13. $\binom{90}{5}$ páros vagy páratlan? (A kérdést próbáljuk a $\binom{90}{5}$ binomiális együttható pontos értékének kiszámítása nélkül megválaszolni.)

14. Igazoljuk a következő kongruenciákat (mod 2):

$$\binom{2n}{2k+1} \equiv 0, \quad \binom{2n}{2k} \equiv \binom{n}{k}, \quad \binom{2n+1}{2k} \equiv \binom{n}{k}, \quad \binom{2n+1}{2k+1} \equiv \binom{n}{k}.$$

15. Bizonyítsuk be a következő azonosságokat:

[3.17]

a) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$

b) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n.$

c) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0, \quad \text{ha } n \geq 1.$

d) $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}.$

e) $\binom{n}{k} \binom{k}{l} = \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l}.$

f) $0 \binom{n}{0} + 1 \binom{n}{1} + 2 \binom{n}{2} + \dots + n \binom{n}{n} = n2^{n-1}.$

g) $\binom{n}{k} + \binom{n-1}{k} + \dots + \binom{k}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$

h) $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n}.$

16.⁻ Hozzuk zárt alakra a következő kifejezést:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 4^k (-1)^{n-k}.$$

17. a) A binomiális tételre való hivatkozás nélkül, kettős leszámolásal bizonyítsuk, hogy minden n és m pozitív egészre teljesül, hogy

$$(m+1)^n = 1 + \binom{n}{1}m + \binom{n}{2}m^2 + \binom{n}{3}m^3 + \dots + \binom{n}{n}m^n.$$

b) Miért következik az előző pontból a binomiális tétel?

18.⁺ Bizonyítsuk be, hogy ha n természetes szám, akkor

$$(5 + \sqrt{26})^n$$

tizedestört-alakjában a tizedesvesszőt követő első n jegy egyenlő.

[3.21]

19. Írjuk fel egyszerűbb alakban az $(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)(1+x^{16})(1+x^{32})$ polinomot!

20. Indokoljuk meg, hogy a következő két feladatnak mi köze van egymáshoz, és a b) feladatot az a) feladat felhasználásával oldjuk meg:

a) Határozzuk meg az $(1+x^5+x^{10}+x^{15}+x^{20})(1+x^{10})(1+x^{20}+x^{40})$ polinomszorzás eredményét. Ehhez használhatunk számológépet. (A honlapomon bemutatom egy példával, hogy hogyan lehet polinomokat szorozni az ingyenes Wolfram Alphával.)

b) Pénztárcánkban négy 5-forintos, egy 10-forintos, és két 20-forintos van. Milyen összegeket tudunk pontosan kifizetni (tehát úgy, hogy a pénztárosnak ne kelljen visszaadni)? Az egyes kifizetéseknél hány lehetőségünk van?

21.+ Lehetséges-e két dobókockát úgy „cinkelni” (tehát az egyes számok dobásának valószínűségét úgy megváltoztatni), hogy a feldobások után a kapott számokat összeadva 2-től 12-ig minden lehetséges összeg bekövetkezésének valószínűsége azonos legyen? [3.39]

22.+ Azt szeretnénk megtippelni, hogy a kihúzott lottószámok összege páros vagy páratlan lesz-e. Melyik lehetőségnek nagyobb a valószínűsége

- a) ötöslottó esetén (90 számból 5-öt húznak ki),
- b) hatoslottó esetén (45 számból 6-ot húznak ki),
- c) skandináv lottó esetén (35 számból 7-et húznak ki)?

Olyan megoldást adjunk, amely nagy számok esetén is működik (pl. ha 2018 számból húzunk 100-at).