


1. KOMBINATORIKUS ALAPELVEK, RÉSZHALMAZOK

1. Hány legalább 6, de legfeljebb 9 karakterből álló jelszó készíthető a 26 betűs angol ábécé betűit felhasználva?
2. Hány 5-tel osztható hétjegyű palindrom szám van?
3. Az alábbi térképpel leírt területen a jelzett utakon haladva A -ból B -be kell eljutnunk. Hány lehetőségünk van, ha nem térhetünk vissza egy már elért csomópontba (tehát mindig „távolodunk” A -tól)?



4. Hányféleképpen lehet elhelyezni a fehér és fekete királyt az üres 8×8 -as sakktáblára úgy, hogy ne üssék egymást?
5. Egy dobókockát feldobunk négyszer egymás után. Hány olyan dobássorozat van, amelyben van többször előforduló dobott érték?
6. Hány olyan egész szám van 0-tól 999.999-ig, amely tartalmaz 3-as számjegyet?
7. Az $\{1, 2, \dots, 10\}$ halmaz hány részhalmaza tartalmaz legalább egy páratlan számot? [3.1]
8. n különböző csokit két (nemüres) csoportra osztunk. Hányféle módon tehetjük ezt meg?
9. Legyen U egy n elemű (alap)halmaz. Határozzuk meg azoknak az (X, Y) pároknak a számát, amelyekre $X \subseteq Y \subseteq U$. [TK. 3.1.3.]
10. Egy n elemű halmaz összes részhalmaza közül taláломra kiválasztunk egyet, majd az összes részhalmaz közül megint kiválasztunk egyet (uniform módon, egymástól függetlenül). Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy a két kiválasztott részhalmaz közül egyik tartalmazza a másikat. [3.11]
11. Az $\{1, 2, \dots, 100\}$ halmaznak hány páratlan elemszámú részhalmaza van?
12. Az $\{1, 2, \dots, 100\}$ halmaznak hány olyan részhalmaza van, amelyben az elemek összege páratlan?
- 13.⁺ A $\{2, 4, 6, \dots, 16\}$ halmaz összes részhalmozára kiszámoljuk az elemek összegének utolsó számjegyét. Igazoljuk, hogy minden lehetséges végződés páros sokszor fordul elő!
- 14.⁺ (Kis Fermat-tétel.) Igazoljuk kombinatorikus érveléssel, hogy tetszőleges p prímszám és a pozitív egész esetén $p \mid a^p - a$.
15. Az alábbiak közül mely természetes számokból van több 1.000.000-ig:
 - (i) amelyek csak 1, 2 és 5 számjegyeket tartalmaznak (mindegyiket legalább egyszer),
 - (ii) amelyek csak 3, 8 és 9 számjegyeket tartalmaznak (mindegyiket legalább egyszer),
 - (iii) amelyek csak 3, 8 és 0 számjegyeket tartalmaznak (mindegyiket legalább egyszer)?
- 16.

$$\sum_{R \subseteq [n]} |R| = ?$$

17. Hányféleképpen bonthatjuk fel az n számot pozitív egészek összegére, ha a tagok sorrendje is számít, és az egytagú összeg is megengedett? (Például $n = 3$ esetén 4 ilyen felbontás van: $1 + 1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 = 3$.)

18.⁺ Ha M egy egész számokból álló véges halmaz, akkor jelöljük $S(M)$ -mel azt az összeget, amelyet úgy kapunk, hogy M elemeit csökkenő sorrendbe rendezzük, és a tagokat felváltva pozitív és negatív előjellel látjuk el. Például

$$S(\{1, 2, 5, 6, 9\}) = 9 - 6 + 5 - 2 + 1 = 7, \quad S(\{3\}) = 3.$$

Mekkora az $S(M)$ összegek összege, ha M befutja az $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ halmaz összes nemüres részhalmazát? [3.36]

19. Ki lehet-e úgy tölteni egy $n \times n$ -es táblázatot az 1, 2 és 3 számokkal, hogy minden sorban, minden oszlopban és a két átlóban is különböző legyen az ott álló elemek összege?

20. Egy egységnyi oldalhosszú négyzetbe elhelyeztünk öt pontot. Bizonyítsuk be, hogy lesz köztük kettő, amelyek távolsága legfeljebb $\sqrt{2}/2$. [1.25]

21. Igaz-e, hogy minden k természetes számnak létezik olyan többszöröse, amely csak 0 és 1 számjegyeket tartalmaz?

22.⁺ Egy 6×6 mezőből álló „sakktáblát” hézagmentesen és átfedés nélkül dominólapokkal fedünk le. Mindegyik dominólap két szomszédos mezőt takar le. Bizonyítandó, hogy a mezőket elválasztó 5 vízszintes és 5 függőleges vonal között van olyan, amely egyetlen dominólapot sem vág ketté. (OKTV, 1963.)

23.⁺ Egy matematikaversenyen 200 résztvevő vett részt, ahol 6 feladatot kellett megoldaniuk. Minden feladatra legalább 120 helyes megoldás érkezett. Bizonyítsuk be, hogy van két olyan versenyző, hogy mindegyik problémát megoldotta legalább az egyikük. [IMC]

24. Mutassuk meg, hogy

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \tau(j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \approx \ln n,$$

ahol $\tau(j)$ a j szám osztóinak számát jelöli. (Az első egyenlőséget kell bizonyítani.)